Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

673

उर्दू संग्रह

पुस्तक का नाम इस्लाम इत्यात कुरबां

विज्ञान की फिलॉसफी

लेखक मोहम्मद नज़ीरुद्दीन एम.ए.

प्रकाशन वर्ष..... 1939.....

आगत संख्या...673.....

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

222 32 B

673



علمِ ہیئت کروی

حصۂ اول

92/9

10/11

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Ball Sir Robert
A Treatise on Spherical
Astronomy
6/41-



673

سلسلۂ نصابات علوم جامعۂ عثمانیہ

علمِ ہیئت کروی

حصۂ اوّل

تصنیف

سر رابرٹ بال ایم-اے، ایف-آر-ایس

ترجمہ

محمد نذیر الدین ایم-اے (عثمانیہ)

رکن سررشتۂ تالیف و ترجمہ سرکار عالی

سنہ ۱۳۵۸ھ م سنہ ۱۳۴۸ف م سنہ ۱۹۳۹ء

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी

دار الطبع جامعۂ عثمانیہ حیدرآباد دکن

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

یہ کتاب کیمبرج یونیورسٹی پریس کے ایجنٹس مسرز میکملن اینڈ کمپنی
کی اجازت سے جن کو حق اشاعت حاصل ہے
اُردو میں ترجمہ کر کے طبع و شایع کی گئی ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

فہرست مضامین

علم ہیئت کروی

حصۂ اول

پہلا باب

اساسی ضابطے

دفعہ		صفحہ
۱	— علم مثلث کروی	۱
۲	— ڈلمبر اور نیپیر کی تمثیلات	۱۲
۳	— صحت جو نو کا رتبی عمل حساب میں حاصل ہو سکتی ہے	۱۶
۴	— کروی مثلث میں تفرقی ضابطے	۱۹
۵	— بینی ادراج کا فن	۲۱
	پہلے باب پر مثالیں	۳۴

دوسرا باب

کروی محددوں کا استعمال

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

دفعہ		صفحہ
۶	کرۂ پر درجہ دار بڑے دائرے	۳۸
۷	کرۂ پر کے کسی نقطہ کے محدد	۴۰
۸	دو نقطوں کو ملانے والی قوس کی جیب التمام کو ان نقطوں کے محددوں میں بیان کرنا	۴۲
۹	کروی محددوں میں دی ہوئی مساوات کا مفہوم	۴۶
۱۰	دو درجہ دار بڑے دائروں کا میلان ان کے شطبوں کو ملانیوالی اُس قوس کے مساوی ہوتا ہے جو ۱۸۰° سے بڑی نہ ہو	۴۹
۱۱	دو درجہ دار بڑے دائروں کا تقاطع	۵۱
۱۲	محددوں کا استحالہ	۵۵
۱۳	لوکارتموں کا استعمال	۶۳

تیسرا باب

زمین کی شکل اور نقشہ کشی

۱۴	تمہیدیہ	۶۵
۱۵	عرض بلد	۶۶
۱۶	نصف النہار پر نصف قطر انحناء	۷۱
۱۷	نقشہ کشی کا نظریہ	۷۵
۱۸	نقشہ کے ہم شکل ہونے کی شرطیں	۷۷
۱۹	ہم شکل تعبیر میں پیمانہ	۸۱
۲۰	مرکیٹر کا ظل	۸۱
۲۱	مساوی المیلان	۸۶
۲۲	تسطیحی اظلال	۸۹
۲۳	کرۂ پر کے کسی دائرہ کا تسطیحی ظل بھی ایک دائرہ ہوتا ہے	۹۳

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

دفعہ		صفحہ
۲۴	تسطیحی ظل کے لیے عام ضابطے	۹۶
۲۵	ایسا نقشہ جس میں کرہ پر کا ہر رقبہ، نقشہ پر مساوی رقبہ کے ذریعہ تعبیر ہو	۹۹
	تیسرے باب پر متفرق مثالیں	۱۰۱

چوتھا باب

کرۂ سماوی

۲۶	کرۂ سماوی	۱۰۶
۲۷	افق سماوی	۱۱۰
۲۸	یومی حرکت	۱۱۱
۲۹	نصف النہار اور اول السمت	۱۱۵
۳۰	ارتفاع اور السمت	۱۱۹
	چوتھے باب پر مختلف مثالیں	۱۲۳

پانچواں باب

صعود مستقیم اور میل۔ سماوی عرض بلد اور طول بلد

۳۱	صعود مستقیم اور میل	۱۲۵
۳۲	نقطہ راس الحمل	۱۲۵
۳۳	ساعتی زاویہ اور کوکبی یوم	۱۳۰
۳۴	ساعتی زاویہ اور میل سے راسی فاصلہ اور السمت کی تعیین	۱۳۶
۳۵	تفرقی ضابطوں کے اطلاقات	۱۴۰

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

دفعہ		صفحہ
۳۶	کسی جرم فلکی کے تکبّد کا وقت	۱۴۸
۳۷	کسی جرم فلکی کا طلوع و غروب	۱۵۷
۳۸	سماوی عرض بلد اور طول بلد	۱۶۲
	پانچویں باب پر مختلف مثالیں	۱۶۶

چھٹا باب

کرۂ ہوائی کا انعطاف

۳۹	مناظری انعطاف کے قوانین	۱۷۷
۴۰	ہیئتی انعطاف	۱۸۱
۴۱	ہوائی انعطاف کا عام نظریہ	۱۸۳
۴۲	انعطاف کی محصلہ تفرقی مساوات کا تکمل	۱۸۶
۴۳	کرۂ ہوائی کے انعطاف کے لیے کیسینی کا ضابطہ	۱۹۰
۴۴	کرۂ ہوائی کے انعطاف کے لیے دیگر ضابطے	۱۹۴
۴۵	کرۂ ہوائی کے دباؤ اور تپش کا اثر انعطاف پر	۱۹۸
۴۶	مشاہدہ سے کرۂ ہوائی کے انعطاف کی تعئیں	۱۹۹
۴۷	انعطاف کا اثر ساعتی زاوئے اور میل پر	۲۰۳
۴۸	انعطاف کا اثر دو قریبی سماوی نقطوں کے درمیان ظاہری فاصلہ پر	۲۰۵
۴۹	انعطاف کا اثر ایک دوہرے تارے کے زاویہ محل کی پیمائش پر	۲۱۰

ساتواں باب

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

دفعہ صفحہ

کپلر اور نیوٹن کے کلیے اور انکا استعمال

۵۰ — وہ کلیے جن کی بموجب سیارے سورج کے گرد حرکت کرتے ہیں اور جو ان کے موجد کپلر کے نام سے موسوم ہیں . . ۲۲۳
۵۱ — سورج کی ظاہری حرکت ۲۳۴
۵۲ — ناقصی حرکت محسوب کرنا ۲۳۵
۵۳ — ناقصی حرکت کے وہ ضابطے جو تربیعوں کے ذریعہ بیان کئے گئے ہیں ۲۵۱

آٹھواں باب

استقبال اور کبو

۵۴ — قمر شمسی استقبال کا مشاہدہ ۲۶۳
۵۵ — قمر شمسی استقبال اور کبو کی طبیعی توضیح ۲۶۶
۵۶ — سیاروی استقبال ۲۷۰
۵۷ — صعود مستقیم اور میل کی رقوم میں استقبال اور کبو کے لیے عام ضابطے ۲۷۳
۵۸ — راس الحمل کی حرکت طریق الشمس پر ۲۸۵
۵۹ — غیر تابع یومی اعداد ۲۸۹
۶۰ — ستاروں کی ذاتی حرکتیں ۳۰۰
۶۱ — ارضی عرض بلدوں میں تغیرات ۳۰۲
آٹھویں باب پر مثالیں ۳۰۴

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

دفعہ صفحہ

نواں باب

کوکبی وقت اور اوسط وقت

۶۲ — کوکبی وقت ۳۰۹
۶۳ — ہیئتی گھڑی کی تصحیح ۳۱۱
۶۴ — طریق الشمس کا میلان ۳۱۵
۶۵ — صعود مستقیم کی تعیین میں جتنی صحت ممکن ہے اس کی تخمین .. ۳۲۰
۶۶ — کوکبی سال اور شمسی سال ۳۲۳
۶۷ — اوسط حرکت کا ہندسی اصول ۳۲۶
۶۸ — اوسط وقت ۳۳۱
۶۹ — اوسط ظہر پر کوکبی وقت ۳۳۵
۷۰ — کوکبی وقت سے اوسط وقت معلوم کرنا ۳۳۸
۷۱ — ارضی تاریخ خط ۳۴۲
نویں باب پر مثالیں ۳۴۵

دسواں باب

سورج کی ظاہری سالانہ حرکت

۷۲ — استوار کی تحویل ۳۴۸
۷۳ — مرکز کی مساوات ۳۵۴
۷۴ — وقت کی مساوات ۳۵۸

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

دفعہ		صفحہ
۷۵	— وقت کی مساوات سے متعلق ضابطے	۳۶۱
۷۶	— وقت کی مساوات کی ترسیمی تعبیر	۳۶۴
۷۷	— وقت کی مقیم مساوات کی عام تحقیق	۳۷۱
۷۸	— موسموں کا سبب	۳۷۸
	دسویں باب پر مثالیں	۳۷۹

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

۷۸۶

علم ہیئت کروی

(۱)

حصۂ اول

پہلا باب

اساسی ضابطے

دفعہ		صفحہ
۱	علم مثلث کروی ۔	۱
۲	ڈلمبر اور نیپیر کی تمثیلات ۔	۱۲
۳	صحت جو نو کارتمی عمل حساب میں حاصل ہو سکتی ہے ۔	۱۶
۴	کروی مثلث میں تفرقی ضابطے ۔	۱۹
۵	بینی ادراج کا فن ۔	۲۱

۱ ۔ علم مثلث کروی ۔

فرض کرو کہ ایک مثلث کروی کے ضلع اور زاوے حسب معمول ا، ب، ج، ا، ب، ج ہیں علم مثلث کروی کی کتابوں میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ

جم ج = جم ا جم ب + جب ا جب ب جم ج ،..... (۱)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جب ج جم ا = جم ا جب ب - جب ا جم ب جم ج ... (۲)
جب ج جب ا = جب ا جب ج ..... (۳)
ضابطہ (۲) کو (۱) سے آسانی کے ساتھ حسب ذیل طریقہ پر حاصل کیا جا سکتا ہے۔

ا ج کو (شکل ۱) ھ تک اتنا خارج کرو کہ
ج ھ = ۹۰° - ب



شکل (۱)

تب مثلث ب ا ھ سے بموجب ضابطہ (۱)
جم ب ھ = جب ج جم ا
اور مثلث ب ج ھ سے (۲)
جم ب ھ = جم ا جب ب - جب ا جم ب جم ج
جم ب ھ کی یہ دو قیمتیں مساوی رکھنے سے ضابطہ (۲) حاصل ہوتا ہے۔
اسی طرح نمونہ (۲) کے مختلف ضابطے، حافظہ پر زیادہ بار ڈالے بغیر، حسب ضرورت لکھ لئے جا سکتے ہیں۔
مساواتیں (۱)، (۲)، (۳) سادہ ترین مساواتیں ہیں جو اس وقت استعمال کیجا سکتی ہیں جبکہ کروی مثلث کے دو ضلع ا اور ب اور درمیانی زاویہ ج دئے گئے ہوں اور اس کے اجزاء ا اور ج معلوم کرنا مطلوب ہو۔ بادی النظر میں یہ عجیب معلوم ہوتا ہے کہ صرف دو مقداروں کو دریافت کرنے کے لیے تین مساواتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن ٹھیک حل

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

حاصل نہیں ہو سکتا اگر ا اور ج کو معلوم کرنے کے لیے مساواتیں تین سے کم ہوں۔

مثلاً فرض کرو کہ صرف مساواتوں (۱) اور (۲) کا زوج دیا گیا ہے اور ا اور ج کی قیمتیں معلوم کر لی گئی ہیں جو ان مساواتوں کو پورا کرتی ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ یہی مساواتیں قیمتوں کے تین اور جوڑوں

۱۸۰° + ا، ۳۶۰° - ج ؛ ۳۶۰° - ا، ج ؛ ۱۸۰° - ا، ۳۶۰° - ج

سے بھی پوری ہوتی ہیں۔ لیکن اگر یہ بھی مقصود ہو کہ جو قیمتیں اختیار کی جائیں وہ مساوات (۳) کو بھی پورا کریں تو قیمتوں کے آخری دو جوڑوں کو خارج کر دینا پڑتا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب مساواتیں (۱)، (۲) اور (۳) سب کی سب، ا اور ج سے پوری ہوتی ہوں تو ایک دوسرا حل صرف ۱۸۰° + ا، ۳۶۰° - ج رہ جاتا ہے۔

اس باقی ماندہ ابہام کے متعلق یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ کرہ پر کے دو نقطوں ا اور ب کو ملانے والی، بڑے دائرہ کی قوس کا طول بالعموم مبہم ہوتا ہے۔ یہ طول ا ب ہو سکتا ہے یا ۳۶۰° - ا ب۔ اسی طرح اگر دو بڑے دائروں کے درمیانی زاوئے کی تعریف اس قوس سے کی جائے جو دو خاص قطبوں کے درمیان ہو تو بھی یہاں یہ ابہام پیدا ہو گا کہ قطبوں کو ملانے والی دو قوسوں میں سے کونسی قوس زاویہ کا ناپ ہے۔ ہر مخصوص سوال کے حالات سے بالعموم یہ امر واضح ہو گا کہ ان دو حلوں ا، ج یا ۱۸۰° + ا، ۳۶۰° - ج میں سے کونسا حل مطلوب ہے۔

اگر ایک ضلع اور دو متصلہ زاوئے دئے جائیں تو دو نئے ضابطے (۴) اور (۵)، ضابطہ (۳) کے ساتھ لینے ہوں گے

جم ج = - جم ا جم ب + جب ا جب ب جم ج (۴)

جب ج جم ا = جم ا جب ب + جب ا جم ب جم ج (۵)

جب ج جب ا = جب ا جب ج (۳)

ضابطے (۴) اور (۵)، علی الترتیب (۱) اور (۲) سے قطبی مثلث کا

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۳) عام اصول استعمال کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ وہ اصول یہ ہے کہ کوئی ضابطہ جو سب کروی مثلثوں کے لیے درست ہو درست رہتا ہے اگر اُس میں ا، ب، ج، ا، ب، ج کی بجائے قطبی مثلث کے اجزاء

۱۸۰° - ا، ۱۸۰° - ب، ۱۸۰° - ج، ۱۸۰° - ا، ۱۸۰° - ب، ۱۸۰° - ج

علی الترتیب درج کر دیے جائیں۔

اگر دو ضلع اور اِن کا درمیانی زاویہ یا دو زاوئے اور درمیانی ضلع دیے جائیں تو بھی مثلث ایسے ضابطوں سے حل ہو سکتا ہے جو (۲) اور (۳) سے آسانی کے ساتھ اخذ کیے جا سکتے ہیں اور جو اس نمونہ کے ہیں

مم ا جب ب = مم ا جب ج + جم ب جم ج (۶)

اگر ا، ب، اور ج دیے گئے ہیں تو اِس ضابطہ سے مم ا کی تعیین ہو گی اور اِس لیے ا معلوم ہو گا کیونکہ صفر اور ۱۸۰° کے درمیان ا کی ہمیشہ ایک قیمت ہو گی جو + ∞ سے - ∞ تک مم ا کی کسی قیمت کے جواب میں ہو گی۔ بلاشبہ ۱۸۰° + ا بھی ایک حل ہے۔

اِسی طرح اگر ا، ج، ب دیے گئے ہوں تو اِس ضابطہ سے مم ا معلوم ہو سکے گا۔

یاد رہے کہ ضابطہ (۶) مثلث کے ایسے چار متصلہ اجزاء کے درمیان رشتہ کو ظاہر کرتا ہے جبکہ انہیں ایک دائرہ کے گرد لکھا جائے اب چونکہ ہم کسی ایک عنصر سے ابتدا کر سکتے ہیں اِس لیے اِس نمونہ کے چھ ضابطے ہیں۔



شکل (۲)

نمونہ (۶) کے ضابطوں کے لیے حسب ذیل قاعدہ دیا جاتا ہے[۱]:-

[۱] دیکھو علم مثلث کروی مصنفہ ٹوڈ ہنٹر صفحہ ۲۷ (سنہ ۱۹۰۳ء)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِن ضابطوں میں سے کسی ایک میں شریک ہونے والے زاویوں اور ضلعوں میں سے ایک زاویہ دو ضلعوں کے درمیان واقع ہوتا ہے اِس کو "داخلہ زاویہ" کہا جاسکتا ہے۔ اسی طرح ایک ضلع دو زاویوں کے درمیان واقع ہوتا ہے اِس کو "داخلہ ضلع" کہا جاسکتا ہے۔ تب ضابطہ کو اِس طرح بیان کیا جاسکتا ہے:—

(داخلہ ضلع کی جیب التمام) (داخلہ زاویہ کی جیب التمام)
= (داخلہ ضلع کی جیب) (دوسرے ضلع کا مماس التمام)
— (داخلہ زاویہ کی جیب) (دوسرے زاویہ کا مماس التمام)

مثلاً چار اجزاء ا، ب، ج، ب پر مشتمل ضابطہ لکھ لینے کے لیے ج داخلہ زاویہ ہے اور ا داخلہ ضلع، پس ضابطہ (۶) حاصل ہوتا ہے

جم ا جم ج = جب ا مم ب — جب ج مم ب

اگر دو ضلع ا، ج اور ا کے مقابل کا زاویہ ا دئے جائیں تو (۳) سے جب ج حاصل ہوتا ہے۔ اگر جب ج > ا تو یہ مسئلہ ناممکن ہے۔ اگر جب ج < ا تو یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ج کو اِس کی دو تکمیلی قیمتوں (۴) میں سے کونسی قیمت دینی چاہیئے اور جب تک کہ کوئی مزید بات معلوم نہ ہو جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ ج حادہ ہے یا منفرجہ یہ مسئلہ مبہم رہتا ہے۔

اگر دو زاوئے اور اِن میں سے ایک کے مقابل کا ضلع دئے جائیں تو ضابطہ (۳) سے دوسرے زاوئے کے مقابل کا ضلع معلوم ہوگا جو حسب سابق اُس ابہام کے تحت ہوگا جو قوس اور اس کے تکملہ کے درمیان ہوتا ہے۔

اگر اِن دو صورتوں میں ابہام کو رفع کرلیا جائے تو یہ مسئلہ اُس مسئلہ میں تحویل ہو جاتا ہے جس میں دو ضلع اور اِن دونوں ضلعوں کے مقابل کے زاوئے دئے گئے ہوں۔ مساواتوں (۱) اور (۲) سے حسب ذیل ضابطہ آسانی کے ساتھ اخذ کیا جاسکتا ہے

$$\text{مس ب} = \frac{\text{مس ا جم ج} + \text{مس ج جم ا}}{\text{ا — مس ا جم ج مس ج جم ا}}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اور (۲) سے یہ معلوم ہو گا کہ اس جملہ میں ب لینا چاہئے یا ۱۸۰° + ب -
عمل حساب میں اختصار پیدا ہو گا اگر ہم یہ فرض کریں کہ

مس طہ = مس ا جم ج ، مس فہ = مس ج جم ا

اس لیے ب = طہ + فہ

قطبی مثلث سے حاصل ہوتا ہے

$$-\text{مس ب} = \frac{\text{مس ا جم ج} + \text{مس ج جم ا}}{1 - \text{مس ا جم ج مس ج جم ا}}$$

جس سے ب معلوم ہوتا ہے کیونکہ ب اور ب + ۱۸۰° کے درمیان کا ابہام (۵) سے رفع ہو جاتا ہے - نیز اگر ہم رکھیں

مس طہ = مس ا جم ج ، مس فہ = مس ج جم ا

تو ب = ۱۸۰° - طہ - فہ

اگر کروی مثلث کے تین ضلع دئے گئے ہوں تو اس کا حل حسب تفصیل ذیل معلوم کیا جا سکتا ہے - فرض کرو کہ ۲ س = ا + ب + ج تو

$$\text{مس } \frac{1}{2} \text{ ا} = \sqrt{\frac{\text{جب (س - ب) جب (س - ج)}}{\text{جب س جب (س - ا)}}} \qquad (۷)$$

جس سے ا معلوم ہوتا ہے اور اسی طرح متشابہ ضابطوں سے ب اور ج معلوم ہوتے ہیں -

اگر تین زاوئے ا، ب، ج دئے جائیں تو رکھو

۲ س = ا + ب + ج

$$\text{مس } \frac{1}{2} \text{ ا} = \sqrt{-\frac{\text{جم س جم (س - ا)}}{\text{جم (س - ب) جم (س - ج)}}}$$

. . . . . (۸)

جس سے ا معلوم ہوتا ہے اور اسی طرح ب اور ج -

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۵) اگر مثلث قائم الزاویہ ہو تو اس اہم صورت میں ہم ج کو ۹۰° کے مساوی رکھتے ہیں اور (۱)، (۲) (۳) کے مانند ضابطوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ

جب ج جم ا = جم ا جب ب ..... (۹)

جم ج = جم ا جم ب ..... (۱۰)

جب ج جب ا = جب ا ..... (۱۱)

جم ا = مس ب مم ج ..... (۱۲)

مس ا = مس ا قم ب ..... (۱۳)

جم ا = جم ا قم ب ..... (۱۴)

قط ج = مس ا مس ب ..... (۱۵)

یہ ضابطے نیپیر کے قاعدوں کی مدد سے آسانی کے ساتھ لکھ لیے جا سکتے ہیں۔ اس میں مقداروں ا، ب، (۹۰° - ا)، (۹۰° - ج)، (۹۰° - ب) کو جو اکثر "دائری اجزاء" کہلاتے ہیں ایک دائرہ میں حسب شکل (۳) لکھا جاتا ہے۔ کسی ایک دائری جزو کو "درمیانی" سمجھو تو اس کے طرفین کے اجزاء "متصلہ" کہلاتے ہیں اور باقی دو "متقابلہ"۔ پھر نیپیر کے قاعدوں سے جو حسب ذیل ہیں (۱۰) تا (۱۵) ضابطوں کو لکھ لیا جاتا ہے:۔



شکل (۳)

درمیانی کی جیب = متصلوں کے مماسوں کا حاصل ضرب،

درمیانی کی جیب = متقابلوں کی جیوب التمام کا حاصل ضرب

اس طرح دس ضابطے حاصل ہو سکتے ہیں کیونکہ ان پانچ دائری اجزاء میں سے کسی ایک کو درمیانی جزو کے طور پر لے سکتے ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

یہ آسانی سے بتلایا جا سکتا ہے کہ جب کبھی کسی کروی مثلث کے دو ضلع اور ایک زاویہ، یا دو زاوے اور ایک ضلع دئے جائیں تو اس مثلث کو نیپیر کے قاعدوں کے ذریعہ حل کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ اس کے ایک راس سے مقابل کے ضلع پر عمود ڈالکر اسے دو قائم الزاویہ مثلثوں میں تقسیم کر دیا جائے (دیکھو مثال ۲ صفحہ ۱۱)۔

ربعی مثلث (ج = ۹۰°) کے ضابطے بھی اسی شکل (۳) سے لکھ لئے جا سکتے ہیں۔ چنانچہ محیط کے بیرونی جانب جو دائری اجزاء لکھے گئے ہیں ان پر نیپیر کے قاعدوں کا استعمال کرنے سے **ربعی مثلث** کے دس ضابطے حاصل ہوتے ہیں۔ مثلاً ا اور ۹۰° - ب کو درمیانی اجزاء لینے سے علی الترتیب ضابطے

جب ا = جب ا جب ج

اور جم ب = - مس ا مم ج

حاصل ہوتے ہیں۔

(۶) قائم الزاویہ مثلث اور ربعی مثلث کے درمیان جو رشتہ یہاں مضمر ہے اسے شکل (۴) میں دکھایا گیا ہے۔ اگر اب = ۹۰° اور ب ج کو ج' تک اتنا خارج کیا جائے کہ ب ج' = ۹۰° تو زاویہ ج' = ۹۰°، اب قائم الزاویہ مثلث ا ج' ج پر نیپیر کے قاعدوں کا استعمال کرنے سے ربعی مثلث ا ب ج کے ضابطے حاصل ہوتے ہیں۔



شکل (۴)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

لوکارتم ۔ مروجہ ترقیم جو مثلثی تفاعلوں کے لوکارتم لکھنے میں استعمال کی جاتی ہے حسب ذیل مثال سے واضح ہوگی ۔

۲۵° کی طبعی جیب التمام ۰٫۹۰۶۳۰۷۸ ہے اور

لوک جم ۲۵° = لوک ۰٫۹۰۶۳۰۷۸ - لوک ۱۰ = - ۰٫۰۴۲۷۲۴

منفی لوکارتموں کے استعمال کی تکلیف سے بچنے کے لئے اسے بعض اوقات ۱٫۹۵۷۲۷۶ T لکھا جاتا ہے جو

۰٫۹۵۷۲۷۶ + ۱ -

کا قائم مقام ہے ۔

ہم بالعموم جدولوں کے زیادہ مروج طریقہ کو اختیار کریں گے اور ہر مثلثی تفاعل کے لوکارتم میں ۱۰ کا اضافہ کرینگے ۔ اس تبدیلی کے بعد لفظ لوک کی بجائے صرف ل[1] استعمال کیا جائے گا ۔ مثلاً پچھلی مثال میں ل کو ۹٫۹۵۷۲۷۶ لکھا جا سکتا تھا ۔ زیادہ عام صورت میں

ل جم طہ = لوک جم طہ + ۱۰

اگر اس امر کا ظاہر کرنا ضروری ہو کہ وہ مثلثی تفاعل جس کا لوکارتم لیا گیا ہے ایک منفی عدد ہے تو اس لوکارتم کے بعد ہم بالعموم (ن) لکھیں گے ۔ مثلاً اگر کسی جملہ میں جم ۱۵۵° جزو ضربی کے طور پر واقع ہو تو ہم اس کا جدولی لوکارتم ۹٫۹۵۷۲۷۶ (ن) لکھیں گے جہاں ۹٫۹۵۷۲۷۶ = ل جم ۲۵°

(۷) اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی عمل حساب کے پہلے حصہ میں طہ متعین ہو جانے کے بعد اس کے بعض مثلثی تفاعلوں کو اس عمل حساب کے دوسرے حصہ میں استعمال کرنا پڑتا ہے ۔ اس دوسرے حصہ عمل میں یہ تصفیہ کرنا پڑتا ہے کہ آیا ہم وہ ضابطہ استعمال کریں جو ل جب طہ پر منحصر ہے یا وہ ضابطہ جو ل جم طہ پر منحصر ہے ۔ ہم جو ضابطہ چاہیں استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر طہ تقریباً صفر ہو یا تقریباً ۹۰° تو ان میں سے ایک ضابطہ غیر یقینی ہو جائے گا

[1] ل کو جدولی لوکارتم کہتے ہیں ۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اس لیے دوسرا ضابطہ استعمال کرنا چاہئے۔ پس ان اصولوں پر غور کرنا ضروری ہے جنکی بنا پر یہ تصفیہ کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ ایسے کوئی عام اصول مقرر کیے جا سکیں۔

ہم مان لیتے ہیں کہ عمل حساب میں کافی احتیاط کی گئی ہے اور جس حد تک جدولوں کی صحت اس کی اجازت دیتی ہے اسی حد تک یہ عمل عددی خطاؤں سے پاک ہے لیکن چونکہ خود جدولیں بھی کامل طور پر صحیح نہیں ہوتیں اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ طہ کی وہ قیمت جو حاصل ہوئی ہے صرف ایک تقریبی قیمت ہے۔ طہ کی قیمت میں اس خفیف غلطی کے باوجود عمل حساب کے آخری حصہ کو ہم معتد بہ طور پر غلط ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو عملی قاعدہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بہت سادہ ہے۔ یہ دو مقداریں ل جب طہ اور ل جم طہ بالعموم مساوی نہیں ہوتیں اور وہ ضابطہ جس میں بڑی مقدار شامل ہوتی ہے عمل حساب کے بقیہ حصہ میں استعمال کرنا چاہئے۔ یہ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ اگر طہ > (<) ۴۵° تو طہ میں ایک چھوٹی خطا کی وجہ سے جم طہ (جب طہ) کی بہ نسبت جب طہ (جم طہ) پر کم اثر پڑے گا۔

مثال ۱۔ بتاؤ کہ ضابطہ

جم ا جب ب = جم ا (جب ج + جم ب جم ج)

سے ضلع ا کس طرح متعین ہو سکتا ہے اگر

ا = ۱۱۷° ۱۱′ ۶″، ج = ۱۵۴° ۱۳′ ۵۴″، ب = ۱۰۸° ۳۰′ ۳۰″ دئے جائیں۔

ل جم ا ۹٫۷۷۱۰۶۲۴۴ (ن)،	ل جم ج ۹٫۹۵۴۵۱۲۳ (ن)،
ل جب ج ۹٫۶۳۸۲۲۳۰،	ل جم ب ۹٫۵۰۱۶۶۵۲ (ن)،
ل جم ا جب ج ۹٫۳۴۸۸۴۷۴ (ن)،	ل جم ج جم ب ۹٫۴۵۶۱۷۷۵
(طبعی) جم ا جب ج = ۰٫۲۲۳۲۷۸۹،	
" جم ج جم ب = +۰٫۲۸۵۸۷۵۹،	
" جم ا جب ب = +۰٫۰۶۲۵۹۷۰	
ل جم ا جب ب ۸٫۷۹۶۵۵۳۵	
ل جب ب ۹٫۹۷۶۹۳۵۴	

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ل مم ا ۸ ۱۹۶۱۸۱ ۹ ۸

∴ ا = ۸۶° ۱۳′ ۲۴″

(۸) مثال ۲ — قائم الزاویہ مثلثوں کے طریقہ سے ا اور ب معلوم کرو جبکہ ب = ۵۷° ۴۲′ ۳۹″، ج = ۱۹° ۱۸′ ۲″، (ا = ۱۲۰° ۱۲′ ۳۶″

اب پر عمود ج پ (= ع) کھینچو — تب

ل جب ب	۹ ۹۲۷۰۴۳۲
جب ا	۹ ۹۳۲۶۰۷۷
جب ع	۹ ۸۶۳۲۵۰۹ ∴ ع = ۴۰° ۵۵′ ۵۸″
مس ب	۱۰ ۱۹۹۳۴۵۴
جم (۱۸۰° − ا)	۹ ۷۰۱۷۱۵۴
مس م	۹ ۹۰۱۰۶۰۸ م = ۳۸° ۳۱′ ۴۵″
جم ع	۹ ۸۳۴۳۲۹۱
جم (ج + م)	۹ ۷۲۶۲۶۸۴
جم ا	۹ ۵۶۰۵۹۷۵ ا = ۶۸° ۴۰′ ۴۸″
مس ع	۱۰ ۰۲۹۳۲۱۸
قم (ج + م)	۱۰ ۰۷۲۳۸۸۷
مس ب	۱۰ ۱۰۱۷۱۰۵ ب = ۵۱° ۳۸′ ۵۵″



شکل (۵)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

۲ ۔ ڈلمبر اور نیپیر کی تمثیلات ۔

علم ہیئت کروی میں حسب ذیل مساواتیں بڑی فائدہ مند ہیں :۔

جب $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}$ (ا - ب) = جم $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}$ (ا - ب) (۱۶)

جب $\frac{1}{2}$ ج جم $\frac{1}{2}$ (ا - ب) = جب $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}$ (ا + ب) (۱۷)

جم $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}$ (ا + ب) = جم $\frac{1}{2}$ ج جم $\frac{1}{2}$ (ا - ب) (۱۸)

جم $\frac{1}{2}$ ج جم $\frac{1}{2}$ (ا + ب) = جب $\frac{1}{2}$ ج جم $\frac{1}{2}$ (ا + ب) (۱۹)

یہ مساواتیں گاؤس (Gauss) کی تمثیلات کے نام سے بھی مشہور ہیں مگر ان کا انکشاف فی الحقیقت ڈلمبر نے کیا تھا[1]

ڈلمبر کی تمثیلات چونکہ لوکارتمی عمل حساب میں ضابطوں (۱)، (۲)، (۳) اور (۴)، (۵)، (۶) کی بہ نسبت زیادہ سہولت و آسانی پیدا کرتی ہیں اسلیے کروی مثلثوں کے حل کرتے میں جبکہ ا، ب اور ج یا ا، ب اور ج دئے گئے ہوں انہیں ترجیح دیجاتی ہے ۔

ان ضابطوں کا یاد رکھنا اکثر تکلیف دہ ہے جب تک کہ رامبو (Rambaut)[2] کے قاعدہ سے مدد نہ لیجائے ۔

ہم مقداروں کی یہ دو صفیں

$\frac{1}{2}$ (ا + ب)، $\frac{1}{2}$ (ا - ب)، $\frac{1}{2}$ ج ؛

$\frac{1}{2}$ (ا + ب)، $\frac{1}{2}$ (ا - ب)، $\frac{1}{2}$ ج ،

[1] اس بیان اور ان ضابطوں کے لیے دیکھو علم مثلث کروی مصنفہ ٹوڈ ہنٹر صفحہ ۳۶ سنہ ۱۹۰۳ء

[2] دیکھو ڈاکٹر اے ۔ اے رامبو "Astronomische Nachrichten, No. 4135."

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۹) لکھتے ہیں جہاں ج = ۱۸۰° - ج - تب رامبو کا قاعدہ حسب ذیل ہے:-
ایک صف میں کا مجموعہ (فرق) ہمیشہ دوسری صف کی جیب التمام (جیب) کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے۔
چنانچہ ڈلمبر کی وہ تمثیل جس میں جب $\frac{1}{2}$ (ا - ب) شامل ہے حاصل کرنے کے لیے رامبو کے قاعدے سے مستنبط ہوتا ہے کہ
(۱) $\frac{1}{2}$ ج جیب کے ساتھ داخل ہونا چاہئے کیونکہ ا اور ب ایک فرق کے طور پر داخل ہوتے ہیں،
(۲) ا اور ب، فرق کے طور پر داخل ہونے چاہئیں کیونکہ $\frac{1}{2}$ (ا - ب) جیب کے ساتھ داخل ہوتا ہے،
(۳) $\frac{1}{2}$ (ا - ب) جیب کے ساتھ داخل ہونا چاہئے کیونکہ ا اور ب فرق کے طور پر داخل ہوتے ہیں،
(۴) $\frac{1}{2}$ ج جیب کے ساتھ داخل ہونا چاہئے کیونکہ ا اور ب فرق کے طور پر شامل ہوتے ہیں۔
پس یہ تمثیل لکھی جا سکتی ہے

جب $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}$ (ا - ب) = جب $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}$ (ا - ب)

= جم $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}$ (ا - ب)

ڈلمبر کی تمثیلات کے استعمال کی وضاحت کے لیے ہم وہ کروی مثلث لے سکتے ہیں جس میں

ا = ۶۲° ۴۸' ۵۴" ، ا = ۹۳° ۴۶' ۳۶"
ب = ۵۷° ۴۲' ۳۹" ، ب = ۷۱° ۲۹' ۳۰"
ج = ۲۵° ۴۶' ۶" ، ج = ۲۹° ۱۱' ۱۳"

ہم فرض کریں گے کہ ا، ب، ج دیے گئے ہیں اور ا، ب اور ج مطلوب ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

نیچے لکھی ہوئی عددی قیمتیں متناظر مثلثی تفاعلوں کے جدولی لوگارثم ہیں:

$\frac{1}{2}$ ج = ۱۴° ۳۵′ ۵٫۳۶″

$\frac{1}{2}(ا+ب) = ۶۰° ۱۵′ ۴۶٫۵″$ ، $\frac{1}{2}(ا-ب) = ۲° ۳۳′ ۵٫۷″$

جب $\frac{1}{2}(ا-ب)$	۸٫۶۴۸۶۲۸۶
جم $\frac{1}{2}$ ج	۹٫۹۸۵٫۵۷۸
	۸٫۶۳۴۳۸۶۴ = جب $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}(ا-ب)$
جب $\frac{1}{2}(ا+ب)$	۹٫۹۳۸۶٫۵۲
جب $\frac{1}{2}$ ج	۹٫۴۰۱۳۳۰۱
	۹٫۳۴۰۰۰۵۳ = جب $\frac{1}{2}$ ج جم $\frac{1}{2}(ا-ب)$
جم $\frac{1}{2}(ا-ب)$	۹٫۹۹۹۵۶۹۰
جم $\frac{1}{2}$ ج	۹٫۹۸۵٫۵۷۸
	۹٫۹۸۵۳۲۶۸ = جم $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}(ا+ب)$
جم $\frac{1}{2}(ا+ب)$	۹٫۶۹۵۴۹۹۹ (۱۰)
جب $\frac{1}{2}$ ج	۹٫۴۰۱۳۳۰۱
	۹٫۰۹۶۸۳۰۰ = جم $\frac{1}{2}$ ج جم $\frac{1}{2}(ا+ب)$

جم $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}(ا+ب)$	۹٫۹۸۵۳۲۶۸	$\frac{1}{2}(ا+ب)$ ۸۲° ۳۸′ ۳″
جم $\frac{1}{2}$ ج جم $\frac{1}{2}(ا+ب)$	۹٫۰۹۶۸۳۰۰	$\frac{1}{2}(ا-ب)$ ۱۱° ۸′ ۳۳″
مس $\frac{1}{2}(ا+ب)$	۰٫۸۸۸۴۹۶۸	ا = ۹۳° ۴۶′ ۳۶″
جب $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}(ا-ب)$	۸٫۶۳۴۳۸۶۴	$\frac{1}{2}(ا+ب)$ ۸۲° ۳۸′ ۳″
جب $\frac{1}{2}$ ج جم $\frac{1}{2}(ا-ب)$	۹٫۳۴۰۰۰۵۳	$\frac{1}{2}(ا-ب)$ ۱۱° ۸′ ۳۳″
مس $\frac{1}{2}(ا-ب)$	۹٫۲۹۴۳۸۱۱	ب = ۱۲° ۲۹′ ۳۰″
جب[لہ] $\frac{1}{2}$ ج جم $\frac{1}{2}(ا-ب)$	۹٫۳۴۰۰۰۵۳	

لہ جب $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}(ا-ب)$ کی بجائے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ جم $\frac{1}{2}(ا-ب) > $ جب $\frac{1}{2}(ا-ب)$۔ دیکھو صفحہ ۱۰۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جم $\frac{1}{2}$ (ا-ب)	۹٫۹۹۱۷۳۵۲
جب $\frac{1}{2}$ ج	۹٫۳۴۸۲۷۰۱
جم $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}$ (ا+ب)	۹٫۹۸۵۳۲۶۸
جب $\frac{1}{2}$ (ا+ب)	۹٫۹۹۶۴۰۱۲
جم $\frac{1}{2}$ ج	۹٫۹۸۸۹۲۵۶
جب $\frac{1}{2}$ ج	۹٫۳۴۸۲۷۰۱
جم $\frac{1}{2}$ ج	۹٫۹۸۸۹۲۵۶
مس $\frac{1}{2}$ ج	۹٫۳۵۹۳۴۴۵ $\frac{1}{2}$ ج ۱۲° ۵۳′ ۲″

اِس لیے ا = ۹۳° ۴۶′ ۳۶″ ، ب = ۷۱° ۲۹′ ۳۰″ ، ج = ۲۵° ۴۶′ ۶″

ڈلمبر کی تمثیلوں سے حسب ذیل چار ضابطے آسانی کے ساتھ حاصل ہوتے ہیں، یہ ضابطے نیپیر کے تمثیلوں کے نام سے مشہور ہیں۔

$$\text{مس}\frac{1}{2}(ا+ب) = \frac{\text{جم}\frac{1}{2}(ا-ب)}{\text{جم}\frac{1}{2}(ا+ب)}\ \text{مس}\frac{1}{2}\text{ج} \qquad (۲۰)$$

$$\text{مس}\frac{1}{2}(ا-ب) = \frac{\text{جب}\frac{1}{2}(ا-ب)}{\text{جب}\frac{1}{2}(ا+ب)}\ \text{مس}\frac{1}{2}\text{ج} \qquad (۲۱)$$

$$\text{مس}\frac{1}{2}(ا+ب) = \frac{\text{جم}\frac{1}{2}(ا-ب)}{\text{جم}\frac{1}{2}(ا+ب)}\ \text{مم}\frac{1}{2}\text{ج} \qquad (۲۲)$$

$$\text{مس}\frac{1}{2}(ا-ب) = \frac{\text{جب}\frac{1}{2}(ا-ب)}{\text{جب}\frac{1}{2}(ا+ب)}\ \text{م}\frac{1}{2}\text{ج} \qquad (۲۳)$$

نیپیر کی تمثیلوں کے ذریعہ مثلث کا حل معلوم کرنے کے لیے حسب ذیل

۱؎ جم $\frac{1}{2}$ ج جم $\frac{1}{2}$ (ا+ب) کی بجائے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ جب $\frac{1}{2}$ (ا+ب) ~ جم $\frac{1}{2}$ (ا+ب)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال دی جاتی ہے:-

ا = ۲۳° ۲۷′ ، ب = ۷° ۱۵′ ، ج = ۲۹° ۴۷′

ہم چار ہندسی لوکارتم استعمال کریں گے جو اکثر مقاصد کے لیے کافی صحیح ہیں۔

ل جم ½ (ا - ب) = ۹٫۹۹۵۶ ، ل جب ½ (ا - ب) = ۹٫۱۴۸۹

ل قط ½ (ا + ب) = ۰٫۰۱۵۸ ل قم ½ (ا + ب) = ۰٫۵۷۷۲

ل مس ½ ج = ۹٫۸۸۰۹ ل مس ½ ج = ۹٫۸۸۰۹

ل مس ½ (ا + ب) = ۹٫۸۹۲۳ ل مس ½ (ا - ب) = ۹٫۶۰۷۰

½ (ا + ب) = ۵۸° ۳۷′ ½ (ا - ب) = ۲۲° ۲′

∴ ا = ۶۰° ۰′ ، ب = ۵۶° ۱۵′

اب چونکہ ½ (ا - ب) اور ½ (ا + ب) دونوں < ۴۵° اسلیے ج معلوم کرنے کے لیے ضابطہ (۲۲) مناسب ہے جسے لکھا جا سکتا ہے

مس ½ ج = جم ½ (ا - ب) قط ½ (ا + ب) مم ½ (ا + ب)

پس ل جم ½ (ا - ب) = ۹٫۹۶۷۱

ل قط ½ (ا + ب) = ۰٫۱۰۳۳

ل مم ½ (ا + ب) = ۰٫۵۶۱۴

ل مس ½ ج = ۰٫۶۳۱۸ ، ج = ۱۵۳° ۴۳′

۳ - صحت جو لوکارتمی عمل حساب میں حاصل ہو سکتی ہے۔

جب کسی مثلثی تفاعل کا لوکارتم دیا جاتا ہے تو بالعموم کافی صحت کے ساتھ زاویے کا معلوم کرنا ممکن ہے۔ لیکن اکثر ایسی صورتیں پیش آتی ہیں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جن میں یہ بیان کلاً درست نہیں ہوتا۔

مثالاً فرض کرو کہ ہم اپنے لوکارتموں میں صرف پانچ ہندسے رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ط رشتہ ذیل سے معلوم ہو

ل جب ط = ۹٫۹۹۹۹۸

اس رشتہ سے اس سے زیادہ معلوم نہیں ہوتا کہ ط، ۸۹° ۲۳' ۷" اور ۸۹° ۳۱' ۲۵" کے درمیان کہیں واقع ہونا چاہئے۔ اگر ہم لوکارتموں میں اعشاریہ کے سات مقامات بھی استعمال کریں تو بھی ابہام ہمیشہ رفع نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہم دیکھتے ہیں کہ ۸۹° ۵۶' ۱۹" سے ۸۹° ۵۷' ۸" تک ہر زاویہ کے ل جب کی وہی جدولی قیمت ۹٫۹۹۹۹۹۹۸ ہے۔

پس ہم دیکھتے ہیں کہ ۹۰° کے قریب زاوئے، ل جب سے اچھی طرح متعین نہیں ہوتے۔ اسی طرح صفر کے قریب زاوئے، ل جم سے اچھی طرح متعین نہیں ہوتے۔ لیکن سب زاوئے، ل مس سے صحت کے ساتھ معلوم کئے جا سکتے ہیں جیسا کہ اب ہم ثابت کریں گے۔

اگر ط میں ایک چھوٹا اضافہ ھ یا ھ جب آ (دائری ناپ میں) کیا جائے اور ل۔ مس ط میں اعشاریہ کے ۷ ویں مقام میں لا اکائیوں کا اضافہ ہو تو ھ اور لا کے درمیان مساوات معلوم کرنا ہوگا۔

عام لوکارتموں کو نیپیری لوکارتموں میں مقیاس ۲۳۰۲۵۸۵۱ء۔ کے ذریعہ تبدیل کرنے سے حاصل ہوتا ہے (۱۲)

لا/۱۰۰۰۰۰۰ = ۲۳۰۲۵۸۵۱ء۔ لوک مس (ط + ھ جب آ) − ۲۳۰۲۵۸۵۱ء۔ لوک مس ط

= ۲۳۰۲۵۸۵۱ء۔ لوک (۱ + ھ جب آ مم ط)

− ۲۳۰۲۵۸۵۱ء۔ لوک (۱ − ھ جب آ مس ط)

اس لئے ان لوکارتموں کو پھیلانے سے

لا = ۲۳۰۲۵۸۵۱ جب آ (مس ط + مم ط) ھ، تقریباً

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اسے لکھا جا سکتا ہے

$$ه = \text{لاجب } ۲ \text{ طه} \setminus ۱ ۱ ۲ ۴$$

ه کی بڑی سے بڑی قیمت لا \ ۱ ۱ ۲ ۴ ہے اس لئے طه کی محسوبہ قیمت جبکہ ل مس طه دیا گیا ہو اً غلط نہیں ہو سکتی الّا آنکہ ل مس طه خود ۰٫۰۰۰۰۰ ۴۲ کی حد تک غلط ہو۔

مثال ۱۔ ثابت کرو کہ جب پانچ ہندسی لوگارتم استعمال کئے جائیں اور عمل حساب آخری اعشاریہ میں دو اکائیوں کے اندر تک ٹھیک ہو تو کسی زاوئے کی خطا جو اس کے جاس سے متعین کیا گیا ہو ۵ ثانیوں سے بڑھ نہیں سکتی۔

مثال ۲۔ کسی زاوئے کے ل جب کے آخری اعشاریہ میں ایک اکائی کے تغیر سے اس زاویہ کی قیمت میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے اس کی تحقیق کرو اور بتاؤ کہ تمام صورتوں میں زیادہ صحت اس میں ہے کہ اس زاویہ کو اس کی جیب کی بجائے اس کے جاس سے متعین کیا جائے۔

مثال ۳۔ ثابت کرو کہ اگر طه ایک چھوٹا زاویہ ہو تو اس کی قیمت ثانیوں میں اس جملہ

$$\text{قم } \text{اً جب طه } (\text{قط طه})^{\frac{۳}{۲}}$$

سے تقریبی طور پر حاصل ہوتی ہے اور بتاؤ کہ اگر طه ۱۰ کے اتنا بڑا بھی ہو تو یہ جملہ اً کی حد تک غلط نہیں ہوگا۔

مثال ۴۔ اگر طه ایک چھوٹا زاویہ ہو جسے ثانیوں میں بیان کیا گیا ہے تو ثابت کرو کہ

$$\text{ل جب طه} = \text{لوک طه} + \text{س}$$

جہاں $\text{س} = \frac{۱}{۳}(۲۰ + \text{ل جم طه}) - ۵٫۳۱۴۴۲۵۱$

اور مثالاً ثابت کرو کہ اگر طه = ۲۰٫۲۰۷۴ً تو

$$\text{ل جب طه} = ۸٫۰۰۲۴۱۸۲$$

مقدار س برہن (Bruhn) کی جدولوں میں دیجاتی ہے۔

مثال ۵۔ طه کی قیمت معلوم کرو اگر ل جب طه = ۸٫۰۱۲۳۴۵۶

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اُن جدولوں سے جو بیگے (Bagay) کی جدولوں کی مانند ہوں ہر ثانیہ کیلئے مثلثی تفاعلوں کی قیمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ اِن سے معلوم ہوگا کہ مطلوبہ زاویہ ° ۳۵ ′ ۳۲ ″ سے زیادہ فرق نہیں رکھتا اور یہ فرق ایک ثانیہ کی چھوٹی کسر سے زیادہ نہیں ہے۔ اِس کسر کو معلوم کرنے کے لیے ہم س = $\frac{1}{3}$ (۲۰ + ل جم طہ) - ۵٫۳۱۴۴۲۵۱ کا حساب لگاتے ہیں جو ل جم طہ میں طہ کی بجائے ° ۳۵ ′ ۳۲ ″ درج کرنے سے ۴٫۶۸۵۵۶۷۲ ہو جاتا ہے۔

تب مساوات لوک طہ = ل جب طہ - س سے

طہ = ۲۱۲۲٫۱۶ ″

۴ - کروی مثلث میں تفرقی ضابطے۔

کوئی چھ زاوئے ا، ب، ج، ا، ب، ج بالعموم کروی مثلث کے ضلع اور زاوئے نہیں ہوں گے۔ اگر ایسا ہو تو اِن زاویوں کو تین شرطیں پوری کرنی ہوں گی۔ یہ اِس امر سے ظاہر ہے کہ اگر فی الواقعی یہ چھ مقداریں ایک مثلث کے اجزا ہیں تو اِن میں سے کوئی تین دئے جانے پر دوسری تین مقداریں متعین ہونی چاہئیں۔

مان لو کہ یہ چھ مقداریں فی الواقعی ایک کروی مثلث کے اجزا ہیں اور فرض کرو کہ اِن سب میں علی الترتیب چھوٹے اضافے مف ا، مف ب، مف ج، مف ا، مف ب، مف ج کئے گئے ہیں۔ اِن مقداروں کو اِس طرح متغیر کرنے کے بعد وہ بالعموم کسی کروی مثلث کے اجزا نہ رہینگے۔ اگر وہ کسی کروی مثلث کے اجزا ہوں تو انہیں تین شرطیں پوری کرنی چاہئیں جنہیں ہم اب معلوم کریں گے۔

اساسی ضابطہ

جم ا = جم ب جم ج + جب ج جب ب جم ا

کو تفرق کرو تو

- جب ا مف ا = - جب ب جم ج مف ب - جم ب جب ج مف ج

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

+جم ب جب ج جم ا مف ب + جب ب جم ج جم ا مف ج
- جب ب جب ج جب ا مف ا

لیکن دفعہ (۱) کے ضابطہ (۲) سے

جب ا جم ب = جم ب جب ج - جب ب جم ج جم ا
جب ا جم ج = جب ب جم ج - جم ب جب ج جم ا

اس لئے درج کرنے اور متشابہ ضابطوں کو ساتھ لکھنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\left.\begin{array}{l} \text{مف ا} = \text{جم ج مف ب} + \text{جم ب مف ج} + \text{ھ جب ب جب ج مف ا} \\ \text{مف ب} = \text{جم ا مف ج} + \text{جم ج مف ا} + \text{ھ جب ج جب ا مف ب} \\ \text{مف ج} = \text{جم ب مف ا} + \text{جم ا مف ب} + \text{ھ جب ا جب ب مف ج} \end{array}\right\} \ldots (۱)$$

جہاں ھ = جب ا / جب ا = جب ب / جب ب = جب ج / جب ج

اسی طرح عمل کرو تو ضابطوں (۴) اور (۵) سے حسب ذیل مساواتیں حاصل ہونگی

$$\left.\begin{array}{l} \text{مف ا} = -\text{جم ج مف ب} - \text{جم ب مف ج} + \text{ھ}' \text{جب ب جب ج مف ا} \\ \text{مف ب} = -\text{جم ا مف ج} - \text{جم ج مف ا} + \text{ھ}' \text{جب ج جب ا مف ب} \\ \text{مف ج} = -\text{جم ب مف ا} - \text{جم ا مف ب} + \text{ھ}' \text{جب ا جب ب مف ج} \end{array}\right\} (۲)$$

پس ہم نے یہ ثابت کردیا کہ اگر ا، ب، ج، ا، ب، ج ایک کروی مثلث کے اجزاء ہوں تو مساواتوں (۱) یا (۲) میں سے کسی ایک جٹ سے وہ تین ضروری اور کافی شرطیں بیان ہوتی ہیں کہ

ا + مف ا، ب + مف ب، ج + مف ج، ا + مف ا، ب + مف ب، ج + مف ج بھی ایک کروی مثلث کے اجزاء ہوں۔

(۱۴) اگر ان تفرقوں میں سے تین صفر ہوں تو بقیہ تین تفرقے بھی بالعموم صفر ہوں گے۔ یہ امر مساواتوں سے ظاہر ہے اور نیز اس امر سے بھی کہ اگر کسی کروی مثلث کے تین اجزاء نہ بدلیں تو دوسرے تین اجزاء بھی بالعموم نہیں بدلینگے۔ اس بیان کی ایک مستثنیٰ صورت ذیل کی مثال سے ملتی ہے۔ فرض کرو کہ ج = ۹۰° اور مف ب = ۰، مف ج = ۰، مف ب = ۰۔ اس صورت میں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(آ) کی دوسری مساوات سے یہ لازم نہیں آئے گا کہ مف ا = ۰

مثال ۱ — کن شرطوں کے تحت کروی مثلث میں ایک ایسی چھوٹی تبدیلی کی جاسکتی ہے کہ مف ا = ۰، مف ب = ۰، مف ا = ۰، مف ب = ۰ لیکن مف ج اور مف ج دونوں صفر نہ ہوں۔

(۲) سے ہم دیکھتے ہیں کہ ا = ۹۰°، ب = ۹۰°، اس لیے ا = ۹۰°، ب = ۹۰°

مثال ۲ — اگر ایک کروی مثلث میں ایسی چھوٹی تبدیلی کی جائے جس سے اس کے تین زاویوں کا مجموعہ نہ بدلے تو ثابت کرو کہ ضلعوں کے طولوں میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ شرط

مف ا جب (س - ا) + مف ب جب (س - ب)
+ مف ج جب (س - ج) = ۰

کو پورا کرتی ہیں جہاں س = ½ (ا + ب + ج)

۵ — بینی ادراج کا فن۔

علم ہیئت کے حسابات میں نہ صرف لوکارتمی جدولوں کا استعمال کیا جاتا ہے بلکہ بہت سی اور جدولوں کا بھی مثلاً وہ جدولیں جو ایفیمرس[1] میں پائی جاتی ہیں۔ بینی ادراج کا فن ان عام اصولوں سے متعلق ہوتا ہے جن پر ایسی جدولوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔

فرض کرو کہ ما ایک مقدار ہے جس کی قیمت، دوسری مقدار لا کی قیمت پر منحصر ہے۔ تب ہم کہتے ہیں کہ ما، لا کا ایک تفاعل ہے ان کے رشتہ کو اس طرح

ما = ف (لا) (آ)

سے ظاہر کیا جاتا ہے جہاں ف (لا) سے لا کا کوئی تفاعل تعبیر ہوتا ہے۔ اس عام شکل میں

ما = لوک لا یا ما = ل مس لا

[1] Ephemeris

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جیسی مخصوص صورتیں شامل ہیں۔

فرض کرو کہ لا کو ایک قیمت صفر دی گئی ہے تو اس کے جواب میں ما کی قیمت ما۰ رشتہ ما = ف (۰) سے حاصل ہوگی۔ فرض کرو کہ اس کے بعد (۱) میں لا کی بجائے متواتر ھ، ۲ ھ، ۳ ھ، .... درج کئے گئے ہیں اور ان کے جواب میں ما کی قیمتیں علی الترتیب ما۱، ما۲، ما۳ .... حاصل ہوتی ہیں۔ تب کسی جدول کا لازمی خاصہ یہ ہے کہ اس کے ایک ستون میں ہم لا کی قیمتیں یعنے ۰، ھ، ۲ ھ، .... رکھتے ہیں اور دوسرے ستون میں ما کی متناظر قیمتیں یعنے ما۰، ما۱، ما۲، ..... ۔

(۱۵) لا کی قیمت جسے اکثر دلیل کہتے ہیں مساوی وقفوں ھ سے برابر آگے بڑھتی ہے اور ما کی ہر متناظر قیمت کو جسے اکثر تفاعل کہتے ہیں اتنی زیادہ صحت کے ساتھ محسوب کیا جاتا ہے جتنی اس مقصد کے لیے ضروری ہے جس کے لیے جدول تیار کی جا رہی ہے۔

ما = ف (لا) کی جدول

لا	ما
۰	ما۰
ھ	ما۱
۲ ھ	ما۲
۳ ھ	ما۳
.....	.....

ایسی کسی جدول کی غایت یہ ہوتی ہے کہ اس سے دلیل کی دی ہوئی قیمت کے جواب میں تفاعل کی قیمت معلوم ہو یا تفاعل کی دی ہوئی قیمت کے جواب میں دلیل کی قیمت معلوم ہو۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تفاعل کی عددی قیمت کو ایسی دلیل کے جواب میں معلوم کرنا ہوتا ہے جبکہ یہ دلیل صریحاً جدول میں موجود نہ ہو بلکہ وہ دلیل کی دو متصلہ جدولی قیمتوں کے درمیان واقع ہو۔ اس کا عکس بھی اکثر درپیش ہوتا ہے یعنی تفاعل کی دی ہوئی قیمت کے جواب میں دلیل کی قیمت معلوم کرنا پڑتا ہے جبکہ تفاعل کی دی ہوئی قیمت دو متصلہ جدولی قیمتوں کے درمیان واقع ہو۔ ممکن ہے پہلے یہ خیال آئے کہ ان میں سے کسی صورت میں ہم اصلی مساوات (آ) کی طرف رجوع ہوں اور اس سے مطلوبہ قیمتیں معلوم کریں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے تفاعلی رشتہ کی خاصیت جدول میں اسقدر سرایت کر جاتی ہے کہ جب لا اور ما میں سے کوئی ایک دیا جائے تو دوسرا بینی اور اج کے فن سے جسکی تشریح اب کی جائے گی حاصل کیا جا سکتا ہے۔

اس فن کی نوعیت سب سے زیادہ صاف طور پر علم ہندسہ کے ذریعہ واضح کی جا سکتی ہے۔ ہم منحنی ما = ف (لا) کو معمولی طریقہ سے مرتسم کر سکتے ہیں۔ مبداء و سے محور لا پر نقطوں ل، ل۱، ل۲، ل۳ ... کا نشان لگاؤ جو و سے علی الترتیب ھ، ۲ھ، ۳ھ، ..... فاصلوں پر ہوں ضابطہ ما = ف (لا) سے ما کی متناظر قیمتیں ما، ما۱، ما۲، ما۳ ... محسوب کرو۔ پھر ل، ل۱ ... (شکل ۶) پر معین ل ب، ل۱ ب۱، ل۲ ب۲ .... قائم کرو جو علی الترتیب قیمتوں ما، ما۱، ما۲ .... کے مساوی ہوں۔ نقطے ب، ب۱، ب۲، ب۳ وغیرہ بالعموم ایسے واقع ہوں گے کہ ان میں سے گذرتا ہوا ایک منحنی صاف طور پر کھینچا جا سکے گا۔ اگر نقطے ل، ل۱ .... کافی طور پر باہم نزدیک ہوں یعنے اگر ھ کافی



شکل (۶)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

چھوٹا ہو تو منحنی کی شکل اسقدر صاف طور پر واضح ہوگی کہ کسی قسم کے ابہام کا بہت کم امکان ہوگا اور منحنی ما = ف (لا) جو ب، ب۲، ب۳ میں سے گذرتا ہے ان حدود کے اندر اس منحنی سے زیادہ فرق نہیں رکھے گا جو ابھی ان نقطوں میں سے کھینچا گیا ہے۔ بلاشبہ حقیقی منحنی تفاعل ما = ف (لا) کی نوعیت پر منحصر ہوگا۔ لیکن چونکہ بینی ادراج کے فن میں ہمیں منحنی کے صرف ایک چھوٹے حصے سے واسطہ رہے گا اس لیے زیر بحث منحنی کی مخصوص خاصیتوں پر غور کرنا غیر ضروری ہے۔

پس موجودہ مقصد کے لیے اصل منحنی ما = ف (لا) کا استعمال ضروری نہیں ہے بلکہ کسی لثمی منحنی کا۔ ہم پہلے لثمی دائرہ لیتے ہیں جو بینی ادراج کی حد تک کافی طور پر صحیح ہو۔ بالعموم ایسا دائرہ کھینچنا ممکن ہوتا ہے جس کی قوس دیے ہوئے منحنی کی قوس کے ساتھ کسی دیے ہوئے نقطہ پر اسقدر عین منطبق ہو کہ چھوٹے فاصلے کے لئے دائرہ کا منحنی سے اختلاف ناقابل قدر ہو۔ اس لیے ہم اس چھوٹے حصے کو جس سے ہمیں واسطہ ہے دائری قوس کے طور پر تصور کر سکتے ہیں خواہ اصل منحنی کچھ بھی ہو۔ چنانچہ ہم ب۱، ب۲، ب۳ میں سے گذرتا ہوا ایک دائرہ کھینچتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ب۱ اور ب۳ کے درمیان کسی نقطہ ب کے لیے دائرہ کا معین، لا کی قیمت کے جواب میں ما کی قیمت ہے۔ مثلاً اگر اب معین ہو تو اب تفاعل کی قیمت ہے جبکہ لا = و ا۔ ہم اب کے لیے ایک جملہ معلوم کرنے میں اس دائرہ کا استعمال کریں گے، اس جملہ میں صرف نقطہ ب کا فاصلہ اور نقاط ب۱، ب۲، ب۳ کے محدد شریک ہوں گے۔ بلاشک یہ، ما کی وہ قیمت نہیں ہوگی جو ضابطہ ما = ف (لا) سے حاصل ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ فرق بھی نہیں رکھیگی۔

فرض کرو کہ ت م ن ایک دائرہ ہے اور ت پر اس کا مماس ت ل ہے۔ فرض کرو کہ ل ن اور ل ن دو خط ہیں جو دونوں محور لا پر عمود ہیں۔ تب دائرہ کی خاصیت کی رو سے

(شکل ۷) (۱۷)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$ل م \times ل ن = ل ت^{۲}،$$
$$ل مَ \times ل نَ = ل تَ^{۲}،$$

اس لیے

$$\frac{ل م}{ل مَ} = \frac{ل ت^{۲}}{ل تَ^{۲}} \times \frac{ل نَ}{ل ن}$$

اب فرض کرو کہ ل ن

اور ل نَ، ت کے انتہائی

قریب آتے ہیں تب $\frac{ل نَ}{ل ن} = ۱$، اور



شکل (۷)

$$ل م : ل مَ :: ل ت^{۲} : ل تَ^{۲}$$

اب چونکہ نقطہ تماس کے قرب میں منحنی کی قوس اس کے لمسی دائرہ کی قوس سے ناقابل امتیاز ہے اس لیے ہمیں بینی ادراج کا اصول حاصل ہوتا ہے جسے اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے :-

اگر مماس ت ل کھینچا گیا ہو جو منحنی کو ت پر مس کرتا ہے اور ت کے متصل، ل م ایک معین ہو تو مماس اور منحنی کے درمیان معین کا مقطوعہ ل م، ت ل کے مربع کے متناسب ہوگا۔

شکل (۸) میں و مبداء، ب کا معین ما اور ت کا معین ما، ہے۔ پس ب پ ایسے بدلتا ہے جیسے پ ت^{۲} اور اس لیے ایسے بدلتا ہے جیسے ج ت^{۲}۔ نیز ج پ ایسے بدلتا ہے جیسے ج ت۔ پس



شکل (۸)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اگر ب کا فاصلہ لا ہو تو

$$ما - ما_ب = ل لا + م لا^2$$

جہاں ل اور م ، ت کے قریبی نقطوں کے لیے مستقل ہیں۔ صریحاً یہ ایک مکافی کی مساوات ہے۔

مستقلوں ل اور م کو لَ اور مَ میں بدل کر ہم مساوات بالا کو لکھ سکتے ہیں

$$ما = ما_ب + لَ لا + مَ لا (لا - ھ)$$

ہم لَ اور مَ کو اس امر پر غور کر کے معلوم کرتے ہیں کہ (ھ ، $ما_1$) ، (۲ھ ، $ما_2$) منحنی پر کے نقطے ہوں۔ پہلے نقطہ سے حاصل ہوتا ہے

$$لَ = \frac{ما_1 - ما_ب}{ھ}$$

اور (۱۸) لا = ۲ ھ ، ما = $ما_2$ رکھنے سے حاصل ہوتا ہے

$$ما_2 = ما_ب + ۲(ما_1 - ما_ب) + ۲ ھ^2 مَ$$

یا

$$مَ = \frac{ما_2 - ۲ ما_1 + ما_ب}{۲ ھ^2}$$

اور اس لیے مساوات ہو جاتی ہے

$$ما = ما_ب + \frac{لا}{ھ}(ما_1 - ما_ب) + \frac{لا(لا - ھ)}{۲ ھ^2}(ما_2 - ۲ ما_1 + ما_ب) \quad \ldots\ldots (۱)$$

فرض کرو کہ تفاعل ما کی تین متصل قیمتیں $ما_ب$ ، $ما_1$ ، $ما_2$ ہیں جہاں ھ دلیل کی دوسری اور پہلی قیمتوں کے درمیان فرق ہے اور نیز تیسری اور دوسری قیمتوں کے درمیان۔ پس کسی دلیل کے جواب میں جو پہلی دلیل سے بقدر لا کے بڑی ہو لیکن دوسری دلیل سے چھوٹی ہو مندرجۂ بالا ضابطہ سے تفاعل کی مطلوبہ قیمت حاصل ہوتی ہے۔

اس ضابطہ میں جو مستقل ہیں ان کی قیمتیں بہت آسانی کے ساتھ جداول سے فرقوں کے طریقہ کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں :-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

	فرق اول	فرق دوم
$ما_0$		
	$ما_1 - ما_0$	
$ما_1$		$ما_2 - ۲ ما_1 + ما_0$
	$ما_2 - ما_1$	
$ما_2$		

پہلے ستون میں ما کی تین متصل قیمتیں ہیں۔ دوسرے ستون میں ہر قیمت اور اس کی ماقبل قیمت کے درمیان کے فرق ہیں تیسرے میں دوسرے ستون کے متصلہ ارقام کے فرق درج ہیں۔ تیسرے اور اس سے اعلیٰ تر فرق بھی حسب ضرورت اسی طرح معلوم کئے جا سکتے ہیں۔

اگر ہم اختصار کے مدنظر $ما_1 - ما_0 \equiv ط$ اور $ما_2 - ۲ ما_1 + ما_0 \equiv طَ$ لکھیں اور لا کی جگہ ت رکھیں کیونکہ وقت (ت) ہیئتی مسائل میں بالعموم متبوع متغیر ہوتا ہے اور اگر فرق ہ کو وقت کی اکائی بنائیں تو مساوات بالا ہو جاتی ہے

$$ما = ما_0 + ت\, ط + \frac{ت(ت-۱)}{۲} طَ$$

اس آخری مساوات کو ت کے لحاظ سے تفرق کرو تو ت کے لحاظ سے ما جس شرح سے بدلتا ہے وہ

$$\frac{\text{فرما}}{\text{فرت}} = ط - \frac{۱}{۲} طَ + ت\, طَ$$

ہے جس سے یہ ظاہر ہے کہ اضافہ کی شرح خود یکساں طور پر بڑھتی ہے۔

(۱۹) وقت کی دو اکائیوں میں تفاعل کی قیمت $ما_0$ سے $ما_2$ تک بڑھتی ہے اس لیے اس کے اضافہ کی اوسط شرح فی اکائی وقت $\frac{۱}{۲}(ما_2 - ما_0)$ ہے اور چونکہ یہ شرح یکساں طور پر بڑھتی ہے اس لیے یہ اپنی اوسط قیمت اس وقت اختیار کرے گی جبکہ نصف وقت گذر چکا ہو یعنے جبکہ تفاعل کی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

قیمت ما ہو۔ پس ہم حسب ذیل نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔

کسی آن ت پر تفاعل جس شرح سے تی اکائی وقت بدلتا ہے وہ، تفاعل کی اُن قیمتوں کے فرق کا نصف ہے جو تفاعل، ت کے بعد وقت کی ایک اکائی پر اور ت سے قبل وقت کی ایک اکائی پر اختیار کرتا ہے۔

بینی اوراج کے عمل کو تیز تر کرنے کے لیے ایفیمرس میں اکثر ایک اور ستون کا اضافہ کیا جاتا ہے جس سے متناظر لمحہ پر تفاعل کے تغیر کی شرح، حاصل ہوتی ہے۔ ہم اسے ایک مثال سے واضح کریں گے۔

فرض کرو کہ چاند کا جنوبی میل بتاریخ ۶ ستمبر ۱۹۰۵ء گرینوچ کی اوسط دوپہر کے ۱۵ + ت گھنٹوں بعد معلوم کرنا ہے۔

۱۵ گھنٹوں گ - ا - و (گرینوچ اوسط وقت) پر چاند کا جنوبی میل، ایفیمرس سے ۱۸° ۳۸′ ۱۳٫۱″ حاصل ہوتا ہے اور ۱۰ منٹ میں تغیر ۵۵٫۲۳″ ہے، چاند جنوب کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ اسی دن ۱۶ گھنٹوں پر جدول کی دوسری سطر سے ۱۰ منٹ میں تغیر ۴۱٫۲۲″ حاصل ہوتا ہے اور چونکہ تغیر کی شرح یکساں طور پر گھٹتی ہوئی تصور کی جا سکتی ہے اس لیے دوپہر کے بعد (۱۵ + ½ ت) گھنٹوں پر تغیر فی دس منٹ یہ ہے

۵۵٫۲۳″ - ۵۷٫۰″ ت

تغیر کی اس اوسط شرح کو ۱۵ گھنٹوں اور ۱۵ + ت گھنٹوں کے درمیان پورے وقفہ کے لیے مان لیا جا سکتا ہے اور چونکہ ت کو گھنٹوں میں بیان کیا گیا ہے اس لیے اس وقفہ میں کل تغیر اوسط شرح کو ۶ ت سے ضرب دینے سے حاصل ہوتا ہے۔ پس چاند کا جنوبی میل بتاریخ ۶ ستمبر ۱۹۰۵ء ۱۵ + ت گھنٹوں پر حسب ذیل ہے

۱۸° ۳۸′ ۱۳٫۱″ + ۳۱۴۱٫۳″ ت - ۳۴۲٫۳″ ت²

بینی اوراج کے ضابطے مسئلہ بالا کے معکوس مسئلہ میں وہ وقت معلوم کرنے کے لیے بھی استعمال کئے جاتے ہیں جس پر کوئی خاص تفاعل

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کوئی مقررہ قیمت اختیار کرتا ہے۔ مثالاً فرض کرو کہ ۶ ستمبر ۱۹۰۵ء کو وقت معلوم کرنا ہے جبکہ چاند کا جنوبی میل ۱۸° ۴۰′ ہے۔ مساوات بالا سے

۱۸۰° ۴۰′ = ۱۸° ۳۸′ ۱۲٫۱″ + ۱۳۴۱٫۳″ ت − ۴۲٫۳″ ت²

یہ مساوات ت میں دو درجی ہے اور آخری رقم کو نظر انداز کرنے سے مطلوبہ اصل تقریباً ۰٫۸۶ معلوم ہوتی ہے۔ اصلی مساوات میں اس قیمت کو ت² میں درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

۱۱۸٫۸ = ۱۳۴۱٫۳ ت − ۲٫۵۳

اس لیے ت = ۰٫۸۵۹ اور مطلوبہ وقت ہے ۱۵گ ۵۱م ۳۰ش (گ = گھنٹے، م = منٹ، ش = ثانیے) (۲۰)

— مساوات درجۂ دوم کی دوسری اصل ہمارے مقصد کے لیے بے کار ہے۔

مندرجۂ بالا بینی ادراج کے اساسی ضابطہ کی تعمیم آسانی سے ہو سکتی ہے۔ مان لو کہ

ما = ل۰ + ل۱ ت + ل۲ ت (ت − ۱) + ل۳ ت (ت − ۱) (ت − ۲)

+ ل۴ ت (ت − ۱) (ت − ۲) (ت − ۳)

جہاں نامعلوم سروں ل۰، ل۱، ل۲، ل۳، ل۴ کی قیمتیں اس طرح مقرر کرنا ہے کہ جب، ت بتدریج ۰، ۱، ۲، ۳، ۴ ہو جائے تو ما علی الترتیب قیمتیں

ما۰، ما۱، ما۲، ما۳، ما۴ اختیار کرے۔

پس درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

ما۰ = ل۰،

ما۱ = ل۰ + ل۱،

ما۲ = ل۰ + ۲ ل۱ + ۲ ل۲،

ما۳ = ل۰ + ۳ ل۱ + ۶ ل۲ + ۶ ل۳،

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$م_۴ = ل_۰ + ۴ ل_۱ + ۱۲ ل_۲ + ۲۴ ل_۳ + ۲۴ ل_۴$$

اس لیے

$$ل_۰ = ما_۰ ،$$

$$ل_۱ = ما_۱ + ما_۰ ،$$

$$ل_۲ = \frac{۱}{۲} (ما_۲ - ۲ ما_۱ + ما_۰) ،$$

$$ل_۳ = \frac{۱}{۶} (ما_۳ - ۳ ما_۲ + ۳ ما_۱ - ما_۰) ،$$

$$ل_۴ = \frac{۱}{۲۴} (ما_۴ - ۴ ما_۳ + ۶ ما_۲ - ۴ ما_۱ + ما_۰)$$

اس طرح بینی اوراج کا عام ضابطہ حاصل ہوتا ہے

$$ما = ما_۰ + ت ط_۱ + \frac{ت(ت-۱)}{۲ \times ۱} ط_۲ + \frac{ت(ت-۱)(ت-۲)}{۳ \times ۲ \times ۱} ط_۳$$

$$+ \frac{ت(ت-۱)(ت-۲)(ت-۳)}{۴ \times ۳ \times ۲ \times ۱} ط_۴ \quad \ldots\ldots (۲)$$

جہاں $ط_۱$، $ط_۲$، $ط_۳$، $ط_۴$، متواتر فرقوں کو تعبیر کرتے ہیں۔
بالعموم آخری رقم نظر انداز کی جا سکتی ہے کیونکہ جملہ

$$م_۴ - ۴ م_۳ + ۶ م_۲ - ۴ ما_۱ + ما_۰$$

عام طور پر بہت چھوٹا ہوگا۔ اگر ہم اسے صفر کے مساوی رکھیں تو

$$م_۲ = \frac{۲}{۳} (ما_۱ + م_۳) - \frac{۱}{۶} (ما_۰ + م_۴)$$

جدولوں میں درج شدہ مقداریں بلاشبہ عام طور پر ایک حد تک
(۲۱) غلط ہوتی ہیں، یہ غلطی اعشاریہ کے آخری مقام میں نصف ہندسہ تک ہو سکتی ہے۔ اگر $ما_۱$ اور $م_۴$ ہر ایک آخری مقام میں بقدر نصف ہندسہ کے زیادہ بڑا ہو اور $ما_۰$ اور $م_۴$ ہر ایک آخری مقام میں بقدر اسی مقدار کے کم ہو تو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ان ناموافق ترین حالات میں بھی $ما_۴$ کی قیمت کے اعشاریہ کے آخری مقام میں صرف ایک واحد ہندسہ کی خطا واقع ہو سکتی ہے۔

نیز اسی مساوات سے حاصل ہوتا ہے

$$ما_۴ = ۴ ما_۳ - ۶ ما_۲ + ۴ ما_۱ - ما$$

جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ $ما$، $ما_۱$، $ما_۲$، $ما_۳$ معلوم ہونے کے بعد $ما_۴$ کو محسوب کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ورائی ادراج (Extrapolation) ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ اگر $ما_۱$ اور $ما_۳$ ہر ایک بقدر نصف ہندسہ کے زیادہ بڑا ہو اور $ما_۲$ اور $ما$ ہر ایک بقدر نصف ہندسہ کے کم ہو اور ایسا ہونا بہت ممکن ہے تو $ما_۴$ کی قیمت کے آخری مقام میں مجموعی خطا ۷ یا ۸ ہندسوں تک ہو گی۔

بینی ادراج کا حسب ذیل طریقہ بھی جو بیسل (Bessel) سے منسوب ہے قابل یادداشت ہے۔

فرض کرو کہ وہ دلیل ہے جو دو جدولی دلیلوں کے درمیان وسطی نقطہ سے ناپی گئی ہے، جدول کے اس حصہ کو مبداء کی ہر ایک جانب دو جدولی دلیلوں تک لکھ لو۔

	فرق اول	فرق دوم	فرق سوم
$ما_۱$			
	$ما_۲ - ما_۱$		
$ما_۲$		$ما_۳ - ۲ ما_۲ + ما_۱$	
	$ما_۳ - ما_۲$		$ما_۴ - ۳ ما_۳ + ۳ ما_۲ - ما_۱$
$ما_۳$		$ما_۴ - ۲ ما_۳ + ما_۲$	
	$ما_۴ - ما_۳$		
$ما_۴$			

رکھو $ا = \frac{۱}{۲}(ما_۳ + ما_۲)$، $ب = ما_۳ - ما_۲$،

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ج = $\frac{1}{2}$ (ما۴ − ما۳ − ما۲ + ما۱) ، د = ما۴ − ۳ ما۳ + ۳ ما۲ − ما۱

جہاں ا، ب، ج، د وہ مقداریں ہیں جو یا تو مبدا میں سے گذرنے والے افقی خط پر واقع ہیں یا اس خط کی مخالف سمتوں پر دو متصلہ مقداروں کے درمیان حسابی اوسط ہیں۔

ہم لکھ سکتے ہیں

ما = − $\frac{1}{6}$ ما۱ (ت + $\frac{1}{2}$) (ت − $\frac{1}{2}$) (ت − $\frac{3}{2}$)

+ $\frac{1}{2}$ ما۲ (ت + $\frac{3}{2}$) (ت − $\frac{1}{2}$) (ت − $\frac{3}{2}$) − $\frac{1}{2}$ ما۳ (ت + $\frac{3}{2}$) (ت + $\frac{1}{2}$) (ت − $\frac{3}{2}$)

+ $\frac{1}{6}$ ما۴ (ت + $\frac{3}{2}$) (ت + $\frac{1}{2}$) (ت − $\frac{1}{2}$)

کیونکہ صریحات کی بجائے علی الترتیب − $\frac{3}{2}$، − $\frac{1}{2}$، $\frac{1}{2}$، $\frac{3}{2}$ درج کرنے سے ما۱، ما۲، ما۳، ما۴ حاصل ہوتے ہیں اور ہم یہ مان لیتے ہیں کہ ت کی قریبی قیمتوں کے لیے اسی جملہ سے ما کی متناظر قیمتیں حاصل ہوں گی۔

پھیلانے سے حاصل ہوتا ہے (۲۲)

۴۸ ما = − ما۱ (۸ ت۳ − ۱۲ ت۲ − ۲ ت + ۳)

+ ۳ ما۲ (۸ ت۳ − ۴ ت۲ − ۱۸ ت + ۹)

− ۳ ما۳ (۸ ت۳ + ۴ ت۲ − ۱۸ ت − ۹)

+ ما۴ (۸ ت۳ + ۱۲ ت۲ − ۲ ت − ۳)

اور اس لیے

۴۸ ما = (۸ ت۳ − ۲ ت) (د + ۳ ب) + (۱۲ ت۲ − ۳) (۲ ج + ۲ ا)

+ (۵۴ ت − ۲۴ ت۳) ب + (۵۴ − ۲۴ ت۲) ا

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

یا $ما = ا + ب ت + ج \frac{(۲ت - ۱)(۲ت + ۱)}{۲۴} + د \frac{ت(۲ت - ۱)(۲ت + ۱)}{۲۴}$

اگر $ت = ۰$ تو $ما = ا - \frac{۱}{۸} ج$ جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ دو متصلہ دلیلوں کے درمیان وسطی نقطہ پر کی دلیل کے لیے تفاعل کی قیمت معلوم کرنا ہو تو متصلہ قیمتوں کے اوسط حسابی میں سے ان ہی افقی خطوں میں جن پر یہ دو متصلہ قیمتیں ہیں واقع شدہ دو دوسرے فرقوں کے اوسط حسابی کے $\frac{۱}{۸}$ کو تفریق کرنا چاہیئے۔

اس طریقہ کی صراحت کے لیے ہم حسب ذیل سوال حل کریں گے۔ گرینوچ اوسط دوپہر پر چاند کا اوسط طول بلد پہلی، دوسری، تیسری اور چوتھی مارچ ۱۸۹۹ء کے لیے معلوم ہے۔ اس کا اوسط طول بلد دوسری مارچ کی آدھی رات پر معلوم کرنا مطلوب ہے۔

۱۸۹۹ء	چاند کا اوسط طول بلد، دوپہر میں	فرق اول	فرق دوم
یکم مارچ	۲۰۵° ۳۸′ ۱″٫۳۸		
		+۱۲° ۵۸′ ۹″٫۶	
۲ مارچ	۲۱۸° ۳۶′ ۰″٫۴۵		+۱۳′ ۲″٫۱۱
		+۱۳° ۱۱′ ۱″٫۱۸	
۳ مارچ	۲۳۱° ۴۸′ ۱″٫۳		+۱۴′ ۶″٫۴۰
		+۱۳° ۲۵′ ۷″٫۵۸	
۴ مارچ	۲۴۵° ۱۴′ ۸″٫۱		

پس مطلوبہ نتیجہ ہے

$$\frac{۱}{۲}(۲۱۸° ۳۶′ ۰″٫۴۵ + ۲۳۱° ۴۸′ ۱″٫۳) - \frac{۱}{۱۶}(۱۳′ ۲″٫۱۱ + ۱۴′ ۶″٫۴۰)$$

$$= ۲۲۵° ۱۰′ ۳۹″٫۵$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

پہلے باب پر مثالیں

(۲۳)

مثال ۱۔ ثابت کرو کہ کروی مثلث سے متعلق کسی ضابطے میں ا، ب، ج، ا، ب، ج کو علی الترتیب ا، ۱۸۰° - ب، ۱۸۰° - ج، ا، ۱۸۰° - ب، ۱۸۰° - ج میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ پس نیپیر کی پہلی تمثیلات (۲۰) سے دوسری تمثیلات (۲۱) اخذ کرو۔

مثال ۲۔ بتاؤ کہ کس مفہوم میں ڈلمبر کے ضابطہ (۱۶)

جب $\frac{1}{2}$ج جب $\frac{1}{2}$ (ا - ب) = + جم $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}$ (ا - ب)

کو شکل جب $\frac{1}{2}$ج جب $\frac{1}{2}$ (ا - ب) = - جم $\frac{1}{2}$ ج جب $\frac{1}{2}$ (ا - ب)

میں بھی لکھا جا سکتا ہے اور ثابت کرو کہ ما بقی تین ضابطوں میں بھی علامت کا یہ ابہام موجود ہے۔

مثال ۳۔ ثابت کرو کہ

مم ا فرا + مم ب فرب = مم ب فرب + مم ا فرا،

جب ا فرب = جب ج فرب - جب ب جم ا فرج - جب ب جم ج فرا

مثال ۴۔ اگر ت کی قیمتوں ت، ت۱، ت۲ کے جواب میں ما کی قیمتیں علی الترتیب ما، ما۱، ما۲ ہوں تو ثابت کرو کہ بینی ادراج کا ایک ضابطہ جو ان معطیات پر منحصر ہو اس مساوات

$$ما = ما \frac{(ت - ت_1)(ت - ت_2)}{(ت_ب - ت_1)(ت_ب - ت_2)} + ما_1 \frac{(ت - ت_2)(ت - ت_ب)}{(ت_1 - ت_2)(ت_1 - ت_ب)} + ما_2 \frac{(ت - ت_ب)(ت - ت_1)}{(ت_2 - ت_ب)(ت_2 - ت_1)}$$

سے ملتا ہے۔

یہ دیکھنا کافی ہے کہ ت کی رقوم میں ما کا یہ جملہ سادہ ترین ہے جس میں ت کی بجائے ت، ت۱، ت۲ درج کرنے سے ما کی قیمتیں ما، ما۱، ما۲ حاصل ہوتی ہیں۔

مثال ۵۔ ثابت کرو کہ اگر ت۱ - ت = ت۲ - ت۱ = ھ تو مثال (۴) کا

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

بینی ادراج کا ضابطہ اِس اساسی ضابطہ

$$ما = با + \frac{ت}{ھ}(با_1 - با) + \frac{ت(ت-ھ)}{۲ھ^۲}(با_2 - ۲با_1 + با)$$

میں تحویل ہوگا اگر وقت کو ت سے محسوب جائے۔

مثال ۶ ۔ ایفیمرس سے حسب ذیل اندراجات لئے گئے ہیں :۔

گرینوچ اوسط دوپہر

سنہ ۱۹۰۵ء	سورج کا شمالی میل
۷ر اپریل	۶° ۴۰′ ۴۹٫۹″
۸ر "	۷ ۳ ۲۲٫۴
۹ر "	۷ ۲۵ ۷٫۷ ۴

ثابت کرو کہ سورج کا میل بتاریخ ۷ر اپریل سنہ ۱۹۰۵ء بوقت ۶ ب۔ظ (بعد ظہر)[۵۱] ۶° ۴۶′ ۲۸٫۷″ ہے۔

مثال ۷ ۔ چاند کا نیم قطر حسب ذیل ہے :۔

گرینوچ اوسط دوپہر

(۲۴)

سنہ ۱۹۰۹ء	چاند کا نیم قطر
۳ر ستمبر	۱۶′ ۴۴٫۲۹″
۴ر "	۱۶ ۱۸٫۶۱
۵ر "	۱۶ ۵٫۹۷
۶ر "	۱۵ ۵۲٫۶۹

ثابت کرو کہ چاند کا نیم قطر بتاریخ ۴ر ستمبر سنہ ۱۹۰۹ء بوقت نیم شب ۱۶′ ۴۴٫۱۲″ ہے۔

---

۵۱ ب۔ظ معادل ہے p.m. کا۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۸ ۔ مفرد ضابطہ ذیل سے بتاریخ ۱۱ر اگست سنہ ۱۹۰۹ء اوسط وقت معلوم کرو جبکہ زہرہ اور مشتری کا ص ۔ م (صعود مستقیم) ایک ہی ہو۔

اوسط دوپہر	زہرہ کا صعود مستقیم	مشتری کا صعود مستقیم
۱۱ر اگست سنہ ۱۹۰۹ء	۱۱ گ ۱۰ م ۴۰٫۲۴ ث	۱۱ گ ۱۳ م ۳۵٫۵۸ ث
۱۲ر "	۱۱ ۱۵ ۷٫۲۴	۱۱ ۱۴ ۲۰٫۳۶
۱۳ر "	۱۱ ۱۹ ۳۳٫۶۱	۱۱ ۱۵ ۵٫۳۱

اگر بتاریخ ۱۱ر اگست سنہ ۱۹۰۹ء بعد دوپہر دن کا کسری حصہ ت ہو تو نیچے درج کے ضابطوں سے یہ مساوات حاصل ہوتی ہے

$$\text{۱۱ گ ۱۰ م } ۴۰٫۲۴ \text{ ث} + ۲۶۷٫۰۰ \text{ ث} \times ت - ۳۱٫۰ \text{ ث} \times ت (ت - ۱)$$

$$= \text{۱۱ گ ۱۳ م } ۳۵٫۵۸ \text{ ث} + ۴۴٫۷۸ \text{ ث} \times ت + ۰٫۰۸ \text{ ث} \times ت (ت - ۱)$$

یہ ظاہر ہے کہ ت تقریباً $\frac{۴}{۵}$ ہونا چاہئے ۔ اس لیے مساوات کی داہنی جانب کی آخری رقم کی بجائے + ۰٫۰۵ اور بائیں جانب کی آخری رقم کی بجائے ۔ ۰٫۰۱ لکھا جا سکتا ہے ۔ تب مفرد مساوات کو حل کرنے سے ت = ۰٫۷۸۸۷۷، اسلئے مطلوبہ جواب ہے

۱۸ گ ۵۵٫۸ م

مثال ۹ ۔ ایفیمیرس سے حسب ذیل اندراجات لئے گئے ہیں :۔

	چاند کا صعود مستقیم
۲۱ر دسمبر سنہ ۱۹۰۵ء ۔ گھنٹے گ ۔ (ت	۱۳ گ ۳۹ م ۵۵٫۶۹ ث
"	۱۲ " ۱۴ ۷ ۳۲٫۰۴
۲۲ر دسمبر سنہ ۱۹۰۵ء ۔ "	۱۴ ۳۵ ۳۸٫۱۴
"	۱۲ " ۱۵ ۴ ۱۶٫۳۱

بیسل کے ضابطے سے، د کو نظر انداز کر کے کیونکہ وہ بہت چھوٹا ہے،

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ثابت کرو کہ چاند کا ص ۔ م بتاریخ ۲۱ ر دسمبر ۱۹۰۵ء بوقت (۱۸ + ۱۲ لا) گھنٹے یہ تھا

$$۱۴^{گ}\ ۲۱^{م}\ ۹۰\text{،}۳۵^{ث} + (۲۸^{م}\ ۱۰\text{،}۶^{ث})\ لا$$

$$+ ۸۶\text{،}۳^{ث}\ (۲لا - ۱)(۲لا + ۱)$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۲۵)

دوسرا باب

کروی محددوں کا استعمال

دفعہ		صفحہ
۶	کرہ پر درجہ دار بڑے دائرے۔	۳۸
۷	کرہ پر کے کسی نقطہ کے محدد۔	۴۰
۸	دو نقطوں کو ملانے والی قوس کی جیب التمام کو اِن نقطوں کے محددوں میں بیان کرنا۔	۴۲
۹	کروی محددوں میں دی ہوئی مساوات کا مفہوم۔	۴۶
۱۰	دو درجہ دار بڑے دائروں کا میلان اِن کے شطبوں کو ملانے والی اُس قوس کے مساوی ہوتا ہے جو ۱۸۰° سے بڑی نہ ہو۔	۴۹
۱۱	دو درجہ دار بڑے دائروں کا تقاطع۔	۵۱
۱۲	محددوں کا استحالہ۔	۵۵
۱۳	لوکار تموں کا استعمال۔	۶۳

۶۔ کرہ پر درجہ دار بڑے دائرے۔

کسی بڑے دائرہ کے محیط کو، تقسیم کرنے والے نشانوں کے ذریعہ ۳۶۰ مساوی حصوں میں منقسم فرض کیا جاتا ہے۔ اِن میں سے ایک نشان سے ابتدا کر کے، جسے صفر لیتے ہیں، باقاعدہ ترتیب میں آنے والے متواتر نشانات

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

۱°، ۲°، ۳°، ...، ۳۵۹° کہلاتے ہیں۔ اِس کے بعد کا نشان صفر ہے، پس یہ نقطہ صفر یا ۳۶۰° کہلاتا ہے۔ اِس طرح ایک درجہ دار بڑا دائرہ حاصل ہوتا ہے، اِس میں ہر درجہ کے وقفہ کو حسب ضرورت مزید حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

صفر سے ابتدا کرنے میں اعداد کسی ایک سمت میں بڑھ سکتے ہیں اور اِس طرح ایک ہی دائرہ کی درجہ بندی ایک ہی صفر نشان سے دو بالکل جداگانہ طریقوں سے عمل میں آسکتی ہے۔

فرض کرو کہ ایک شخص کرہ کے بیرونی جانب ایک درجہ دار بڑے دائرہ پر اُس سمت میں چلتا ہے جس میں اعداد بڑھتے ہیں۔ یعنے صفر درجہ سے ایک درجہ کی سمت میں نہ کہ صفر سے ۳۵۹° کی سمت میں۔ تب اِس شخص کے بائیں ہاتھ کی طرف بڑے دائرہ کا وہ قطب ہوگا جسے ہم لفظ شُطب (Nole) سے موسوم کر سکتے ہیں اور دائیں ہاتھ کی طرف وہ قطب ہوگا جسے ہم لفظ ضِد شطب (Antinole) سے موسوم کر سکتے ہیں۔

(۲۶) اِس طرح اگر ہم ارضی خط اُستوا کو ایک درجہ دار بڑے دائرے کے طور پر تصور کریں جس کی تقسیم گرینوچ یا پیرس سے مشرقی جانب طول بلدوں کے لیے عمل میں آئی ہو تو زمین کا شمالی قطب اِس درجہ دار بڑے دائرہ کا شُطب ہے اور زمین کا جنوبی قطب دائرہ کا ضد شطب ہے۔ برخلاف اس کے اگر خط اُستوا کی درجہ بندی اِس طرح عمل میں آتی کہ اِس پر مغربی جانب چلنے سے طول بلد بڑھتے تو ایسے دائرہ کا شُطب زمین کا جنوبی قطب ہوتا اور اس کا ضِد شُطب زمین کا شمالی قطب۔

جب کرہ پر کے کسی نقطہ کو ایک درجہ دار بڑے دائرہ کے شُطب کے طور پر بیان کیا جاتا ہے تو اِس سے نہ صرف اِس بڑے دائرہ کا محل متعین ہوتا ہے بلکہ اِس پر کی وہ سمت بھی جس میں درجہ بندی عمل میں آئی ہے۔ اگر دیے ہوئے نقطہ کو اِس درجہ دار بڑے دائرہ کے ضِد شُطب کے طور پر ظاہر کیا جاتا تو درجہ بندی کی سمت اُلٹ جاتی کیونکہ تعریف کی رو سے ضِد شُطب

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اُس شخص کے دائیں ہاتھ کی جانب ہوتا ہے جو اِس بڑے دائرہ پر بڑھتے درجوں کی سمت میں چلتا ہے۔

کسی درجہ دار بڑے دائرہ پر صفر سے آ کی سمت ظاہر کرنے کے لیے دائرہ پر ایک تیر کا نشان دیدینا کافی ہے جیسا کہ شکل ۹ اور شکل ۱۰ میں دکھایا گیا ہے۔ بڑھتے درجوں کی سمت کو مثبت سمت کہنا اور گھٹتے درجوں کی سمت کو منفی سمت کہنا سہولت بخش ہوگا۔



شکل (۹)

۷۔ کرہ پر کے کسی نقطہ کے محدد

کسی بڑے دائرہ کو جس کی درجہ بندی مبداء و پر ۰ سے ہوئی ہو حوالہ کا بڑا دائرہ منتخب کرو۔ تب ہم کرہ پر کے کسی نقطہ کے محل کو دو محددوں عہ اور ضہ کی مدد سے جو اِس بڑے دائرہ کے لحاظ سے لئے گئے ہوں بیان کر سکتے ہیں۔



شکل (۱۰)

اگر عہ اور ضہ کو خاص قیمتیں دی گئی ہوں تو کرہ پر کا متناظر نقطہ س حسب ذیل طریقہ سے معلوم کیا جاتا ہے۔ مبداء و سے بڑھتے درجوں کی سمت میں بڑے دائرہ پر نقطہ پ ایسا لو کہ و پ = عہ۔ نقطہ پ پر ایک بڑا دائرہ کھینچو جو و پ پر عمود ہو۔ اب اِس دائرہ پر ایک قوس لینی ہے جو ضہ کے مساوی ہو۔ اگر ضہ مثبت ہو تو مطلوبہ نقطہ س کو اُس نیم کرہ میں لینا چاہئے جس میں شمطب واقع ہے۔ لیکن اگر ضہ منفی ہو تو مطلوبہ نقطہ س کو اُس نیم کرہ میں لینا چاہئے جس میں ضد شمطب واقع ہے۔ پس جب، عہ اور ضہ دئے جاتے ہیں تو کرہ پر نقطہ کا محل ٹھیک طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ بالعموم

(۲۷)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

سہولت اِس میں ہے کہ اُس نیم کرہ کو جس میں شطب واقع ہوتا ہے مثبت نیم کرہ کہا جائے اور دوسرے کو جس میں ضدِ شطب واقع ہوتا ہے منفی نیم کرہ کہا جائے۔

عہ کی منفی قیمتوں پر غور کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر نقطہ ق کو $-90°$ کے طور پر بیان کیا گیا ہو جبکہ زاویہ و ج ق $= -90°$ تو اس نقطہ ق کو $+270°$ سے ظاہر کرنے میں بالعموم زیادہ سہولت ہوگی جہاں اِسے مثبت سمت میں ناپا گیا ہے۔ پس ہم یہ قرارداد اختیار کرتے ہیں کہ عہ کی تمام قیمتیں ۰ اور $360°$ کے درمیان واقع ہوتی ہیں۔

نیز ضہ کی قیمتوں کو $-90°$ اور $+90°$ کے درمیان مقید کرنا سہولت بخش ہے کیونکہ اس سے کچھ ابہام رفع ہوتا ہے اور کامل عمومیت بھی برقرار رہتی ہے۔ بلاشبہ دو محدد ہمیشہ ایک نقطہ کی تعیین کریں گے لیکن ضہ کی اِس قید کے بغیر یہ نتیجہ نہیں نکلے گا کہ ایک نقطہ کے محدد محددوں کا صرف ایک واحد ممکن زوج ہیں۔ مثلاً عہ $= 30°$، ضہ $= +20°$ سے وہ نقطہ ظاہر ہوگا جو نقطہ عہ $= 210°$، ضہ $= +160°$ سے مختلف نہیں ہوگا لیکن اگر ہم یہ قرار دے لیں کہ ضہ، حدود $-90°$ اور $+90°$ کے باہر واقع نہیں ہوتا تو اِس سے نہ صرف یہ لازم آئے گا کہ محددوں کے ایک زوج سے ایک نقطہ متعین ہوتا ہے بلکہ یہ بھی کہ ایک نقطہ بالعموم محددوں کا صرف ایک زوج رکھتا ہے۔ صرف مستثنےٰ صورتیں اساسی دائرہ کے شطب اور ضدِ شطب ہیں کیونکہ شطب میں ضہ $= +90°$ اور ضدِ شطب میں ضہ $= -90°$ اور ہر صورت میں عہ غیر متعیّن ہے۔

مثال ۱۔ اِن قیود کو ترک کرکے کہ $0 \leq$ عہ $< 360°$ اور $-90° \leq$ ضہ $\leq 90°$ ثابت کرو کہ نقطہ عہ $= 40°$، ضہ $= 30°$، کو حسب ذیل محددوں میں سے کسی ایک سے بھی برابر تعبیر کیا جا سکتا ہے:

$(220°, 150°)$، $(-320°, 30°)$، $(-140°, 150°)$، $(40°, 30°)$،
$(580°, 150°)$، $(40°, 390°)$، $(-680°, 30°)$

ہم نقطہ کے محل کو بدلے بغیر اس کے محددوں میں سے کسی ایک یا دونوں میں $\pm 360°$ ہمیشہ جمع کر سکتے ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۲ — ثابت کرو کہ محددوں کے حسب ذیل جوڑے

عہ ، ضہ ؛

۳۶۰° + عہ ، ضہ ؛

۱۸۰° + عہ ، ۱۸۰° − ضہ ؛

۱۸۰° + عہ ، −۱۸۰° − ضہ ؛

سب کے سب ایک ہی نقطہ کو ظاہر کرتے ہیں اور اس لئے اس امر کی تصدیق کرو کہ کرہ پر کسی ہر نقطہ کے لیے محددوں کا ایک جوڑا ایسا معلوم کیا جا سکتا ہے کہ

۰° ≤ عہ ≤ ۳۶۰° اور −۹۰° ≤ ضہ ≤ ۹۰°

(۲۸) ۸ — دو نقطوں کو ملانے والی قوس کی جیب التمام کو ان نقطوں کے محددوں میں بیان کرنا۔

فرض کرو کہ ا اَ حوالے کا بڑا دائرہ ہے اور ق اس کا شطب ہے۔ فرض کرو کہ دیے ہوئے نقطے س اور سَ ہیں۔



شکل (۱۱)

چونکہ ا س = ضہ، اس لیے س ق = ۹۰° − ضہ اور اسی طرح سَ ق = ۹۰° − ضہَ۔ نیز ا اَ = عہَ − عہ اور چونکہ ق ا اور ق اَ میں سے ہر ایک ۹۰° ہے اس لئے زاویہ س ق سَ = عہَ − عہ

اب مثلث س ق سَ پر اساسی ضابطہ (۱) لگانے سے

جم ط = جب ضہ جب ضہَ + جم ضہ جم ضہَ جم (عہَ − عہ) ..... (۱)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جہاں طہ = س سَ ۔

اگر نقطے س اور سَ کرہ پر باہم نزدیک ہوں تو ان کے فاصلہ کی تعیین کے لیے ایک زیادہ آسان ضابطہ اس طرح حاصل کیا جاتا ہے :۔

جم طہ = جب ضہ جب ضہَ + جم ضہ جم ضہَ جم (عہ - عہَ)

= جب ضہ جب ضہَ {جم² ½ (عہ - عہَ) + جب² ½ (عہ - عہَ)}

+ جم ضہ جم ضہَ {جم² ½ (عہ - عہَ) - جب² ½ (عہ - عہَ)}

= جم (ضہ - ضہَ) جم² ½ (عہ - عہَ) - جم (ضہ + ضہَ) جب² ½ (عہ - عہَ)

اس کو

۱ = جم² ½ (عہ - عہَ) + جب² ½ (عہ - عہَ)

میں سے تفریق کرو تو

جب² ½ طہ = جم² ½ (عہ - عہَ) جب² ½ (ضہ - ضہَ) + جب² ½ (عہ - عہَ) جم² ½ (ضہ + ضہَ)

یہ بلا شبہ عام طور پر درست ہے اور اگر طہ بہت چھوٹا ہو تو اس سے تقریبی حل

طہ² = (ضہ - ضہَ)² + (عہ - عہَ)² جم² ½ (ضہ + ضہَ)

حاصل ہوتا ہے ۔

ہم اس ضابطہ کو ہندسی طور پر اس طرح ثابت کر سکتے ہیں (شکل ۱۱) :۔

فرض کرو کہ س ن اور سَ نَ علی الترتیب سَ ق اور س ق پر عمود ہیں ۔ چونکہ س ن سَ ایک بہت چھوٹا مثلث ہے اسلیے

س نَ² + ن سَ² = س سَ²

پس تقریباً

(ضہ - ضہَ)² + (عہ - عہَ)² جم² ضہَ = س سَ²

اسی طرح مثلث س ن سَ سے (۲۹)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$(\text{ضہ} - \text{ضہَ})^2 + (\text{عہ} - \text{عہَ})^2 \text{ جم}^2 \text{ ضہ} = \text{س س}^2$$

س س کی ان دو تقریبی قیمتوں میں صرف یہ فرق ہے کہ ایک میں جم ضہ آتا ہے اور دوسرے میں جم ضہَ ۔ عام طور پر ایک جیب التمام بہت بڑی اور دوسری بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس لیے تقریب کے لیے جم ضہ اور جم ضہَ کی بجائے ہم ان کا اوسط لکھ سکتے ہیں جو اس طرح معلوم کیا جاتا ہے

$$\frac{1}{2}(\text{جم ضہ} + \text{جم ضہَ}) = \text{جم}\frac{1}{2}(\text{ضہ} + \text{ضہَ}) \text{ جم}\frac{1}{2}(\text{ضہ} - \text{ضہَ})$$

$$= \text{جم}\frac{1}{2}(\text{ضہ} + \text{ضہَ})$$

اور اس کے اندراج سے مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے ۔

قائم محدد ۔ فرض کرو کہ نیم قطر ر کے کرہ پر ایک نقطہ عہ، ضہ ہے ۔ ہم (ا) سے نقطہ (عہ، ضہ) کے قائم محدد اُن محوروں کے حوالے سے معلوم کر سکتے ہیں جن کی تعریف حسب ذیل ہے :-

+ لا کرہ کے مرکز سے نقطہ عہَ = ۰، ضہَ = ۰ تک ہے

+ ما " " عہَ = ۹۰°، ضہَ = ۰ "

+ ی " " ضہَ = ۹۰° "

پس ہم (ا) میں اندراج کرنے سے دیکھتے ہیں کہ اُن قوسوں کی جیوب التمام جو ق سے ان تین مثبت محوروں کے سروں تک کھینچی گئی ہیں علی الترتیب یہ ہیں

جم عہ جم ضہ، جب عہ جم ضہ، جب ضہ

اور اس لیے قائم محدد

لا = ر جم عہ جم ضہ، ما = ر جب عہ جم ضہ، ی = ر جب ضہ ہیں ۔

مثال ۱ ۔ س اور سَ کے درمیان فاصلہ طہ معلوم کرو جبکہ یہ دیا گیا ہو کہ ضہ = ۱۲° ۲۴′ ۲۵″، ضہَ = ۱۵° ۲۴′ ۴۰″، عہَ - عہ = ۴۲° ۳۸′ ۴۱″

ہم فاصلہ طہ کو راست ضابطہ (ا) سے معلوم کرتے ہیں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جب ضہ ۹٫۶۱۳۰۳۱ جم ضہ ۹٫۹۵۹۸۴۴

جب ضہ ۹٫۳۳۲۳۴۴ جم ضہ ۹٫۹۸۹۰۲۸

جم (عہ-عہ) ۹٫۸۶۶۶۲۳

۸٫۹۴۶۰۶۵

۹٫۸۱۶۱۹۵

پس

پہلی رقم ۰٫۰۸۸۳۲۱

دوسری رقم ۰٫۶۵۴۹۳۰

جم طہ ۰٫۷۴۳۲۵۱

طہ = ۴۱° ۵۹′ ۲۷″

مثال ۲ — اگر ضہ = ۲۷° ۱۱′ ۶″، ضہ = ۳۲° ۱۷′ ۲۱″ اور عہ عہ = ۲۹° ۱۱′ ۱۳″ تو بتاؤ کہ طہ = ۲۵° ۴۶′ ۶″

مثال ۳ — دو ستاروں کے محدد علی الترتیب عہ، ضہ اور عہ، ضہ ہیں — (آ) سے ثابت کرو کہ ان کو ملانے والے بڑے دائرے کے قطبوں کے محدد (عہ، ضہ) مساواتوں

— مس ضہ = مم ضہ جم (عہ - عہ) = مم ضہ جم (عہ - عہ)

سے حاصل ہوتے ہیں — ان مساواتوں کو ہندسی طور پر بھی حاصل کرو —

مثال ۴ — سمجھاؤ کہ مثال ۳ کے حل کا اطلاق کس طرح دونوں قطبوں (۳۰)
پر ہوتا ہے اور بتاؤ کہ شطب کو ضد شطب سے کس طرح ممیز کیا جا سکتا ہے اگر مثبت سمت پہلے ستارے سے دوسرے ستارے کی سمت ہو —

مثال ۵ — اگر ل، ایک بڑے دائرے کی اُس قوس کا طول ہو جو زمین پر (جسے نصف قطر ر کا ایک کرہ فرض کیا گیا ہے) عرض بلد لہ، طول بلد ل، سے عرض بلد لہ، طول بلد ل، تک لی گئی ہو تو ثابت کرو کہ

ل = ر جم⁻¹ (جب لہ، جب لہ، قط² فہ)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جہاں مس^{2} فہ = مم لہ$_{1}$ مم لہ$_{2}$ جم (ل$_{1}$ ـ ل$_{2}$)

نیز ثابت کرو کہ یہ بڑا دائرہ جس بلند ترین عرض بلد تک پہنچیگا وہ

جم$^{-1}$ (جم لہ$_{1}$ جم لہ$_{2}$ جب (ل$_{1}$ ـ ل$_{2}$) قم $\frac{ل}{2}$)

ہوگا۔

فرض کرو کہ یہ دو نقطے س$_{1}$، س$_{2}$ ہیں (شکل ۱۲) اور خط استواء و پ$_{1}$ پ$_{2}$ ہے اور شمالی قطب ن ہے۔ تب

جم س$_{1}$ س$_{2}$ = جب لہ$_{1}$ جب لہ$_{2}$ + جم لہ$_{1}$ جم لہ$_{2}$ جم (ل$_{1}$ ـ ل$_{2}$)

اس مثال کے دوسرے جزو کو ثابت کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ س$_{1}$ س$_{2}$ (ممدودہ بشرط ضرورت) پر بلند ترین عرض بلد زاویہ س$_{1}$ و پ$_{1}$ کے مساوی ہے۔



شکل (۱۲)

اب مثلث ن و س$_{1}$ سے

جم س$_{1}$ و پ$_{1}$ = جب ن و س$_{1}$ = جب ن س$_{1}$ جب ن س$_{1}$ و

= جب ن س$_{1}$ جب ن س$_{2}$ جب س$_{1}$ ن س$_{2}$ قم س$_{1}$ س$_{2}$

مثال ۶ ـ اس امر کی تصدیق کرو کہ نقطہ (عہ، ضہ) اور نقطہ (عہ، ضہ) کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کے جملہ میں اگر عہ، ضہ کی بجائے علی الترتیب ۱۸۰° + عہ، ۱۸۰° ـ ضہ رکھا جائے تو اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی اور سمجھاؤ کہ ایسا ہونا کیوں ضروری ہے۔

۹ ـ کروی محدبوں میں دی ہوئی مساوات کا مفہوم۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہم دیکھ چکے ہیں کہ اگر عہ اور ضہ دئے گئے ہوں تو ایک نقطہ جسکے محدد یہ مقداریں ہوں کرہ پر پوری طرح متعین ہو جاتا ہے۔ اگر ہمیں عہ اور ضہ کے متعلق سوائے اِس کے کچھ معلوم نہ ہو کہ وہ ایک مساوات کو پورا کرتے ہیں جس میں وہ، دوسری مقداروں کے ساتھ جو معلومہ فرض کی جاتی ہیں داخل ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں اِن دو مجہول مقداروں کو متعین کرنے کے لیے کافی مفروضات موجود نہیں ہوتے۔

عہ کی کوئی قیمت اِس مساوات میں مندرج کی جائے تو ضہ میں ایک مساوات حاصل ہوگی جس کی بالعموم ایک یا زیادہ اصلیں معلوم ہو سکیں گی۔ عہ کی مختلف متعدد قیمتیں لیکر اِس عمل کو دُہرانے سے محددوں عہ، ضہ کے جوڑوں کا ایک ختم نہ ہونے والا سلسلہ حاصل ہوگا۔ اِن میں سے ہر جوڑے سے کرہ پر ایک نقطہ متعین ہوگا۔ اگر اِن میں سے متعدد نقطوں کو کرہ پر مرتسم کیا جائے تو اِن سے ایک منحنی ظاہر ہوگا جس کو کروی سطح پر مرتسم کیا جا سکے گا۔ اب ابتدائی مساوات کو اِس منحنی کی مساوات کے طور پر ٹھیک اُسی طریح (۳۱) تصور کیا جا سکتا ہے جس طرح لا اور ما میں کوئی مساوات علم ہندسہ تحلیلی میں مستوی منحنی کو تعبیر کرتی ہے۔

ہم اول یہ بتائیں گے کہ اگر نقطہ عہ، ضہ کے محدد مساوات

ا جب ضہ + ب جب عہ جم ضہ + ج جم عہ جم ضہ = ۰

کو پورا کریں جہاں ا، ب، ج مستقل ہیں تو اِس نقطہ کا طریق ایک بڑا دائرہ ہے جس کے قطبوں کے محدد عہ، ضہ اور ۱۸۰° + عہ، ۔ ضہ ہیں جہاں

$$\text{مس عہ} = \frac{\text{ب}}{\text{ج}}\text{، جب ضہ} = \frac{\text{ا}}{\sqrt{\text{ا}^2 + \text{ب}^2 + \text{ج}^2}}$$

ہم ا کو مثبت لے سکتے ہیں کیونکہ اگر ضرورت پڑے تو تمام رقموں کی علامتیں بدلی جا سکتی ہیں۔ تین نئی مقداریں ھ، عہ، ضہ ایسی لو کہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ا = ھ جب ضہ ، ب = ھ جب عہ جم ضہ ، ج = ھ جم عہ جم ضہ

تو مربع لینے اور جمع کرنے سے ھ = ± $\sqrt{ا^۲ + ب^۲ + ج^۲}$ ۔ اس جذرالمربع کی علامت مثبت لی جائے تو ہمیں پہلی مساوات سے حاصل ہوتا ہے جب ضہ = مثبت مقدار جو < ۱ ، اس لیے ضہ مثبت ہے اور چونکہ ضہ < ۹۰° اس لیے ضہ اور ۱۸۰° - ضہ کے درمیان کوئی ابہام نہیں ہے ۔ دوسری اور تیسری مساواتوں سے جم عہ اور جب عہ ملتے ہیں اور اس لیے عہ بغیر کسی ابہام کے معلوم ہوتا ہے اور اس طرح ہمیں ایک حل عہ ، ضہ حاصل ہوتا ہے ۔ لیکن اگر ہم نے ھ کی منفی قیمت لی ہوتی تو پہلی مساوات سے ضہ کی بجائے ۔ ضہ ملتا اور آخری دو مساواتیں عہ کی بجائے صرف ۱۸۰° + عہ رکھنے سے پوری ہو سکتیں ۔ اس لیے دو حل عہ ، ضہ اور ۱۸۰° + عہ ، ۔ ضہ ہیں اور یہ نقطے متقاطر نقطے ہیں ۔ اب ابتدائی مساوات ہو جاتی ہے

ھ {جب ضہ جب ضہ + جم ضہ جم ضہ جم (عہ - عہ)} = ۰

اس لیے نقطہ عہ ، ضہ ثابت نقطہ عہ ، ضہ سے ۹۰° پر ہونا چاہئے اور اس لیے نقطہ عہ ، ضہ کا طریق ایک بڑا دائرہ ہے ۔

مثال ۱ ۔ اگر مساوات

ا جب ضہ + ب جب عہ جم ضہ + ج جم عہ جم ضہ = د

پوری ہو تو نقطہ عہ ، ضہ کا طریق بالعموم ایک چھوٹا دائرہ ہوگا جس کا نصف قطر

جم$^{-۱}$ {د \ ($\sqrt{ا^۲ + ب^۲ + ج^۲}$)$^{\frac{۱}{۲}}$}

ہوگا نیز ثابت کرو کہ اگر د^۲ = ا^۲ + ب^۲ + ج^۲ تو مساوات بالا صرف ایک نقطہ کو تعبیر کرتی ہے ۔

مثال ۲ ۔ اگر کرہ پر ایک نقطہ کے رواں محدد عہ ، ضہ ہوں اور

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ا، ب مستقل ہوں تو ثابت کرو کہ مساوات

مس ضہ = مس ب جب (عہ - ا)

ایک بڑے دائرہ کو تعبیر کرتی ہے جس کا ایک قطب نقطہ عہ = ا + ۲۷۰° ضہ = ۹۰° - ب ہے۔

۱۰ - دو درجہ دار بڑے دائروں کا میلان اِن کے شطبوں کو ملانے والی اُس قوس کے مساوی ہوتا ہے جو ۱۸۰° سے بڑی نہ ہو۔ (۳۲)

دو غیر درجہ دار بڑے دائروں کا میلان بالعموم ناگزیر طور پر مبہم ہوتا ہے کیونکہ یہ میلان دو تکمیلی زاویوں میں سے کوئی ایک ہو سکتا ہے اور یہ ابہام صرف اُس صورت میں رفع ہوتا ہے جبکہ یہ دائرے ایک دوسرے کو علی القوائم قطع کریں۔

لیکن دو درجہ دار بڑے دائروں کا میلان ضرور نہیں کہ مبہم ہو کیونکہ ہم دو تکمیلی زاویوں میں سے ہمیشہ اُس زاویہ کو معلوم کر سکتے ہیں جسے اِن دو دائروں کا میلان خیال کیا جاتا ہے۔ دو بڑے دائروں کے میلان کی یہ تعریف ہے کہ



شکل (۱۳)



شکل (۱۴)

یہ وہ زاویہ ≯ ۱۸۰° ہے جو اِن دائروں کے اُن حصوں کے درمیان ہوتا ہے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جن میں تیر (←) نقطہ تقاطع سے نکلتے ہیں یا نقطہ تقاطع کی طرف آتے ہیں۔
شکل ۱۳ میں دائروں کے دو قطعات جو و سے نکلتے ہیں و ا۱ اور و ا۲ ہیں اور اس لیے زاویہ ا۱ و ا۲ (= صہ) لینا ہوگا لیکن اگر ہم صرف و ا۲ پر تیر کی سمت بدل دیں اور شکل میں کوئی اور تبدیلی نہ کریں تو ہمیں وہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے جسکو شکل (۱۴) میں دکھایا گیا ہے جس میں اب و سے نکلنے والے قطعات و ا۱ اور و ا۲ کا درمیانی زاویہ ا۱ و ا۲ (= ۱۸۰° - صہ) ہے اور اس کو اس صورت میں ان دو درجہ دار بڑے دائروں کا میلان لینا ہوگا۔

اگر ا۱ ا۲ ش۱ ش۲ (شکل ۱۳) وہ بڑا دائرہ ہو جو و ا۱ اور و ا۲ دونوں پر عمود ہے تو چونکہ و ا۱ = ۹۰° اور و ا۲ = ۹۰° اس لیے ا۱ ا۲ = صہ۔
اگر و ا۱ اور و ا۲ کے شطب علی الترتیب ش۱ اور ش۲ ہوں تو ا۱ ش۱ = ۹۰° اور ا۲ ش۲ = ۹۰° اور اس لیے

ش۱ ش۲ = ا۱ ا۲ = صہ

اسی طرح شکل ۱۴ میں و ا۱ کا شطب ش۱ اب پچھلی صورت کا ضد شطب ہے۔ چونکہ ا۲ و ش۲ = ۹۰° اس لیے ا۲ و ش۲ = ۹۰° - صہ
اور چونکہ ا۱ و ش۱ = ۹۰° اس لیے ش۱ و ش۲ = ۱۸۰° - صہ جو (۳۳)
حسب تشریح بالا اس صورت میں دو درجہ دار بڑے دائروں کا میلان ہے
پس ہمیں یہ اہم نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ دو درجہ دار بڑے دائروں کے درمیان میلان ہمیشہ اس قوس سے ناپا جاتا ہے جو ان کے شطبوں کو ملاتی ہے۔

بلاشبہ قوس ش۱ ش۲ (شکل ۱۳) کے متعلق ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ آیا یہ وہ چھوٹی قوس ہے جو ہمیں فطری طور پر لینی چاہیئے یا وہ بڑی قوس جو دائرہ پر دوسرے طریقہ سے ش۱ سے ا۲ اور ا۱ پر سے ہوتے ہوئے ش۲ تک پہنچنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس طرح دو قوسیں ہیں جو باہم ملکر ۳۶۰° بناتی ہیں اور ان میں سے کوئی قوس ایک لحاظ سے میلان متصور ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم کسی ابہام کو جو اس طرح پیدا

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہوتا ہے اس قرارداد سے رفع کر سکتے ہیں کہ دو درجہ دار بڑے دائروں کا میلان کبھی بھی ۱۸۰° سے متجاوز نہ ہونا چاہئے۔

مثال ۱ — اگر تین درجہ دار بڑے دائروں پر ب ج، ج ا، ا ب مثبت سمتیں ہوں اور ان سے مثلث ا ب ج بنے اور اگر ان کے شطب علی الترتیب ا، ب، ج ہوں تو ثابت کرو کہ

(ا) اگر قطبی مثلث ا ب ج کے ضلعوں پر ب ج، ج ا، ا ب مثبت سمتیں ہوں تو ان ضلعوں کے شطب علی الترتیب ا، ب، ج ہیں۔

(ب) مثلث ا ب ج کے ضلع اور زاوئے مثلث ا ب ج کے زاویوں اور ضلعوں کے علی الترتیب تکملہ ہیں۔

مثال ۲ — دو درجہ دار دائروں کے شطب عہ۱، ضہ۱ اور عہ۲، ضہ۲ ہیں۔ اگر ان دائروں کا میلان صہ ہو تو ثابت کرو کہ

جم صہ = جب ضہ۱ جب ضہ۲ + جم ضہ۱ جم ضہ۲ جم (عہ۱ − عہ۲)

اور اگر ان دو دائروں کے نقطہ تقاطع کے محدد عہ، ضہ ہوں تو ثابت کرو کہ

$$\text{جب ضہ} = \pm \frac{\text{جم ضہ}_1 \text{ جم ضہ}_2 \text{ جب (عہ}_2 - \text{عہ}_1)}{\text{جب صہ}}$$

$$\text{جم ضہ جم عہ} = \pm \frac{\text{جم ضہ}_1 \text{ جب ضہ}_2 \text{ جب عہ}_1 - \text{جب ضہ}_1 \text{ جم ضہ}_2 \text{ جب عہ}_2}{\text{جب صہ}}$$

$$\text{جم ضہ جب عہ} = \pm \frac{\text{جب ضہ}_1 \text{ جم ضہ}_2 \text{ جم عہ}_2 + \text{جب ضہ}_2 \text{ جم ضہ}_1 \text{ جم عہ}_1}{\text{جب صہ}}$$

جہاں اوپر کی اور نیچے کی علامتیں بالترتیب دو تقاطعوں کے متناظر ہیں۔

۱۱ — دو درجہ دار بڑے دائروں کا تقاطع۔

فرض کرو کہ ج اور ج (شکل ۱۵) دو درجہ دار بڑے دائرے ہیں جو دو متقاطر نقطوں ط اور ط پر ایک دوسرے کو قطع کرتے ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

فرض کرو کہ ج کا شطب شَ ہے اور جَ کا شطب شَ۔
کوئی نقطہ جو جَ پر مثبت سمت میں حرکت کرتا ہے نقطہ ط پر آکر اُس مثبت نیم کرہ کے اندر داخل ہوتا ہے جو ج سے محدود ہے۔ اِس لیے ہم کہتے ہیں کہ ط، ج کے لحاظ سے جَ کا صعودی عقدہ ہے۔
(۳۴) کوئی نقطہ جو جَ پر مثبت سمت میں حرکت کرتا ہے طَ پر آکر اُس منفی نیم کرہ میں داخل ہوتا ہے جو ج سے محدود ہے۔ اِس لیے ہم کہتے ہیں کہ طَ، ج کے لحاظ سے جَ کا نزولی عقدہ ہے۔
اگر ج پر و مبدا ہو جہاں سے محددوں کی پیمائش ہوی ہے اور اگر و پ = عہ، پ شَ = ضہ تو ج کے لحاظ سے شَ کے محدد جو جَ کا شطب ہے عہ اور ضہ ہیں۔
اب چونکہ دفعہ ۱۰ کی رو سے دو درجہ دار بڑے دائروں کا درمیانی زاویہ اِن کے شطبوں کی درمیانی قوس ہوتی ہے اِس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ج اور جَ کا درمیانی زاویہ یا میلان ۹۰° - ضہ ہے۔ پس

وط = و پ + پ ط = عہ + ۹۰°،
وطَ = و ط + ۱۸۰° = عہ + ۲۷۰°،

اور اِس لیے حسب ذیل عام بیان حاصل ہوتا ہے:۔
اگر ایک درجہ دار بڑے دائرہ جَ کے شطب کے محدد، بلحاظ دوسرے بڑے دائرہ ج کے، عہ، ضہ ہوں تو

اِن دائروں کا میلان ۹۰° - ضہ ہے،
ج پر جَ کے صعودی عقدہ کے محدد ۹۰° + عہ، ہیں،
اور ج پر جَ کے نزولی عقدہ کے محدد ۲۷۰° + عہ، ہیں۔

اگر ج پر جَ کے صعودی عقدہ کے محدد (قہ، ۰) لیے جائیں جس سے اکثر سہولت پیدا ہوتی ہے اور اگر صہ کو اِن دائروں کا میلان قرار دیا جائے تو جَ کے شطب کے محدد (قہ + ۲۷۰°، ۹۰° - صہ) حاصل

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہوتے ہیں جبکہ ج حوالہ کا دائرہ ہو۔



شکل (۱۵)

(۳۵) عام طور پر ایک بڑے دائرہ کے لحاظ سے دوسرے بڑے دائرہ کا محل اور اس کی درجہ بندی کی سمت مقرر کرنے کے لیے اس دوسرے دائرہ کے تین مبدل بلحاظ پہلے دائرہ کے معلوم ہونے چاہئیں۔ مثلاً دوسرے بڑے دائرے کے شطب کے دو محدد دئے جا سکتے ہیں کیونکہ اس سے شطب کا محل متعین ہوتا ہے اور پھر نہ صرف وہ بڑا دائرہ متعین ہوتا ہے جس کا قطب یہ شطب ہے بلکہ وہ سمت بھی معلوم ہوتی ہے جس میں دوسرے بڑے دائرہ کی درجہ بندی ہوئی ہے۔ اگر ہمیں صرف اس بڑے دائرہ کے ایک قطب کے محدد دئے جاتے تو بلاشبہ بڑے دائرہ کا محل متعین ہو جاتا لیکن جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ دیا ہوا قطب شطب ہے یا ضد شطب اس وقت تک درجہ بندی کی سمت معلوم نہیں کی جا سکتی۔ تیسرا مبدل اس دوسرے بڑے دائرہ پر درجہ بندی کے مبداء کو مقرر کرنے کے لیے مطلوب ہوتا ہے۔

یا دوسرے دائرہ کے صعودی عقدہ ق کا محل پہلے دائرہ پر

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اور نیز میلان صہ دئے جا سکتے ہیں۔ پہلے دائرہ کے مبداء سے مثبت سمت میں چل کر ہم قہ دریافت کر لیتے ہیں اور اس طرح صعودی عقدہ معلوم ہو جاتا ہے۔ اس صعودی عقدہ پر دوسرا بڑا دائرہ پہلے دائرہ کے مثبت نیم کرہ میں داخل ہو رہا ہوگا۔ اگر ہم اس عقدہ سے دو منتشع قوسیں کھینچیں جن کا درمیانی زاویہ صہ ہو تو مطلوبہ دائرہ کا ٹھیک مقام معلوم کرنے میں کوئی ابہام درپیش نہ ہوگا۔

مثال ۱ — ثابت کرو کہ ج کے لحاظ سے جَ کا صعودی عقدہ، جَ کے لحاظ سے ج کا نزولی عقدہ ہے۔

مثال ۲ — شکل بنا کر یہ بتاؤ کہ ان دو درجہ دار بڑے دائروں کے درمیان کیا فرق ہے جن کے میلان حوالے کے بڑے دائرہ کے ساتھ مساوی ہیں اور جن کے صعودی عقدے مبداء سے فاصلوں طہ اور طہ + ۱۸۰° پر واقع ہیں۔

مثال ۳ — اگر ایک بڑے دائرہ ل کے صعودی عقدہ کا طول بلد قہ ہو اور اس کا میلان حوالے کے محور کے ساتھ صہ ہو اور اگر دوسرے بڑے دائرہ لَ کی متناظر مقداریں قہَ، صہَ ہوں تو ل پر لَ کے صعودی عقدہ ط کے محدد معلوم کرو۔

فرض کرو کہ حوالے کے دائرہ و ع عَ (شکل ۱۶) پر عقدے ع، عَ ہیں تب ل پر لَ کا صعودی عقدہ ط ہے۔ فرض کرو کہ فاصلہ عَ ط، لا ہے۔ اب لا کو صہ، صہَ اور قہَ — قہ کی رقوم میں معلوم کرنا ہے۔



شکل (۱۶)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

دفعہ (۱) کے ضابطہ (۶) سے

مم لا جب (قہ - قہ) = جم (قہ - قہ) جم صہ = - جب صہ مم صہ

اس لیے مم لا = جم (قہ - قہ) جم صہ - جب صہ مم صہ / جب (قہ - قہ)

اب یہ معلوم کرنے کے لیے کہ لا کی کونسی قیمت لی جائے ہم دیکھتے ہیں کہ

جب لا : جب (قہ - قہ) :: جب صہ : جب ط

اور ط اور صہ دونوں < ۱۸۰° ۔ اس لیے جب لا کی وہی علامت ہونی چاہیئے جو جب (قہ - قہ) کی ہے اور اس سے یہ معلوم ہوگا کہ مطلوبہ زاویہ لا ہے یا لا + ۱۸۰° ۔ جب، لا معلوم ہو جائے تو مساواتوں (۳۶)

جب فہ = جب لا جب صہ،

جم فہ جم (عہ - قہ) = جم لا،

جم فہ جب (عہ - قہ) = جب لا جم صہ،

سے ط کے محدد عہ، فہ (حوالے کے دائرہ کے لحاظ سے) معلوم ہوتے ہیں۔

مثال ۴ ۔ پچھلی مثال کے مفروضات کو لیکر ان دو بڑے دائروں کا درمیانی میلان غہ معلوم کرو جن کی تعیین علی الترتیب قہ، صہ اور قہ، صہ سے ہوتی ہے

ہم معلوم کر چکے ہیں کہ شمطبوں کے محدد قہ + ۲۷۰°، ۹۰° ۔ صہ اور قہ + ۲۷۰°، ۹۰° ۔ صہ ہیں اور اس لیے دفعہ ۱۰ مثال ۲ کی رو سے

جم غہ = جم صہ جم صہ + جب صہ جب صہ جم (قہ - قہ)

مثال ۵ ۔ مقادیر (قہ، صہ) اور (قہ، صہ) سے مشخص ہونیوالے دو بڑے دائروں کے مشترک عمود کا طول اگر لا ہو تو ثابت کرو کہ

جم لا = جم صہ جم صہ + جب صہ جب صہ جم (قہ - قہ)

۱۲ ۔ محددوں کا استعمال ۔

فرض کرو کہ ایک نقطہ کے محدد بلحاظ ایک درجہ دار بڑے دائرے کے دیے گئے ہیں تو اکثر اس امر کی ضرورت درپیش ہوتی ہے کہ اسی نقطہ کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

محدد بلحاظ دوسرے درجہ دار بڑے دائرہ کے معلوم کئے جائیں۔

فرض کرو کہ نقطہ پ کے ابتدائی محدد عہ، ضہ ہیں اور نئے نظام میں اسی نقطہ پ کے محدد عہ، ضہ ہیں۔ فرض کرو کہ اسی طرح کسی اور نقطہ پ کے ابتدائی محدد عہ، ضہ اور تبدیل شدہ محدد عہ، ضہ ہیں۔ اب چونکہ اس استحالہ سے فاصلہ پ پ متاثر نہیں ہو سکتا اس لیے یہ فاصلہ وہی ہونا چاہئے خواہ ہم اسے کسی محددوں میں بیان کریں اور اس لیے (دفعہ ۸)

جب ضہ جب ضہ + جم ضہ جم ضہ جم (عہ - عہ) (۳۷)

= جب ضہ جب ضہ + جم ضہ جم ضہ جم (عہ - عہ) ... (۱)

وہ سب ضابطے جو اس استحالہ سے متعلق ہیں فی الحقیقت اس مساوات میں شامل ہیں۔

اگر کسی نقطہ پ کے محدد دونوں نظامات میں معلوم ہوں یعنی اگر عہ، ضہ، عہ، ضہ معلوم ہوں اور اگر ان قیمتوں کو (۱) میں مندرج کیا جائے تو عہ، ضہ اور عہ، ضہ میں بالعموم ایک مساوات حاصل ہوگی۔ اسی طرح کسی اور نقطے کے محدد دونوں نظامات میں معلوم ہوں تو عہ، ضہ اور عہ، ضہ میں ایک دوسری مساوات حاصل ہوگی۔ اس طرح عہ، ضہ کو عہ، ضہ کی رقوم میں بیان کرنے کے لیے دو مساواتیں مل جاتی ہیں۔

لیکن عہ، ضہ کو عہ، ضہ کی رقوم میں یگانہ طور پر معلوم کرنیکے لئے دو مساواتیں کافی نہیں ہیں کیونکہ فاصلوں پ پ، پ پ سے پ کا مقام بغیر ابہام کے متعین نہیں ہوتا۔ صریحاً دو مقامات ہیں جنکو پ اختیار کر سکتا ہے۔ ان مقامات کے فاصلے کسی تیسرے نقطہ پ سے مساوی نہیں ہوں گے سوائے اس صورت کے کہ پ اس بڑے دائرہ پر واقع ہو جائے جو پ پ میں سے گذرتا ہے۔ اس صورت کو خارج کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نقطہ صرف اس وقت متعین ہو سکتا ہے جبکہ اس کے فاصلے تین دئے ہوئے نقطوں سے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

معلوم ہوں۔ پس ہمیں عہ، ضہ اور عہَ، ضہَ کے درمیان ایک تیسری مساوات معلوم کرنی چاہئے اور وہ اِس طرح کہ کوئی تیسرا نقطہ لیا جائے جس کے محدد دونوں نظامات میں عہ، ضہ، اور عہَ، ضہَ معلوم ہوں اور جو اُس بڑے دائرہ پر واقع نہ ہو جو پہلے منتخب کئے ہوئے دو نقطوں میں سے گذرتا ہے۔



شکل (۱۷)

فرض کرو کہ ابتدائی بڑا دائرہ وا (شکل ۱۷) ہے جس کی درجہ بندی تیر کی سمت میں مبداء و سے ہوئی ہے اور جس کا شطب ش ہے۔ فرض کرو کہ وَاَ وہ بڑا دائرہ ہے جس کے لحاظ سے محددوں کو تبدیل کرنا ہے اِس کا شطب شَ اور مبداء وَ ہے۔ فرض کرو کہ پہلے دائرہ پر دوسرے (۳۸)
دائرہ کا صعودی عقدہ ط ہے اور اِس کے فاصلے و اور وَ سے علی الترتیب قہ، قہَ ہیں۔ فرض کرو کہ اِن دو درجہ دار بڑے دائروں کا میلان صہ ہے۔ پس قہ، قہَ، صہ وہ تین مبدل ہیں جو پہلے دائرہ کے لحاظ سے دوسرے درجہ دار بڑے دائرہ کو پوری طرح متعین کرتے ہیں (دفعہ ۱۱)۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اب ہمیں ایسے تین نقطوں کا انتخاب کرنا ہے جو ایک ہی بڑے دائرہ پر واقع نہ ہوں اور ایسے ہوں کہ ان کے محدد دونوں نظامات میں بالراست معلوم ہو سکیں۔

جو نقطے ہم منتخب کریں گے وہ علی الترتیب ط، ا اور ش ہیں۔ شکل سے یہ واضح ہے کہ دونوں نظامات میں ان نقطوں کے محدد حسب ذیل ہیں کیونکہ ط ا = ط ا = ۹۰° :-

ط کے لیے عہ = قہ، ضہ = ۰ اور عہ = قہ، ضہ = ۰

ا کے لیے عہ = ۹۰° + قہ، ضہ = ۰ اور عہ = ۹۰° + قہ، ضہ = - صہ

ش کے لیے عہ = ۰، ضہ = ۹۰° اور عہ = ۹۰° + قہ، ضہ = ۹۰° - صہ

ان محددوں کو باری باری سے مساوات (۱) میں درج کرنے سے استحالہ کے عام ضابطے حاصل ہوتے ہیں

جم ضہ جم (عہ - قہ) = جم ضہ جم (عہ - قہ) ..... (۲)

جم ضہ جب (عہ - قہ) = جب ضہ جب صہ + جم ضہ جم صہ جب (عہ - قہ) ... (۳)

جب ضہ = جب ضہ جم صہ + جم ضہ جب صہ جب (عہ - قہ) (۴)

ان سے حسب ذیل ضابطے اخذ کئے جا سکتے ہیں

جم ضہ جم (عہ - قہ) = جم ضہ جم (عہ - قہ) ..... (۲)

جم ضہ جب (عہ - قہ) = جب ضہ جب صہ + جم ضہ جم صہ جب (عہ - قہ) .. (۵)

جب ضہ = جب ضہ جم صہ - جم ضہ جب صہ جب (عہ - قہ) .. (۶)

کیونکہ (۳) کو جم صہ سے اور (۴) کو جب صہ سے ضرب دیکر ان کو جمع کرنے سے (۵) حاصل ہوتا ہے اور (۴) کو جم صہ سے اور (۳) کو جب صہ سے ضرب دیکر تفریق کرنے سے (۶) حاصل ہوتا ہے۔

مساواتوں کے پہلے جٹ سے محددوں عہ، ضہ کی تعیین ہوتی ہے جبکہ عہ، ضہ معلوم ہوں اور دوسرے جٹ سے محددوں عہ، ضہ کی تعیین ہوتی ہے جبکہ عہ، ضہ معلوم ہوں۔

کروی محددوں کو تبدیل کرنے کے اساسی ضابطے دوسرے طریقہ سے بھی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ثابت کئے جا سکتے ہیں جو حسب ذیل ہے۔

چونکہ ش ش َ (شکل ۱۷) کا قطب ط ہے اِس لیے زاویہ ط ش ش َ = ۹۰° نیز زاویہ ط ش د = عہ - قہ اور اِس لیے زاویہ ش َ ش پ = ۹۰° + عہ - قہ۔ نیز ہم دیکھتے ہیں کہ عَ - قَ = زاویہ ط ش َ د، اِس لیے زاویہ ش ش َ پ = ۹۰° - عَ + قَ۔ (۳۹)

شکل سے یہ بھی ظاہر ہے کہ ش پ = ۹۰° - ضہ، ش َ پ = ۹۰° - ضَ اور ش ش َ = صہ۔ پس مثلث ش ش َ پ میں اِس کے تین ضلعوں اور دو زاویوں کے لیے جملے حاصل ہو گئے اور اِس لیے دفعہ (۱) کے اساسی ضابطوں (۱)، (۲)، (۳) سے ہم ضابطے (۲َ)، (۳َ)، (۴َ) اخذ کرتے ہیں۔

استحالہ کے ضابطوں میں تین مساواتوں کو حاصل کرنے کی ضرورت جس کا ذکر پہلے آ چکا ہے ضابطوں (۲َ)، (۵َ) اور (۶َ) سے واضح کیا جا سکتی ہے۔

فرض کرو کہ مساواتوں (۲َ) اور (۵َ) سے عَ اور ضَ کی قیمتیں تلاش کرنی ہیں۔ ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\text{مس}(\text{عَ} - \text{قَ}) = \{\text{جب ضہ جب صہ} + \text{جم ضہ جم صہ جب}(\text{عہ} - \text{قہ})\} \div \text{قط ضہ قط}(\text{عہ} - \text{قہ})$$

چونکہ بائیں جانب کی سب مقداریں معلومہ ہیں اِس لیے مس (عَ - قَ) معلوم ہو جاتا ہے۔ فرض کرو کہ وہ زاویہ (< ۱۸۰°) طہ ہے جس کے مماس کی قیمت یہ ہے، تب (عَ - قَ) کو ہونا چاہیئے طہ یا طہ + ۱۸۰°۔ ہم مساوات (۲َ) سے اِس بات کا تصفیہ کر سکتے ہیں کہ عَ - قَ کے لیے کونسی قیمت لینی چاہیئے کیونکہ ضہ اور ضَ ہمیشہ حدود - ۹۰° اور + ۹۰° کے درمیان رہتے ہیں اور اِس لیے ضروری ہے کہ جم ضہ اور جم ضَ دونوں مثبت ہوں۔ اِس لیے جم (عَ - قَ) کی علامت وہی ہونی چاہیئے جو جم (عہ - قہ) کی ہے۔ اس طرح یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عَ - قَ کو طہ ہونا چاہیئے یا ۱۸۰° + طہ کیونکہ اِن میں صرف ایک قیمت ایسی ہو گی جو علامت میں جم (عہ - قہ)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کے ساتھ مطابقت کرے گی۔

پس ان دو مساواتوں (۲′) اور (۵′) سے (عہ ـ قہ) بغیر کسی ابہام کے متعین ہوتا ہے اور اس لیے عہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر ہم (۲′) سے جم ضہ معلوم کرتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر دو مساواتوں کا ناکافی ہونا واضح ہو جاتا ہے کیونکہ گو ضہ کی مقدار معلوم ہو جاتی ہے لیکن اس کی علامت غیر متعین رہتی ہے۔ اس لیے (۶′) جیسی تیسری مساوات کی ضرورت لاحق ہوتی ہے جس سے جب ضہ کی قیمت معلوم ہوتی ہے اور اس لیے ضہ کی علامت متعین ہو جاتی ہے۔

عہ، ضہ کو مساواتوں (۲′)، (۵′) اور (۶′) سے معلوم کرنے کا مسئلہ اس طرح بھی حل کیا جا سکتا ہے:۔

مساوات (۶′) سے جب ضہ کی تعیین ہوتی ہے اور اس لیے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ضہ، دو تکمیلی زاویوں میں سے کونسا زاویہ ہے۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ۰° ≤ ضہ ≤ ۹۰° اور اس لیے ضہ کے لیے ہم تکمیلی زاویوں میں سے وہ قیمت اختیار کرتے ہیں جو اس شرط کو پوری کرتی ہے اس طرح ضہ معلوم ہوتا ہے اور اس لیے جم ضہ۔ پھر مساوات (۲′) سے جم (عہ ـ قہ) حاصل ہوتا ہے اور مساوات (۵′) سے جب (عہ ـ قہ) اس لیے عہ ـ قہ بغیر کسی ابہام کے متعین ہوتا ہے کیونکہ اس کی جیب اور جیب التمام دونوں معلوم ہیں۔

مثال ۱ ـ اگر عہ = ۹۰° + قہ، ضہ = ۰ تو ثابت کرو کہ عہ = ۹۰° + قہ، ضہ = صہ اور وہ نقطہ معلوم کرو جو کرہ پر مرتسم ہوتا ہے۔

مثال ۲ ـ ثابت کرو کہ وَ اَ کے شطب کے محدد پہلے اور دوسرے نظاموں میں علی الترتیب (۴۰)

عہ = ۲۷۰° + قہ، ضہ = ۹۰° ـ صہ

اور عہ غیر متعین اور ضہ = ۹۰° ہیں۔

نیز اس امر کی تصدیق کرو کہ یہ مقداریں مساواتوں (۲′)، (۳′)، (۴′) کو پورا کرتی ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۳ — مساواتوں (۲)، (۳)، (۴) کی تصدیق کے طور پر یہ بتاؤ کہ بائیں جانب کے ارکان کے مربعوں کا مجموعہ ایک کے مساوی ہے۔

مثال ۴ — ثابت کرو کہ مساواتوں (۳) اور (۴) سے مساواتیں (۵) اور (۶) فوراً لکھی جا سکتی تھیں۔

کیونکہ ط، و، ا کے لحاظ سے و ا کا تزولی عقدہ ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عہ اور ضہ کو عہ اور ضہ کے ساتھ باہم متبدل کیا جا سکتا ہے اگر ساتھ ہی قہ اور قہ میں سے ہر ایک میں ۱۸۰° کا اضافہ کیا جائے۔

مثال ۵ — اگر دو درجہ دار بڑے دائروں کے مستوی منطبق ہوں اور اگر کرہ پر کے کسی نقطہ کے محدد ایک بڑے دائرہ کے لحاظ سے عہ، ضہ اور دوسرے بڑے دائرہ کے لحاظ سے عہ، ضہ ہوں تو ان محددوں میں ربط معلوم کرو۔

عام ضابطوں (۲)، (۵)، (۶) میں ہم صہ = ۰ رکھتے ہیں اگر ان دو دائروں کی درجہ بندی ایک ہی سمت میں ہوئی ہو اور صہ = ۱۸۰° رکھتے ہیں اگر ان کی درجہ بندی مخالف سمتوں میں ہوئی ہو۔ پہلی صورت میں

جم ضہ جم (عہ − قہ) = جم ضہ جم (عہ − قہ)،

جم ضہ جب (عہ − قہ) = جم ضہ جب (عہ − قہ)،

جب ضہ = جب ضہ

اس لیے ضہ = ضہ اور عہ = عہ + قہ − قہ

دوسری صورت میں

جم ضہ جم (عہ − قہ) = جم ضہ جم (عہ − قہ)،

جم ضہ جب (عہ − قہ) = − جم ضہ جب (عہ − قہ)،

جب ضہ = − جب ضہ

اس لیے ضہ = − ضہ، عہ = قہ + قہ − عہ

محدد ضہ یہاں علامت بدلتا ہے کیونکہ درجہ بندی کی سمت کو الٹ دینے سے مثبت اور منفی نیم کروں کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۶ — فرض کرو کہ بنیادی درجہ دار بڑا دائرہ مس ہے اور فرض کرو کہ کسی نقطہ پ کے محدد بلحاظ مس کے بہ، لہ ہیں۔ فرض کرو کہ مس کوئی دوسرا درجہ دار بڑا دائرہ ہے اور اس کے شلب کے محدد بلحاظ مس کے بہ، لہ ہیں۔ فرض کرو کہ مس پر سَ کے صعودی عقدہ کی علامت قہ سے سَ کے لحاظ سے درجے، منٹ، اور ثانئے تعبیر ہوتے ہیں۔ فرض کرو کہ سَ کے لحاظ سے پ کے محدد بہَ، لہَ ہیں۔ ثابت کرو کہ بہَ، لہَ کو بہ، لہ کی رقوم میں معلوم کرنے کے لیے حسب ذیل مساواتیں ہیں

جم بہَ جم (لہَ - قہ) = جم بہ جب (لہ - لہ)،
جم بہَ جب (لہَ - قہ) = جب بہ جم بہ - جم بہ جب بہ جم (لہ - لہ)،
جب بہَ = جب بہ جب بہ + جم بہ جم بہ جم (لہ - لہ)

اور بہ، لہ کو بہَ، لہَ کی رقوم میں معلوم کرنے کے لیے حسب ذیل مساواتیں ہیں

جم بہ جب (لہ - لہ) = جم بہَ جم (لہَ - قہ)،
جم بہ جم (لہ - لہ) = جب بہَ جم بہ - جم بہَ جب بہ جب (لہَ - قہ)،
جب بہ = جب بہَ جب بہ + جم بہَ جم بہ جب (لہَ - قہ)

مثال ۷ — فرض کرو کہ دو ستاروں کے محدد پہلے نظام میں عم، ضم اور عم۲، ضم۲ اور دوسرے نظام میں عمَ، ضمَ اور عمَ۲، ضمَ۲ ہیں۔ چونکہ دو ستاروں کا باہمی فاصلہ دونوں نظاموں میں وہی ہونا چاہئے اس لیے (۴۱)

جب ضم۱ جب ضم۲ + جم ضم۱ جم ضم۲ جم (عم۱ - عم۲)
= جب ضمَ۱ جب ضمَ۲ + جم ضمَ۱ جم ضمَ۲ جم (عمَ۱ - عمَ۲)

اس کی تصدیق مساواتوں (۲)، (۳)، (۴) سے کرو۔

مثال ۸ — کرہ پر کے محددوں میں ان تبدیلیوں کی تشریح کرو جو کرہ کو اندر کی طرف سے یا باہر کی طرف سے دیکھنے میں وقوع پذیر ہوتی ہیں اور ثابت کرو کہ ضابطے غیر متغیر رہتے ہیں۔

کرہ کو باہر کی طرف سے دیکھنے میں وہ جیسا نظر آتا ہے اس کی بنا پر

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

شکل (۱۷) کھینچی گئی ہے اور بالعموم شکلیں اسی لحاظ سے کھینچی جاتی ہیں۔
لیکن اگر ہم چاہیں کہ شکل (۱۷) کرہ کے ایک حصہ کو تغیر کرے جبکہ اسے اندر کی طرف سے دیکھا جائے تو ط نزولی عقدہ ہوگا۔ پس ضابطوں میں قہ اور ضہ کی بجائے ۱۸۰° + قہ اور ۔ ضہ لکھنا ہوگا اور اسی طرح قہ، ضہ کی بجائے ۱۸۰° + قہ اور ۔ ضہ۔ لیکن ان تبدیلیوں سے ضابطوں (۲)، (۵)، (۶) میں کوئی تغیر نہیں ہوتا۔

مثال ۹ ۔ اگر دو نقطوں کے محدد عہ، ضہ اور عہ، ضہ ہوں تو ثابت کرو کہ اس بڑے دائرہ کے عقدے جو انہیں ملاتا ہے مبدا سے فاصلوں ل اور ل + ۱۸۰° پر واقع ہیں جہاں

$$\text{ظ} = \frac{1}{2}(\text{عہ} + \text{عہ}) - \text{مس}^{-1}\left\{\frac{\text{جب}(\text{ضہ} + \text{ضہ})}{\text{جب}(\text{ضہ} - \text{ضہ})} \text{مس} \frac{1}{2}(\text{عہ} - \text{عہ})\right\}$$

۱۳ ۔ لوکارتموں کا استعمال

۔ اگر استحالہ شدہ محدودوں عہ، ضہ کو محسوب کرنے میں مساواتیں (۲)، (۵)، (۶) اسی شکل میں استعمال کی جائیں جس میں وہ دفعہ (۱۲) میں لکھی گئی ہیں تو مساوات (۶) کی بائیں جانب کی دو رقموں کو لوکارتموں کی مدد سے محسوب کرنا ہوگا اور پھر ضہ کو طبعی جیوب کی جدول سے معلوم کرنا ہوگا۔ مساوات (۲) سے جم (عہ ۔ قہ) معلوم ہوگا اور مساوات (۵) صرف عہ ۔ قہ کی علامت متعین کرنے میں استعمال ہوگی، اس کے لیے صرف بائیں جانب کی دو رقموں کے لوکارتموں کو محسوب کرنے کی ضرورت ہے اگرچہ یہ رقمیں مختلف العلامت ہی کیوں نہ ہوں۔

لیکن اکثر سہولت اس میں خیال کی گئی ہے کہ ضابطوں (۲)، (۵)، (۶) کا استحالہ ایسی امدادی مقداروں کے ذریعہ عمل میں لایا جائے جن کے ادخال سے یہ ضابطے لوکارتمی عمل حساب کے لیے زیادہ موزوں ہو جاتے ہیں۔ ایسا کرنے کا بہترین طریقہ حسب ذیل ہے:۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

فرض کرو کہ م ایک مثبت مقدار ہے اور مہ، صفر اور ۳۶۰° کے درمیان، ایک زاویہ ہے اور یہ دونوں مقداریں ایسی ہیں کہ

جب ضہ = م جم مہ، جم ضہ جب (عہ - قہ) = م جب مہ

اِس لیے مس مہ = مم ضہ جب (عہ - قہ) - اگر مہ وہ چھوٹے سے چھوٹا زاویہ ہے جو اِسے پورا کرتا ہے تو مہ، مہ ہے یا مہ + ۱۸۰° - چونکہ م مثبت ہے اِس لیے مہ کی وہ قیمت منتخب کرنی چاہیئے کہ جم مہ کی وہی علامت حاصل ہو جو جب ضہ کی ہے - اِس طرح لوک م اور مہ معلوم ہو جاتے ہیں - اِن امدادی مقداروں کو (۲)، (۵)، (۶) میں درج کرنے سے یہ مساواتیں حسب ذیل ہو جاتی ہیں (۴۲)

$$\left.\begin{array}{l} \text{جم ضہَ جم (عہَ - قہَ) = جم ضہ جم (عہ - قہ)} \\ \text{جم ضہَ جب (عہَ - قہَ) = م جب (مہ + صہ)} \\ \text{جب ضہَ = م جم (مہ + صہ)} \end{array}\right\} \quad \ldots\ldots (۱)$$

اِن میں سے آخری ضابطے سے ضہَ کی مقدار (≠ ۹۰°) اور علامت دونوں حاصل ہوتے ہیں - اِس قیمت کو دوسرے دو ضابطوں میں درج کرنے سے جم (عہَ - قہَ) اور جب (عہَ - قہَ) دونوں معلوم ہوتے ہیں - پہلے ضابطے سے عہَ - قہَ کی مقدار ملتی ہے اور دوسرے سے اس کی علامت

مثال ۱ - ایک نقطہ کے محدد عہ = ۷۵°، ضہ = ۱۵° ہیں - ضابطوں (۲)، (۵)، (۶) سے ثابت کرو کہ جب اِن محددوں کو مقداروں قہ = ۲۱۵° ۲۳° ۳۰′، صہ = ۱۱۵° سے متعین ہونے والے دائرہ کے لحاظ سے مستحیل کیا جاتا ہے تو یہ محدد ہو جاتے ہیں عہَ = ۳۲۷° ۱۳′ ۳۲″، ضہَ = ۲۹° ۰′ ۰″ -

مثال ۲ - اگر مثال ۱ کو امدادی مقداروں مہ اور م کی مدد سے حل کیا جائے تو ثابت کرو کہ مہ = ۲۹۲° ۳۸′ اور ل م = ۹٫۸۲۷۸ -

مثال ۳ - اگر ط پ کو (شکل ۱۷) خارج کرنے پر وہ شَ شَ سے ک پر ملے تو ثابت کرو کہ م = جم پ ک اور مہ = شَ ک - نیز قائم الزاویہ مثلث شَ پ ک سے ضوابط (۱) حاصل کرو -

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۴۳)

تیسرا باب

زمین کی شکل اور نقشہ کشی

دفعہ		صفحہ
۱۴	تمہید یہ	۶۵
۱۵	عرض بلد	۶۶
۱۶	نصف النہار پر نصف قطر انحناء	۷۱
۱۷	نقشہ کشی کا نظریہ	۷۵
۱۸	نقشہ کے ہم شکل ہونے کی شرطیں	۷۷
۱۹	ہم شکل تعبیر میں پیمانہ	۸۱
۲۰	مرکٹیر (Mercator) کا ظل	۸۱
۲۱	مساوی المبلان	۸۶
۲۲	تسطیحی اظلال	۸۹
۲۳	کرہ پر کے کسی دائرہ کا تسطیحی ظل بھی ایک دائرہ ہوتا ہے	۹۳
۲۴	تسطیحی ظل کے لیے عام ضابطے	۹۶
۲۵	ایسا نقشہ بنانا جس میں کرہ پر کا ہر رقبہ، نقشہ پر مساوی رقبہ کے ذریعہ تعبیر ہو	۹۹

۱۴ — تمہید یہ — ہم دیکھتے ہیں کہ سورج، چاند اور دیگر اجرام فلکی کی شکلیں گول ہیں، اس سے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِس امر کا پتہ چلتا ہے کہ زمین کی شکل بھی گول ہونی چاہیئے۔ اِس کا ثبوت جو روزمرہ حقایق سے دیا جاتا ہے جغرافیہ کی کتابوں میں ملے گا۔

زمین کی شکل کی صحیح پیمائش علم ہیئت میں بُنیادی اہمیت رکھتی ہے اور یہ باب اِس مضمون کے ابتدائی حصوں کے لیے وقف ہوگا اور اِس کی تشریح کی جائے گی کہ زمین جیسی منحنی سطحیں کس طرح مُستوی سطحوں پر تعبیر کی جا سکتی ہیں جیسا کہ نقشہ کشی میں کیا جاتا ہے۔

یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ جملہ "زمین کی شکل" سے مُراد اِس کی وہ بے قاعدہ اور بے ڈھنگی سطح نہیں ہے جو خشکی اور تری میں منقسم ہے اور جیسے ہم فی الواقعی اُسے دیکھتے ہیں بلکہ اِس جملہ سے وہ سطح مُراد ہے جس کا کچھ حصہ ساکن سمندر سے ظاہر ہوتا ہے اور جو دیگر حصوں میں اُس ہموار سطح پر منطبق خیال کی جا سکتی ہے جس تک پانی اُس مقام پر چڑھتا اگر اُسے نہروں کے ذریعہ سمندر سے آزادانہ آنے دیا جاتا، ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ایسی نہریں ایک سمندر سے دوسرے سمندر تک براعظموں کو عبور کر رہی ہیں۔

۱۵ — عرضِ بلد — (۴۴)

اگر زمین کو ایک کرہ تصور کیا جائے تو زمین کی سطح پر کسی مقام کا عرضِ بلد اِس مقام کو زمین کے مرکز سے ملانے والے ارضی نصف قطر اور ارضی خطِ اُستوا کے مُستوی کا درمیانی میلان ہوتا ہے۔ لیکن زمین کی حقیقی شکل کروی نہیں ہے بلکہ اِس کی شکل قریب قریب اُس گردشی کرہ نما کی ہے جو ایک قطع ناقص کو اِس کے محورِ اصغر کے گرد گھمانے سے حاصل ہوتا ہے۔ اِس ناقص کے نیم محوروں کے طول جو کرنل کلارک[1] نے دیے ہیں حسب ذیل ہیں:-

$$ا = ۲۰۹۲۶۲۰۲ \text{ فٹ } [۷،۳۲۰۶۹۰۴]$$
$$= \text{(تقریباً) } ۳۹۶۳۷۳ \text{ میل } [۳،۵۹۸۰۶]$$

[1] دیکھو "جیوڈیسی"، کلارنڈن پریس، ۱۸۸۰ء، صفحہ ۳۱۹۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

= ۶۳۷۸٫۲ کیلومیٹر [۳٫۸۰۴۷۰]

ب = ۲۰۸۵۴۸۹۵ فٹ [۷٫۳۱۹۲۰۸۰]

= (تقریباً) ۳۹۴۹٫۸ میل [۳٫۵۹۶۵۷]

= ۶۳۵۶٫۵ کیلومیٹر [۳٫۸۰۳۲۲]

خطوط وحدانی کے اندر کے عدد اُن عددوں کے لوگارتھم ہیں جو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔

اگر زمین کی سطح کے کسی نقطہ پ پر کا عمود پ ن (شکل ۱۸) خط استواء کے مستوی سے ن پر ملے اور ج ن (نیم محور اعظم) ہو تو زاویہ پ ن ا (= فہ) پ کا جغرافی عرض بلد ہے اور زاویہ پ ج ا (= فَہ) اس کا ارض مرکزی (Geocentric) عرض بلد ہے۔



شکل (۱۸)

اگر قطع ناقص کی مساوات $\frac{\text{لا}^2}{\text{ا}^2} + \frac{\text{ما}^2}{\text{ب}^2} = ۱$ ہو اور پ کے محدد جس کا خارج المرکز زاویہ (Excentric angle) لہ ہے لا اور ما ہوں تو ہم آسانی کے ساتھ یہ دیکھتے ہیں کہ

مس فہ = ا مس لہ \ ب، مس فَہ = ب مس لہ \ ا

اور فہ اور فَہ میں ربط ہے مس فَہ = ب^2 مس فہ \ ا^2 جس سے ارض مرکزی عرض بلد حاصل ہوتا ہے جبکہ حقیقی یا جغرافی عرض بلد معلوم ہو یا اس کے برعکس۔ (۴۵)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہم ر کو جو پ کا ارض مرکزی فاصلہ ہے اِس طرح معلوم کرتے ہیں:-

$$ر^2 = لا^2 + ما^2 = ا^2 \text{جم}^2 \text{لہ} + ب^2 \text{جب}^2 \text{لہ}$$

$$= \frac{ا^4 \text{جم}^2 \text{فہ} + ب^4 \text{جب}^2 \text{فہ}}{ا^2 \text{جم}^2 \text{فہ} + ب^2 \text{جب}^2 \text{فہ}}$$

$$= ا^2 \frac{\text{جم}^2 \text{فہ} + (ا - ز^2)^2 \text{جب}^2 \text{فہ}}{ا - ز^2 \text{جب}^2 \text{فہ}} = ا^2 (ا - ز^2 \text{جب}^2 \text{فہ})$$

اگر ز کی دو سے اعلیٰ ترقوتیں نظرانداز کردی جائیں۔

اُنہی شرطوں کے تحت

$$\text{مس}(\text{فہ} - \text{فہ}_0) = \frac{\text{مس فہ} - \text{مس فہ}_0}{ا + \text{مس فہ مس فہ}_0} = \frac{(ا^2 - ب^2)\text{مس فہ}}{ا^2 + ب^2 \text{مس}^2 \text{فہ}} = ز^2 \text{جب فہ جم فہ}$$

اور اس لیے ہم حسب ذیل نتیجے پر پہنچتے ہیں:-

اگر زمین کے متعلق یہ سمجھا جائے کہ وہ ایک ناقص کو جس کا خروج المرکز ز ہے اِس کے محور اصغر کے گرد گھمانے سے پیدا ہوئی ہے اور اگر زمین کا استوائی نصف قطر اکائی کے طور پر لیا جائے تو زمین کی سطح پر جس نقطہ کا جغرافی عرض بلد فہ ہو اس کا تقریبی ارض مرکزی عرض بلد اور سمتی نصف قطر حسب ذیل ہوں گے:-

$$\text{فہ}_0 = \text{فہ} - \frac{1}{2}[ز^2 \text{قم آ جب ۲ فہ}]$$

$$ر = ا - \frac{1}{4} ز^2 + \frac{1}{4} ز^2 \text{جم ۲ فہ}$$

ا اور ب کی مندرجۂ بالا کلارک کی قیمتیں استعمال کرنے سے

$$ز^2 = (ا^2 - ب^2) \backslash ا^2 = 1 \backslash 147$$

اور اِس لیے ہمیں حاصل ہوتا ہے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

فہَ = فہ − ۰٫۰۰۲ جب ۲ فہ = فہ − [۰٫۰۰۲۱۸۴۶] جب ۲ فہ

ر = ۰٫۹۹۸۳ + [۰٫۰۰۲۳۰۶] جم ۲ فہ

اس لیے جغرافی عرض بلد میں سے ۰٫۰۰۲ جب ۲ فہ تفریق کرنا ہوگا تاکہ ارض مرکزی عرض بلد حاصل ہو۔

اگر تقرب اس سے اعلیٰ تر درجہ تک حاصل کرنا ہو تو حسب ذیل طریقہ پر عمل کیا جا سکتا ہے:۔

$$\text{مس}(\text{فہ} - \text{فہَ}) = \frac{(\text{ا}^2 - \text{ب}^2)\,\text{مس}\,\text{فہ}}{\text{ا}^2 + \text{ب}^2\,\text{مس}^2\,\text{فہ}} = \frac{(\text{ا}^2 - \text{ب}^2)\,\text{جب}\,2\,\text{فہ}}{(\text{ا}^2 + \text{ب}^2) + (\text{ا}^2 - \text{ب}^2)\,\text{جم}\,2\,\text{فہ}}$$

اس سے آسانی کے ساتھ تقریبی ضابطہ

$$\text{فہ} - \text{فہَ} = \frac{\text{ا}^2 - \text{ب}^2}{\text{ا}^2 + \text{ب}^2}\,\text{قم}\,\text{آ}\,\text{جب}\,2\,\text{فہ} - \frac{1}{2}\left(\frac{\text{ا}^2 - \text{ب}^2}{\text{ا}^2 + \text{ب}^2}\right)^2 \text{قم}\,\text{آ}\,\text{جب}\,4\,\text{فہ}$$

حاصل ہوتا ہے۔

فہَ اور ر کو صحیح طور پر محسوب کرنے کے لیے حسب ذیل طریقہ ہے جو اکثر استعمال کیا جاتا ہے:۔

ا کو اکائی کے طور پر لینے سے حاصل ہوتا ہے (۴۶)

$$\text{رجم فہَ} = \text{لا} = \text{جم لہ} = \text{جم فہ} \sqrt{1 - \text{ز}^2\,\text{جب}^2\,\text{فہ}}$$

$$\text{رجب فہَ} = \text{ما} = \text{ب جب لہ} = (1 - \text{ز}^2)\,\text{جب فہ} \sqrt{1 - \text{ز}^2\,\text{جب}^2\,\text{فہ}}$$

اس لیے اگر ہم رکھیں

$$\text{لا} = \frac{(1 - \text{ز}^2)}{\sqrt{1 - \text{ز}^2\,\text{جب}^2\,\text{فہ}}}\,,\quad \text{ما} = \frac{1}{\sqrt{1 - \text{ز}^2\,\text{جب}^2\,\text{فہ}}}$$

تو حاصل ہوتا ہے رجب فہَ = لا جب فہ، رجم فہَ = ما جم فہ

فہ کے ہر درجہ کے جواب میں مقداروں لا اور ما کی قیمتیں ایفیمریس

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

میں ملیں گی۔ چونکہ لا اور ما میں جب ^{2} فہ، ز^{2} سے مضروب ہے اس لیے فہ میں ایک چھوٹی خطا واقع ہو تو اس سے لا اور ما پر کوئی قابل قدر اثر نہیں پڑیگا۔ پس لوک لا اور لوک ما بغیر کسی تکلیف دہ بینی ادراج کے صرف جدول دیکھ لینے سے حاصل کئے جا سکتے ہیں۔ پھر لوک لا اور لوک ما میں علی الترتیب لوک جب فہ اور لوک جم فہ کی ٹھیک ٹھیک قیمتیں جمع کرنے سے ہم لوک رجب فہَ اور لوک رجم فہَ معلوم کرتے ہیں اور پھر ر اور فہَ[1] لوک لا اور لوک ما کے درمیان فرق مستقل ہے۔

اس طریقہ کے اطلاق کی ایک مثال کے طور پر ہم حسب ذیل صورت لے سکتے ہیں:۔

کیمبرج کا جغرافی عرض بلد ۵۲° ۱۲′ ۵۲″ ہے۔ ثابت کرو کہ ارض مرکزی عرض بلد معلوم کرنے میں جو تخفیف استعمال کرنی ہوگی وہ ۱۱′ ۲۲″ ہے۔ نیز کیمبرج کا فاصلہ زمین کے مرکز سے معلوم کرو اگر زمین کے استوائی نصف قطر کو اکائی کے طور پر لیا جائے۔

ل لا = ۹٫۹۹۷۹۵۹۹	لوک ما = ۰٫۰۰۰۹۲۴۷
ل جب فہ ۹٫۸۹۷۷۹۷۲	ل جم فہ ۹٫۷۸۷۲۵۳۴
ل رجب فہَ ۹٫۸۹۵۷۵۷۱	ل رجم فہَ ۹٫۷۸۸۱۷۸۱
ل رجب فہَ ۹٫۷۸۸۱۷۸۱	
مس فہَ ۰٫۱۰۷۵۷۹۰	
ل رجب فہَ ۹٫۸۹۵۷۵۷۱	فہ ۵۲° ۱۲′ ۵۲″
ل جب فہَ ۹٫۸۹۶۶۸۰۱	فہَ ۵۲° ۱′ ۳۰″
ل ر ۹٫۹۹۹۰۷۷۰	فہَ = فہ − ۱۱′ ۲۲″

ر = ۰٫۹۹۷۸۸

[1] اس عرض بلد اور لوک ر کی تخفیف کا حساب لگانے میں مدد دینے کے لیے ای۔ جی۔ اسٹون نے ایک جدول "Monthly Notices" R.A.S. vol. xliii میں دی ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ل ر بلاشبہ رجم فہ سے بھی معلوم ہو سکتا تھا لیکن رجب فہ < رجم فہ اور ہم نے ان دو مقداروں میں سے بڑی مقدار کو استعمال کرنے میں قاعدہ (صفحہ ۱۰) کی پابندی کی ہے۔

(۴۷) **مثال ۱** — زمین کی شکل کے لیے کلارک کے عناصر (ا اور ب کی قیمتیں) استعمال کر کے ثابت کرو کہ

مس فہ = [۹،۹۹۷،۰۳۵۲] مس ف

جہاں خطوط و عدانی کے اندر کے عدد سے ایک جدولی لوکارتم تعبیر ہوتا ہے۔ نیز اگر یہ معلوم ہو کہ گرینچ کا جغرافی عرض بلد ۵۱° ۲۸′ ۳۸″ ہے تو ثابت کرو کہ اس کا ارض مرکزی عرض بلد ۵۱° ۱۷′ ۱۱″ ہے۔

مثال ۲ — اگر ز کی دو سے اعلیٰ تر قوتیں نظر انداز کر دی جائیں تو ثابت کرو کہ

$$\text{لا} = ۱ - \frac{۳}{۲} ز^۲ - \frac{۱}{۴} ز^۲ \text{ جم } ۲ \text{ فہ}$$

$$\text{ما} = ۱ + \frac{۱}{۲} ز^۲ - \frac{۱}{۴} ز^۲ \text{ جم } ۲ \text{ فہ}$$

مثال ۳ — ثابت کرو کہ ل لا اور ل ما کی جدولیں اعشاریہ کے پانچ مقامات کی حد تک مساواتوں

$$\text{ل لا} = ۹،۹۹۷۷۸ - ۰،۰۰۰۷۴ \text{ جم } ۲ \text{ فہ}$$

$$\text{ل ما} = ۰،۰۰۰۷۴ - ۰،۰۰۰۷۴ \text{ جم } ۲ \text{ فہ}$$

سے محسوب کر کے تیار کی جا سکتی ہیں۔

۱۶ — نصف النہار پر نصف قطر انحناء۔

زمین کا انحناء نصف النہار کے کسی نقطہ پر اس لتمی دائرہ کے انحناء کے مساوی ہوتا ہے جو ناقص کے اس نقطہ پر کھینچا گیا ہو۔ اگر اس قطع ناقص $\frac{\text{لا}^۲}{\text{ا}^۲} + \frac{\text{ما}^۲}{\text{ب}^۲} = ۱$ پر کسی نقطہ کے محدد ا جم طہ، ب جب طہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہوں تو اس نقطہ پر کے عماد کی مساوات ہے

لا جب طہ - ب ما جم طہ = (ا^{۲} - ب^{۲}) جب طہ جم طہ (۱)

اور عرض بلد فہ یا وہ زاویہ جو یہ عماد محور اعظم کے ساتھ بناتا ہے مساوات

مس فہ = ا مس طہ \ ب

سے معلوم ہوتا ہے۔

مرکز انحناء دو متصلہ عمادوں کا نقطہ تقاطع ہوتا ہے۔ اس لیے (۱) کو طہ کے لحاظ سے تفرق کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرکز انحناء کے محددوں کو مساوات

لا جم طہ + ب ما جب طہ = (ا^{۲} - ب^{۲}) جم ۲ طہ (۲)

پوری کرنی چاہئے۔

اب (۱) اور (۲) کو لا اور ما کے لیے حل کیا جائے تو مرکز انحناء کے حسب ذیل محدد حاصل ہوتے ہیں

لا = (ا^{۲} - ب^{۲}) جم^{۳} طہ \ ا، ما = (ب^{۲} - ا^{۲}) جب^{۳} طہ \ ب

اور اس لیے نصف قطر انحناء

ر = (ا^{۲} جب^{۲} طہ + ب^{۲} جم^{۲} طہ)$^{\frac{۳}{۲}}$ \ ا ب

یا فہ کی رقوم میں

ر = ا^{۲} ب^{۲} (ب^{۲} جب^{۲} فہ + ا^{۲} جم^{۲} فہ)$^{-\frac{۳}{۲}}$

ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک ہی نصف النہار پر دو نقطوں کا درمیانی فاصلہ س ہو اور ان کے جغرافی عرض بلد نیم قطری زاویوں میں علی الترتیب (۴۸) فہ اور فہ$_{۱}$ ہوں تو

$$س = \int_{فہ}^{فہ_{۱}} \frac{ا^{۲} ب^{۲}}{(ب^{۲} جب^{۲} فہ + ا^{۲} جم^{۲} فہ)^{\frac{۳}{۲}}} \text{ فرفہ}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اس سے آسانی کے ساتھ یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر خروج المرکز کی دوسے اعلیٰ تر قوتیں نظر انداز کی جائیں تو عرض بلدوں فہ اور فہ، کو ملانے والی قوس کی تقریبی قیمت یہ ہے

$$س = (ا - \frac{1}{2} ج)(فہ_۱ - فہ) - \frac{3}{2} ج \text{ جب } (فہ_۱ - فہ) \text{ جم } (فہ_۱ + فہ)$$

جہاں ج = (ا - ب)، مقدار $\frac{ج}{ا}$ کو بالعموم ناقصیت (Ellipticity) کہا جاتا ہے۔

نیز عرض بلد فہ پر نصف النہار کے نصف قطر انحناء کے لیے یہ جملہ حاصل ہوتا ہے

$$ا - \frac{1}{2} ج - \frac{3}{2} ج \text{ جم } ۲ فہ$$

اور نصف النہار کے ربع کا تقریبی طول $\frac{\pi}{4} (ا + ب)$ ہے۔

مثال ۱ — اگر عرض بلدوں ۶۰° اور ۵۴° پر نصف النہاروں کے ایک درجہ کے طول علی الترتیب $س_۱$ اور $س_۲$ ہوں تو ثابت کرو کہ زمین کی ناقصیت اگر زمین کو ایک گردشی کرہ نما سمجھا گیا ہو $\frac{4}{33} (ا - \frac{س_۲}{س_۱})$ ہے۔

عرض بلد فہ پر نصف النہار کے نصف قطر انحناء کا طول $ا - \frac{1}{2} ج - \frac{3}{2} ج$ جم ۲ فہ ہے۔ اس لیے عرض بلد فہ پر ۱° کا طول

$$(ا - \frac{1}{2} ج - \frac{3}{2} ج \text{ جم } ۲ فہ) \frac{\pi}{360} ۲$$

ہے، اس لئے $س_۱ = (ا + \frac{1}{4} ج) \frac{\pi}{360} ۲$

$$س_۲ = (ا - \frac{1}{2} ج) \frac{\pi}{360} ۲$$

اس لیے $$\frac{س_۲}{س_۱} = ا - \frac{3}{4} ج$$

مثال ۲ — اگر ز کی چوتھی قوتوں تک رقمیں لی جائیں تو ثابت کرو کہ جغرافی عرض بلد فہ کے کسی نقطہ پر نصف النہار کے نصف قطر انحناء کے لیے جملہ ہے

$$ر = ا (ا - \frac{1}{4} ز^۲ - \frac{3}{64} ز^۴ - (\frac{3}{4} ز^۲ + \frac{3}{16} ز^۴) \text{ جم } ۲ فہ + \frac{15}{64} ز^۴ \text{ جم } ۴ فہ)$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۳ — زمین کو گردشی کرہ نما سمجھ کر اور اس کے نیم محوروں کو کلارک کے مستقلوں کے مساوی لیکر ثابت کرو کہ قطب سے خط استوا تک کھینچے ہوئے نصف النہار کے ربع میں میٹروں کی تعداد ۱۰۰۰۰۱۸۶ ہے۔ (لوک میٹر فٹوں میں = ۱۵۱۵۹۸۸۹۰)

مثال ۴ — کلارک کی جیوڈیسی (Geodesy) صفحہ ۱۱۲ میں یہ لکھا ہے "ارضیاتی اعمال حساب میں یہ رواج ہے کہ کسی نصف النہار پر پیمایش کردہ فاصلہ کو جبکہ یہ فاصلہ ایک درجہ سے متجاوز نہ ہوتا ہو عرض بلد کے فرق میں اس طرح تبدیل کرتے ہیں کہ اس طول کو اس نصف قطر انحناء سے تقسیم کرتے ہیں جو وسطی نقطہ کے یا زیادہ صحیح طور پر حدود دی (سروں پر کے) عرض بلدوں کے اوسط کے متناظر حاصل ہوتا ہے"۔

(۴۹) اگر فہ + $\frac{1}{2}$ عہ اور فہ − $\frac{1}{2}$ عہ انتہائی عرض بلد ہوں تو ثابت کرو کہ اس مفروضہ کو اختیار کرنے سے تقریباً $\frac{1}{24}$ (۱ − ب) جب۲ عہ جم ۲ فہ کی خطا ہوگی۔

کیونکہ قوس س = (۱ − $\frac{1}{2}$ ج) عہ − $\frac{3}{2}$ ج جب عہ جم ۲ فہ جیسا کہ قبل ازیں دکھایا جا چکا ہے، لیکن مفروضہ قوس (۱ − $\frac{1}{2}$ ج) عہ − $\frac{3}{2}$ ج عہ جم ۲ فہ ہے۔ اس لیے ان کا فرق ہے

$\frac{3}{2}$ ج جم ۲ فہ (عہ − جب عہ) = $\frac{1}{24}$ ج جب۳ عہ جم ۲ فہ

کیونکہ عہ چھوٹا ہے۔ یہ فرق انچوں میں تقریباً

۲۱۴۰۰۰ جب۳ عہ جم ۲ فہ

ہے جو تقریباً نصف انچ ہوگا اگر فہ = ۶۰° اور عہ = ۱۔

مثال ۵ — ثابت کرو کہ عرض بلد فہ سے عرض بلد فہ + ا تک نصف النہار پر چلنے سے فٹوں کی تعداد جو عبور کرنی ہوگی وہ

۶۰۷۷ − ۳۱ جم ۲ فہ

ہے۔

مثال ۶ — اگر عرض بلد فہ کے توازی کا نصف قطر لا میل ہو اور اس توازی کا ارتفاع خط استوا کے اوپر ما میل ہو تو کلارک کے مفروضات

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

تسلیم کرکے ثابت کرو کہ

لا = ۳۹۶۶۷ جم فہ - ۳۱۴ جم ۳ فہ ،

ما = ۳۹۴۶۴ جب فہ - ۳۱۴ جب ۳ فہ

نیز ثابت کرو کہ اگر عرض بلد فہ پر نصف النہار کا نصف قطر انحنا ر ہو تو

ر = ۳۹۵۶۶ - ۲۰۲ جم ۲ فہ

مثال ۷ - کلارک کے مستقلوں سے ثابت کرو کہ عرض بلد فہ پر نصف النہار کے ایک درجہ کا طول فٹوں میں

۳۶۴۶۰۹ - ۱۸۶۷ جم ۲ فہ + ۴ جم ۴ فہ

سے تعبیر ہوتا ہے جہاں فہ، قوس کے وسطی نقطہ کا عرض بلد ہے - نیز ثابت کرو کہ طول بلد کے ایک درجہ کا طول

۳۶۵۵۴۳ جم فہ - ۳۱۲ جم ۳ فہ

ہے -

۱۷ - نقشہ کشی کا نظریہ -

یہاں لفظ نقشہ سے مراد کرہ پر کے نقطوں یا شکلوں کی کوئی مستوی تعبیر ہے - سب سے پہلے اُن طریقوں پر غور کرنا چاہئے جن کے ذریعہ کرہ پر کے ایک نقطہ کے جواب میں نقشہ پر اس کا متناظر نقطہ مقرر ہو سکے - ہمیں یا تو ہندسی عمل معلوم کرنا چاہئے جس کے ذریعہ نقشہ پر کا ہر نقطہ کرہ پر کے اُس نقطہ سے متعلق ہو جائے جسے وہ تعبیر کرتا ہے، یا دو ضابطے معلوم ہونے چاہئیں جن سے یہ دریافت ہو سکے کہ اگر کرہ پر کے کسی نقطہ کے محدد دئے جائیں تو نقشہ پر متناظر نقطہ کے قائم محدد کیا ہیں - یہ دونوں طریقے استعمال کئے جاتے ہیں - ہم ثانی الذکر سے ابتدا کریں گے -

فرض کرو کہ ایک اساسی بڑے دائرہ کے حوالہ سے کرہ پر کے کسی نقطہ کے عرض بلد اور طول بلد علی الترتیب بہ، لہ ہیں - فرض کرو کہ دو علی القوائم محوروں کے لحاظ سے ایک مستوی میں متناظر نقطہ کے محدد لا، ما ہیں -

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۵۰) اگر بہ اور لہ دئے گئے ہوں تو سوال کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لا اور ما کے لیے جملے حاصل ہو سکیں۔ اِس کے عکس مسئلہ پر بھی غور کرنا ہے یعنی اگر لا اور ما دئے گئے ہوں تو بہ اور لہ معلوم کرنے کے لیے کوئی جملے ہونے چاہئیں۔ اِن امور سے

لا = ف$_1$ (بہ، لہ)، ما = ف$_2$ (بہ، لہ)

جیسے رشتوں کے وجود کا اظہار ہوتا ہے جہاں ف$_1$ اور ف$_2$ معلومہ تفاعل ہیں۔ یہ شاید نقشہ کشی کے فن کا عام ترین تخیل ہے۔

بہر حال تفاعلوں ف$_1$ اور ف$_2$ پر بہت سے قیود عائد کرنے ہوں گے تاکہ وہ عملی مقاصد پورے ہو سکیں جن کے لیے نقشے تیار کئے جاتے ہیں۔ مثلاً برطانیہ عظمیٰ کا کوئی نقشہ اُسی وقت مفید ہوگا جبکہ اس پر مختلف قطعات کی وضع قطع حتی الامکان وہی ہو جو زمین کی کروی سطح پر اِن قطعات کی واقعی ہے۔ نیز نقشہ پر دکھائے ہوئے مختلف شہروں کے باہمی فاصلے، کم از کم تقریبی طور پر، اُن حقیقی فاصلوں کے متناسب ہونے چاہئیں جو زمین کی سطح پر بڑے دائرہ کی قوس میں ناپے گئے ہوں۔ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ متذکرۂ بالا شرطیں کسی حال میں بھی ٹھیک ٹھیک پوری نہیں ہو سکتیں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ایسا مستوی نقشہ تیار کیا جا سکے کہ کرہ پر کے نقطوں کے ہر زوج کے درمیانی فاصلے اپنے حقیقی تناسبوں میں اِس نقشہ پر تعبیر ہو سکیں۔ لیکن بلا شبہ مختلف طریقوں سے یہ ممکن ہے کہ ایک ایسی مطابقت پیدا کی جائے کہ ہر کروی شکل جس کا ہر بعد کرہ کے قطر کے مقابلہ میں چھوٹا ہو نقشہ پر ایک شکل کے ذریعہ جو بڑی حد تک مشابہ ہو تعبیر ہو سکے۔

اگر کسی کروی مثلث کو نقشہ میں ایک مستوی مثلث کے ذریعہ تعبیر کرنا ہو تو یہ ظاہر ہے کہ اِن کے متناظر زاوئے مساوی نہیں ہو سکتے کیونکہ کروی مثلث کے تین زاویوں کا مجموعہ ۱۸۰° سے بڑا ہوتا ہے اور اسلیے اس کے زاوئے کسی مستوی مثلث کے زاوئے نہیں ہو سکتے لیکن اگر کروی مثلث بمقابلہ کرہ کی کل سطح کے چھوٹا ہو تو کروی اضافہ (ا + ب + ج − ۱۸۰°)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

چھوٹا ہوگا اور اگر اسے نظر انداز کیا جا سکے تو ہم مختلف طریقوں سے تفاعل ف، اور ف، معلوم کر سکتے ہیں اور اس لیے کرہ پر کا ہر چھوٹا کروی مثلث اُس مثلث کے مشابہ ہوگا جو مستوی میں اس کو تعبیر کرتا ہے۔

ہم شکل تعبیر (Conformal Representation) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ فرض کرو کہ نقشہ پر کے نقطے ا، ب، ج، کرہ پر کے نقطوں ا، ب، ج کو تعبیر کرتے ہیں اور مان لو کہ یہ نقطے متصلہ ہیں۔ اگر نقشہ ہم شکل ہے تو (۵۱)

$$\frac{\text{ا ب}}{\text{أ ب}} = \frac{\text{ب ج}}{\text{ب ج}} = \frac{\text{ج ا}}{\text{ج ا}}$$

اور جب تک کہ کرہ پر کے متصلہ نقطوں کے لئے یہ رشتے عام طور پر درست نہ ہوں نقشہ ہم شکل نہیں ہوگا۔

۱۸ — نقشہ کے ہم شکل ہونے کی شرطیں

وہ عام شرطیں کہ نقشہ ہم شکل ہو اس طرح معلوم کیجاتی ہیں:۔

فرض کرو کہ کرہ پر تین متصلہ نقطے ا، ب، ج ہیں اور ا کے محدد بہ، لہ، ب کے محدد بہ + ھ، لہ + ک، اور ج کے محدد بہ + ھَ، لہ + کَ، ہیں جہاں ھ، ک، ھَ، کَ چھوٹی مقداریں ہیں۔ اب بموجب دفعہ ۸

$$\text{ا ب}^2 = \text{ا}^2 (\text{ھ}^2 + \text{ک}^2 \text{جم}^2 \text{بہ}),\ \text{ب ج}^2 = \text{ا}^2 [(\text{ھ} - \text{ھَ})^2 + (\text{ک} - \text{کَ})^2 \text{جم}^2 \text{بہ}]$$

$$\text{ج ا}^2 = \text{ا}^2 (\text{ھَ}^2 + \text{کَ}^2 \text{جم}^2 \text{بہ})$$

جہاں ا، کرہ کا نصف قطر ہے۔

اگر ا، ب، ج کے جواب میں مستوی نقشہ پر نقطے أ، ب، ج ہوں اور اگر أ کے محدد لا، ما ہوں تو ب کے محدد

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$\text{لا} + \frac{\text{جف لا}}{\text{جف به}} \text{ھ} + \frac{\text{جف لا}}{\text{جف له}} \text{ک}\,،\ \text{ما} + \frac{\text{جف ما}}{\text{جف به}} \text{ھ} + \frac{\text{جف ما}}{\text{جف له}} \text{ک}$$

اور ج کے محدد

$$\text{لا} + \frac{\text{جف لا}}{\text{جف به}} \text{ھ}' + \frac{\text{جف لا}}{\text{جف له}} \text{ک}'\,،\ \text{ما} + \frac{\text{جف ما}}{\text{جف به}} \text{ھ}' + \frac{\text{جف ما}}{\text{جف له}} \text{ک}'$$

ہیں - اگر مثلثات اب ج اور اَبَ جَ مشابہ ہوں اور ھ^2 ایک مشترک جزو ضربی ہو جو ھ، ک، ھَ، کَ پر منحصر نہ ہو تو

$$\left(\frac{\text{جف لا}}{\text{جف به}} \text{ھ} + \frac{\text{جف لا}}{\text{جف له}} \text{ک}\right)^2 + \left(\frac{\text{جف ما}}{\text{جف به}} \text{ھ} + \frac{\text{جف ما}}{\text{جف له}} \text{ک}\right)^2 = \text{ھ}^2 \left(\text{ھ}^2 + \text{ک}^2 \text{جم}^2 \text{به}\right)$$

$$\left(\frac{\text{جف لا}}{\text{جف به}} \text{ھ}' + \frac{\text{جف لا}}{\text{جف له}} \text{ک}'\right)^2 + \left(\frac{\text{جف ما}}{\text{جف به}} \text{ھ}' + \frac{\text{جف ما}}{\text{جف له}} \text{ک}'\right)^2 = \text{ھ}^2 \left(\text{ھ}'^2 + \text{ک}'^2 \text{جم}^2 \text{به}\right)$$

$$\left\{\frac{\text{جف لا}}{\text{جف به}} (\text{ھ} - \text{ھ}') + \frac{\text{جف لا}}{\text{جف له}} (\text{ک} - \text{ک}')\right\}^2 + \left\{\frac{\text{جف ما}}{\text{جف به}} (\text{ھ} - \text{ھ}') + \frac{\text{جف ما}}{\text{جف له}} (\text{ک} - \text{ک}')\right\}^2$$

$$= \text{ھ}^2 \left\{(\text{ھ} - \text{ھ}')^2 + (\text{ک} - \text{ک}')^2 \text{جم}^2 \text{به}\right\} \quad \ldots\ldots (1)$$

یہ مساواتیں ھ، ک، ھَ، کَ کی تمام قیمتوں کے لیے پوری ہوں گی اگر حسب ذیل مساواتیں پوری ہوں

$$\frac{\text{جف لا}}{\text{جف به}} \times \frac{\text{جف لا}}{\text{جف له}} + \frac{\text{جف ما}}{\text{جف به}} \times \frac{\text{جف ما}}{\text{جف له}} = 0 \quad \ldots\ldots (2)$$

$$\left(\frac{\text{جف لا}}{\text{جف له}}\right)^2 + \left(\frac{\text{جف ما}}{\text{جف له}}\right)^2 = \text{جم}^2 \text{به} \left\{\left(\frac{\text{جف لا}}{\text{جف به}}\right)^2 + \left(\frac{\text{جف ما}}{\text{جف به}}\right)^2\right\} \quad \ldots (3)$$

اگر تعبیر ہم شکل ہے تو لا اور ما کو یہ شرطیں پوری کرنی چاہئیں جبکہ ان کو به اور له کی رقوم میں بیان کیا گیا ہو۔ (۵۲)

جب کوئی ہم شکل نقشہ تیار ہو جاتا ہے تو دوسرے متعدد نقشے حسب ذیل طریقہ پر حاصل کئے جا سکتے ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

فرض کرو کہ ملتف متغیر لا + خ ما ، غ سے تعبیر ہوتا ہے جہاں خ حسب معمول ۔ ا کا جذر المربع ہے ۔ اگر ہم غ کا کوئی تفاعل لیں مثلاً غ² یا جب غ یا لوک مس غ وغیرہ یا زیادہ عام صورت میں ف (غ) تو ہمیں ایک دوسرا ملتف متغیر حاصل ہوتا ہے جسکو اس طرح تعبیر کیا جا سکتا ہے :

$$ف (لا + خ ما) = ع + خ و$$

اور نیز $$ف (لا - خ ما) = ع - خ و$$

اِن دونوں مساواتوں کو ہ اور لہ کے لحاظ سے تفرق کریں تو

$$ف' (لا + خ ما)\left(\frac{جف لا}{جف ہ} + خ \frac{جف ما}{جف ہ}\right) = \frac{جف ع}{جف ہ} + خ \frac{جف و}{جف ہ}$$

$$ف' (لا + خ ما)\left(\frac{جف لا}{جف لہ} + خ \frac{جف ما}{جف لہ}\right) = \frac{جف ع}{جف لہ} + خ \frac{جف و}{جف لہ}$$

$$ف' (لا - خ ما)\left(\frac{جف لا}{جف ہ} - خ \frac{جف ما}{جف ہ}\right) = \frac{جف ع}{جف ہ} - خ \frac{جف و}{جف ہ}$$

$$ف' (لا - خ ما)\left(\frac{جف لا}{جف لہ} - خ \frac{جف ما}{جف لہ}\right) = \frac{جف ع}{جف لہ} - خ \frac{جف و}{جف لہ}$$

پہلی اور چوتھی مساواتوں کو ضرب دیکر اس میں دوسری اور تیسری کا حاصل ضرب جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$ف' (لا + خ ما)\, ف' (لا - خ ما)\left(\frac{جف لا}{جف ہ} \times \frac{جف لا}{جف لہ} + \frac{جف ما}{جف ہ} \times \frac{جف ما}{جف لہ}\right)$$

$$= \frac{جف ع}{جف ہ} \times \frac{جف ع}{جف لہ} + \frac{جف و}{جف ہ} \times \frac{جف و}{جف لہ}$$

چونکہ (لا ، ما) ہم شکل تعبیر ہے اِس لیے شرط (۲) کی بنا پر دائیں طرف کا جملہ صفر ہے ۔ پس بائیں طرف کا جملہ بھی صفر ہونا چاہیئے ۔

پھر دوسری اور آخری مساواتوں کو ضرب دینے سے

$$ف' (لا + خ ما)\, ف' (لا - خ ما)\left[\left(\frac{جف لا}{جف لہ}\right)^2 + \left(\frac{جف ما}{جف لہ}\right)^2\right]$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$= \left(\frac{\text{جف ع}}{\text{جف لہ}}\right)^2 + \left(\frac{\text{جف و}}{\text{جف لہ}}\right)^2$$

اوپر پہلی اور تیسری مساواتوں کو ضرب دینے سے

$$\text{ف} (\text{لا} + \text{خ ما})\ \text{ف} (\text{لا} - \text{خ ما}) \left[\left(\frac{\text{جف لا}}{\text{جف بہ}}\right)^2 + \left(\frac{\text{جف ما}}{\text{جف بہ}}\right)^2\right]$$

$$= \left(\frac{\text{جف ع}}{\text{جف بہ}}\right)^2 + \left(\frac{\text{جف ع}}{\text{جف بہ}}\right)^2$$

اِس لیے (۳) سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ

$$\left(\frac{\text{جف ع}}{\text{جف لہ}}\right)^2 + \left(\frac{\text{جف و}}{\text{جف لہ}}\right)^2 = \text{جم}^2 \text{بہ} \left\{\left(\frac{\text{جف ع}}{\text{جف بہ}}\right)^2 + \left(\frac{\text{جف و}}{\text{جف بہ}}\right)^2\right\}$$

اس طرح حسب ذیل اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے :-

(۵۳) اگر بہ، لہ کے کوئی تفاعل لا، ما ہوں جن سے کرہ کی سطح کی ہم شکل تعبیر ایک مستوی پر حاصل ہوتی ہے تو محدد ع، و بھی جن کی تعریف شکل

$$\text{ف} (\text{لا} \pm \text{خ ما}) = \text{ع} \pm \text{خ و}$$

کی کسی مساوات سے ہوی ہو بہ، لہ کے ساتھ ہم شکل تناظر میں ہوں گے۔

مثال۔ اگر کرہ پر کے نقطوں کی ہم شکل تعبیر کے لیے لا اور ما نمونہ

لا = ع جم لہ، ما = ع جب لہ کے تفاعل ہوں جہاں ع، بہ کا ایک تفاعل ہے تو ہم شکل تعبیر کے لیے جو عام شرطیں اوپر بیان کی گئی ہیں اُن سے ثابت کرو کہ

$$\text{ع} = \text{ھ مس} \left(\frac{\pi}{2} \pm \frac{\text{لہ}}{2}\right)$$

لا اور ما کی بجائے اِن کے جملے درج کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مساوات (۲) متماثلاً پوری ہوتی ہے اور مساوات (۳) تحویل ہو کر

$$\text{ع}^2 = \text{جم}^2 \text{بہ} \left(\frac{\text{جب ع}}{\text{جف بہ}}\right)^2$$

ہو جاتی ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

۱۹* - ہم شکل تعبیر میں پیمانہ -

ھ کی ہندسی اہمیت (دفعہ ۱۸) قابل یادداشت ہے - اس کو زیر بحث ظل کا پیمانہ کہتے ہیں کیونکہ مساواتوں (۱) میں سے پہلی مساوات سے جس میں ھ کو اولاً داخل کیا گیا ہے یہ ظاہر ہے کہ ھ وہ جزو ضربی ہے جسے کرہ پر کی کسی چھوٹی قوس پر لگانا ہوگا تاکہ ظل پر متناظر قوس کا ظل حاصل ہو ھ کے لیے جملہ حاصل کرنیکے لیے ہم (چونکہ ظل ہم شکل ہے) کرہ پر نقطہ کے قریب کسی چھوٹی قوس کا مقابلہ ظل پر کی متناظر قوس کے ساتھ کر سکتے ہیں - ہم سادہ ترین صورت کے طور پر طول ھ کی ایک چھوٹی قوس لینگے جو نقطوں (بہ ، لہ) اور (بہ + ھ ، لہ) کے درمیان ہے - تب (۱) سے حاصل ہوتا ہے

$$ھ^{۲}\left(\frac{\text{جف لا}}{\text{جف بہ}}\right)^{۲} + ھ^{۲}\left(\frac{\text{جف ما}}{\text{جف بہ}}\right)^{۲} = ھ^{۲}\,ا^{۲}\,ھ^{۲}$$

اس سے حسب ذیل مسئلہ حاصل ہوتا ہے :-

اگر ایک نقطہ کے قائم مستوی محدد لا ، ما ہوں جو کسی ہم شکل نقشہ میں نصف قطر ا کے کرہ پر کے نقطہ بہ ، لہ کو تعبیر کرتا ہے تو وہ پیمانہ یا جزو ضربی

$$\frac{۱}{ا}\left\{\left(\frac{\text{جف لا}}{\text{جف بہ}}\right)^{۲} + \left(\frac{\text{جف ما}}{\text{جف بہ}}\right)^{۲}\right\}^{\frac{۱}{۲}}$$

ہے جسے کرہ پر کی ہر چھوٹی قوس پر لگانا ہوگا تاکہ اس سے ظل میں متناظر چھوٹا خط حاصل ہو -

۲۰ - مرکیٹر (Mercator) کا ظل - (۵۴)

اب ہم کرہ کی اس تعبیر پر غور کریں گے جو "مرکیٹر کے ظل" کے نام سے مشہور ہے اور جو جہاز رانی میں بہت مفید ہے - اس ظل کی اہم خصوصیتیں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

یہ ہیں:—

(۱) نقشہ پر کے کسی نقطہ کا فصلہ، کرۂ پر کے متناظر نقطہ کے طول بلد کے راست متناسب ہوتا ہے۔

(۲) نقشہ پر کے کسی نقطہ کا معین، کرہ پر کے متناظر نقطہ کے عرض بلد کا ایک تفاعل ہوتا ہے (لیکن طول بلد کا تفاعل نہیں ہوتا)۔

(۳) نقشہ کرہ کی ہم شکل تعبیر ہوتا ہے۔

پہلی شرط لا = ھَ لہ سے بیان ہوتی ہے۔ دوسری شرط کو ظاہر کرنیکے لیے ہم ما = ف (بہ) رکھتے ہیں اور تیسری شرط کو پورا کرنے کے لیے ف کو ایک ایسا جملہ ہونا چاہیئے کہ تعبیر ہم شکل ہو۔ اگر ما کو بہ کے صرف متناسب لیا جائے تو ظل ہم شکل نہیں ہوگا۔

دفعہ (۱۸) کی بنیادی شرطیں (۲) اور (۳) پوری ہونی چاہئیں۔ چنانچہ

$$\frac{\text{جف لا}}{\text{جف بہ}} = ۰ \text{،} \quad \frac{\text{جف لا}}{\text{جف لہ}} = \text{ھَ} \text{،} \quad \frac{\text{جف ما}}{\text{جف بہ}} = \text{فَ (بہ)} \text{،} \quad \frac{\text{جف ما}}{\text{جف لہ}} = ۰$$

ان قیمتوں کو درج کرنے سے دفعہ (۱۸) کی مساوات (۲) متماثلاً صفر ہوتی ہے اور مساوات (۳) ہو جاتی ہے

$$\text{ھَ}^۲ = \text{جم}^۲ \text{بہ} \, [\text{فَ (بہ)}]^۲$$

اور اس لیے $$\frac{\text{فرف (بہ)}}{\text{فر بہ}} = \pm \text{ھَ قط بہ}$$

اگر ہم چاہیں کہ ما کی مثبت سمت، کرۂ پر شمالی سمت کے جواب میں ہو تو اوپر کی علامت (یعنے +) لینی چاہیئے۔ پس

$$\text{ف (بہ)} = \text{ھَ لوک ظا مس} \left(\frac{\pi}{۴} + \frac{\text{بہ}}{۲}\right) + \text{مستقل}$$

اِس مستقل کو صفر کے مساوی بنایا جا سکتا ہے کیونکہ اِس صورت میں نقشہ پر

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

خط استواء کے نقطوں کے لیے معیّن صفر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ اساسی مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے جس پر مرکیٹر کے ظل کا انحصار ہے، اِس مسئلہ کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے:۔

اگر کرہ پر کسی نقطہ کے طول بلد اور عرض بلد لہ، بہ ہوں تو قائم محددوں

$$\text{لا} = \text{ھ لہ}\ ،\ \text{ما} = \text{ھ لوک}_{\text{و}}\ \text{مس}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\text{بہ}}{2}\right)$$

سے ایک نقشہ بنایا جا سکتا ہے جو کرہ کے ساتھ ہم شکل ہوگا۔

(۵۵) یہاں لہ کو نیم قطری زاویوں میں بیان کیا گیا ہے اور مستعمل لوکارتم نیپیری ہے۔ لیکن سہولت اِس میں ہوگی کہ اوپر کی مساواتوں کو اِس طور پر تحویل کیا جائے کہ لہ حسب معمول طول بلد کے درجوں میں بیان ہو جائے اور لوکارتم عام لوکارتموں میں مقیاس ۰٫۴۳۴۴۳ کی مدد سے تبدیل ہو جائیں۔ اِن تبدیلیوں کو عمل میں لانے سے

$$\text{لا} + \frac{۲\pi\ \text{ھ}}{۳۶۰}\ \text{لہ}\ ،\ \text{ما} = \frac{\text{ھ}}{۰٫۴۳۴۴۳}\ \text{لوک}_{۱۰}\ \text{مس}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\text{بہ}}{2}\right)$$

اب ھ کی بجائے ایک نیا مستقل ھ ایسا رکھو کہ $۳۶۰\ \text{ھ} = ۲\pi\ \text{ھ}$ تب ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\text{لا} = \text{ھ لہ}\ ،\ \text{ما} = ۱۳۲\ \text{ھ لوک}_{۱۰}\ \text{مس}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\text{بہ}}{2}\right) \quad \ldots\ldots (۱)$$

جہاں لہ درجوں میں ہے اور معمولی لوکارتم استعمال کیے گئے ہیں۔

مثال ۱۔ ثابت کرو کہ مرکیٹر کے ظل

$$\text{لا} = \text{ھ لہ}\ ،\ \text{ما} = \text{ھ لوک}_{\text{و}}\ \text{مس}\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\text{بہ}}{2}\right)$$

میں پیمانہ ھ قط بہ ۱ سے بیان ہوتا ہے۔

مثال ۲۔ اگر بحر اوقیانوس کے مرکیٹری نقشہ میں شمالی عرض بلد

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

۲۰° کا توازی خط استواء سے ۱۸۵ ملی میٹر پر ہو تو ۲۰° کے توازی کا فاصلہ کیا ہونا چاہئے اور خط استواء پر ۵۰° کا طول کیا ہوگا۔

$$۱۸۵ = ۱۳۲ \text{ ھ لوک مس} \left(\frac{۲۱}{۴} + ۳۵°\right)$$

اس لیے $\text{ھ} = ۱٫۸۶$ اور نقشہ کی مساوات ہے

$$\text{ما} = ۲۴۵ \text{ ملی میٹر} \times \text{لوک مس} \left(\frac{۲۱}{۴} + \frac{\text{بہ}}{۲}\right)$$

اس میں بہ = ۲۰° رکھنے سے ما = ۱۳۸ ملی میٹر حاصل ہوتا ہے۔

پھر چونکہ لا = ۱٫۸۶ اس لیے سوال کے دوسرے حصہ کا جواب

$۱٫۸۶ \times ۵۰ = ۹۳$ ملی میٹر

ہے۔

مثال ۳ — مرکیٹری نقشہ میں

$$\text{ما} = \text{ھ لوک مس} \left(\frac{۲۱}{۴} + \frac{\text{بہ}}{۲}\right)$$

کی بجائے $\text{ما} = \text{ھ لوک مس} \left(\frac{۲۱}{۴} - \frac{\text{بہ}}{۲}\right)$

لینے سے کیا فرق پڑ جائے گا۔

مثال ۴ — اگر عرض بلد پر چھوٹی ارضی قوس س ہو اور اگر اس کا مرکیٹری ظل سَ ہو تو ثابت کرو کہ بہ میں سے گذرتے ہوئے عرض بلد کے ارضی دائرہ کے طول اور ظل کے خط استواء کے طول میں نسبت س : سَ ہے۔

مثال ۵ — مرکیٹری ظل میں ثابت کرو کہ بحری (Nautical) میل (جو مساوی ہے آ عرض بلد) کا طول ایسے بدلتا ہے جیسے عرض بلد کا قاطع (قط)۔

مثال ۶ — ساحلی جہاز رانی میں مرکیٹری نقشوں کا عملی فائدہ یہ ہے کہ ملاح جب یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ دو نقطوں ا اور ب میں کتنے بحری میل (قوس کے منٹوں) کا فصل ہے تو وہ اپنے گنیوں کے سروں کو نقشہ کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اُن نقطوں پر رکھتا ہے جو ا اور ب کے متناظر ہیں اور پھر اُسے اٹھا کر ا اور ب کے عرض بلد کے قریب اُسی نقشہ کے حاشیہ پر عرض بلد کے لیے جو درجہ بندی ہے (۵۶) اُس پر منطبق کر کے مطلوبہ فصل معلوم کر لیتا ہے۔ اُس کے اِس طریق پیمائش کا جواز ثابت کرو۔

نقشہ چونکہ ہم شکل ہے اور کُرہ کے صرف ایک چھوٹے حصہ کو تعبیر کرتا ہے اِس لیے ہم اُسے اِس طور پر استعمال کر سکتے ہیں کہ گویا نقشہ پر کا ہر فاصلہ (بشمول عرض بلدوں کے پیمانہ کے) کُرہ پر کے متناظر فاصلہ کے ٹھیک متناسب ہے۔ لیکن زمین کے مختلف حصوں کو تعبیر کرنے والے نقشوں پر عرض بلد کے مِنٹ طول میں بالعموم مختلف ہوں گے اگرچہ یہ نقشے ایک ہی مرکیٹری ظل کے مختلف حصے ہوں۔ اِس لیے ملاح کو چاہئے کہ وہ اپنا فاصلہ متعلقہ نقشہ سے اور تقریباً اُسی عرض بلد سے محسوب کرے جو اُن نقطوں کا ہے جن کا فاصلہ وہ پیمائش کر رہا ہے۔

مثال ۷ — ثابت کرو کہ مرکیٹری نقشہ پر کیمبرج (عرض بلد ۵۲° ۱۲′ ۵۲″) کے گرد عرض بلد کے ایک درجہ کا طول اُس طول کا ۲٫۰۶ گنا ہے جو خط اُستواء پر طول بلد کے ایک درجہ کا ہے۔

ضابطہ (۱) سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر خط استواء پر طول بلد کے ایک درجہ کا طول ھ ہو تو عرض بلدوں بہ۱ اور بہ۲ کے توازیوں کا درمیانی فاصلہ مرکیٹری نقشہ پر یہ ہے

$$۱۳۲ ھ \left(\text{لوک}_{۱۰} \text{مس}\left(\frac{۴۵}{۴} + \frac{بہ۱}{۲}\right) - \text{لوک}_{۱۰} \text{مس}\left(\frac{۴۵}{۴} + \frac{بہ۲}{۲}\right)\right)$$

اب بہ۱ کی بجائے ۵۲° ۱۲′ ۵۲″ اور بہ۲ کی بجائے ۵۱° ۱۲′ ۵۲″ رکھنے سے یہ جملہ ہو جاتا ہے ۲٫۰۶ ھ۔

مثال ۸ — ثابت کرو کہ مرکیٹری نقشہ پر کسی بڑے دائرہ کی ترسیم کی مساوات ہمیشہ شکل

$$۲ \text{جب}\left(\frac{لا}{۱} + ج\right) = ک\left(\text{قو}\frac{د}{۱} - \text{قو}\frac{ا}{۱}\right)$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کی ہوگی جہاں ۲ π ر، نقشہ پر استوائی محیط کا طول ہے اور ج، ک وہ مستقل ہیں جنسے اس بڑے دائرہ کی تعیین ہوتی ہے۔

مثال ۹ — اگر بہ اتنا چھوٹا ہو کہ مس^{۵} $\frac{۱}{۲}$ بہ کو نظر انداز کیا جا سکے تو ثابت کرو کہ مرکیٹری نقشہ پر اور اس نقشہ پر (جو زمین کے مرکز سے اس نفاف اسطوانہ پر ظل لینے سے حاصل کیا گیا ہے جو زمین کو خط استواء کے پورے طول پر مس کرتا ہے) خط استواء سے ایک مقام کے فاصلوں کا فرق جس کا عرض بلد بہ ہے حسب ذیل ہوگا

$$\frac{۲}{۳} \text{ مس}^{۲} \frac{۱}{۲} \text{ بہ} \times \text{زمین کا قطر}$$

اسطوانہ پر کرہ کی سطح کے کسی نقطہ کا ظل لینے سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{لا} = \frac{۲ \pi ۱ \text{ لہ}}{۳۶۰}, \quad \text{ما} = ۱ \text{ مس بہ}$$

جہاں بہ اور لہ علی الترتیب اس نقطہ کے عرض بلد اور طول بلد ہیں اور ۱، کرہ کا نصف قطر ہے۔

مرکیٹری ظل میں

$$\text{لا} = \frac{۲ \pi ۱ \text{ لہ}}{۳۶۰}, \quad \text{ما} = ۱ \text{ لوک مس} (۴۵ + \frac{۱}{۲} \text{ بہ})$$

اس لیے ان دو صورتوں میں خط استواء سے فاصلوں کا فرق ہے

$$۱ \left(\text{مس بہ} - \text{لوک} \frac{۱ + \text{مس} \frac{۱}{۲} \text{ بہ}}{۱ - \text{مس} \frac{۱}{۲} \text{ بہ}} \right)$$

$$= ۱ \left(۲ \text{ مس} \frac{۱}{۲} \text{ بہ} + ۲ \text{ مس}^{۳} \frac{۱}{۲} \ldots\ldots - \text{مس} \frac{۱}{۲} \text{ بہ} - \frac{۲}{۳} \text{ مس}^{۳} \frac{۱}{۲} \text{ بہ} \right)$$

$$= \frac{۲}{۳} \text{ مس}^{۳} \frac{۱}{۲} \text{ بہ} \times ۱۲ \text{ ر}$$

۲۱* — مساوی المیلان (Loxodrome) — (۵۷)

اگر ہم زمین کو کرہ تسلیم کریں اور فرض کریں کہ ایک جہاز ہمیشہ ایک ہی سمت میں چلتا ہے یعنے ہمیشہ نصف النہار کے ساتھ ایک ہی زاویہ بناتا ہے،

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

تو اس کے راستہ کو ہم مساوی المیلان (Loxodrome) کہینگے ۔ انگریزی میں اس کا دوسرا نام (Rhumb-line) بھی ہے ۔

اگر طول بلد لہ اور عرض بلد بہ ہو اور اگر طہ وہ زاویہ ہو جس پر یہ منحنی خط متواتر نصف النہاروں کو قطع کرتا ہے تو مساوی المیلان کی تفرقی مساوات ہوگی

$$\text{مس طہ} = \text{جم بہ فرلہ} \setminus \text{فربہ}$$

اس لیے (تکمل سے) $\text{لہ} = \text{مس طہ لوک ظو} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\text{بہ}}{2}\right) + \text{مستقل}$

اگر ہم لہ کی اس قیمت کو مرکیٹری ظل

$$\text{لا} = \text{ھ لہ}\ ،\ \text{ما} = \text{ھ لوک ظو مس} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\text{بہ}}{2}\right)$$

میں درج کریں تو حاصل ہوتا ہے

$$\text{لا} = \text{ما مس طہ} = \text{مستقل}$$

جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مساوی المیلان کا مرکیٹری ظل ایک خط مستقیم ہے جو نصف النہاروں کے ظلوں کو اسی زاویہ پر قطع کرتا ہے جس پر مساوی المیلان کرہ کی سطح پر نصف النہاروں کو قطع کرتا ہے ۔

مساوی المیلان کے مرکیٹری ظل کی یہ خاصیت جہاز رانی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیونکہ جب ملاح مرکیٹری نقشہ پر کے دو نقطوں کو ایک خط مستقیم سے ملاتا ہے تو وہ مستقل زاویہ جس پر یہ خط، نصف النہاروں کے ظلوں کو قطع کرتا ہے اس سمت کا اظہار کرتا ہے جس میں اسے ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانا ہوگا ۔

مثال ۱ ۔ اگر ر، کسی کرہ کا نصف قطر ہو اور طہ وہ مستقل زاویہ ہو جس پر مساوی المیلان نصف النہاروں کو قطع کرتا ہے اور اگر + ی وہ محور ہو جو مرکز کو شمالی قطب سے ملاتا ہے اور محاور + لا اور + ما وہ نصف قطر ہوں جو خط استواء پر کے ان نقطوں سے کھینچے گئے ہیں جن کے طول بلد علی الترتیب

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

° اور ۹۰° ہیں تو ثابت کرو کہ مساوی المیلان کی مساواتیں ہیں

رمس طہ فری + ما فرلا − لافرما = ۰،

لا² + ما² + ی² = ر²

مثال ۲ — اگر کرہ کا نصف قطر رہو اور طہ وہ مستقل زاویہ ہو جس پر نصف النہار مساوی المیلان کو قطع کرتے ہیں اور اگر مساوی المیلان کی اُس قوس کا طول س ہو جس کے سروں کے عرض بلد یہ، بہ ہیں تو ثابت کرو کہ

ر (بہ − یہ) = س جم طہ

مثال ۳ — اگر زمین کو ایک کرہ نما سمجھا جائے جو چھوٹے خروج المرکز ز کے ایک قطع ناقص کو اس کے محور اصغر کے گرد گھمانے سے بنا ہے تو ثابت کرو کہ کسی نقطہ کے طول بلد لہ اور عرض بلد یہ میں رشتہ جبکہ یہ نقطہ اُس مساوی المیلان پر واقع ہو جو نصف النہاروں کو مستقل زاویہ طہ پر قطع کرتا ہے حسب ذیل ہے

$$\text{لہ} = \text{مس طہ} \left\{ \text{لوک مس} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\text{یہ}}{2} \right) - \frac{ز^2}{2} \text{جب یہ} \right\} + \text{مستقل}$$

(۵۸) اگر قطع ناقص میں اس نقطہ کا نصف قطر انحنا ر سا ہو اور قطع ناقص اور محور اصغر کے درمیان عمادِ پر مقطوعہ سَ تو

$$\text{رَ} = \frac{\text{ا}}{\sqrt{\text{ا} - ز^2 \text{جب}^2 \text{یہ}}}، \quad \text{س} = \frac{\text{گا}^3}{\text{ا}^2} (\text{ا} - ز^2)$$

اور مساوی المیلان کی تفرقی مساوات ہے

$$\frac{\text{فرلہ}}{\text{فربہ}} = \frac{\text{ر مس طہ}}{\text{گا مس یہ}} = \frac{\text{مس طہ}}{\text{جم یہ}} - ز^2 \text{مس طہ جم طہ} \quad \text{تقریباً}$$

مثال ۴ — ثابت کرو کہ مرکیٹری نقشہ پر جس میں طول کی اکائی اُستوائی طول بلد کا آ لیگئی ہے عرض بلد یہ کے توازی کا معین

۷۹۱۶ لوک مس $\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\text{یہ}}{2} \right)$ − ۳۴۳۸ لہ² جب یہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہوگا جہاں ز اُس قطع ناقص کا خروج المرکز ہے جو زمین کی نصف النہاری تراش لینے سے حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۳ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ظل کا نقطہ لا، ما جو نقطہ لہ، بہ کے جواب میں ہے حسب ذیل مساواتوں سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{لا} = \text{ھ لہ}،$$

$$\text{ما} = \text{ھ} \{ \text{لوک و مس} (\frac{\pi}{4} + \frac{\text{ب}}{2}) - \text{ز}^{2} \text{جب بہ} \}$$

چونکہ لہ، دائری ناپ میں ہے اس لیے ھ = ۳۴۳۸ اور ۳۴۳۸ ÷ ۰٫۴۳۴۳ = ۷۹۱۶ رکھنے سے لا، منٹوں میں حاصل ہوتا ہے۔

۲۲ — تسطیحی اظلال۔

کرۂ پر کے نقطوں کو ہم شکل ظل کے ذریعہ تعبیر کرنے کے اہم ترین طریقوں میں سے ایک طریقہ وہ ہے جو تسطیحی اظلال کے طور پر مشہور ہے۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

کرۂ پر کوئی نقطہ و، ظل کے مبدا کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے، اب ظل کا مستوی اُس بڑے دائرہ کا مستوی یا اس کے متوازی کوئی مستوی لیا جاتا ہے جس کا قطب و ہو۔ اگر کرۂ پر کوئی دوسرا نقطہ پ ہو اور وپ، ظل کے مستوی کو پ پ میں قطع کرے تو ہم کہینگے کہ پ کا تسطیحی ظل پ ہے۔

مستوی وپ پ ج کھینچو جہاں ج کرۂ کا مرکز ہے۔ پ پر کا مماس مستوی، ظل کے مستوی کو ایک خط میں قطع کریگا جو مہ میں سے گذرتا ہے اور کاغذ کی سطح پر عمود ہے۔ فرض کرو کہ اس خط پر کوئی نقطہ مہ ہے۔ اب یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ایسے ظل سے ہم شکل تعبیر حاصل ہوتی ہے ہم پ میں سے گذرنے والی کوئی قوس لیتے ہیں اور نصف النہار کے ساتھ اس کا جو میلان ہے اُس پر اور ظل میں اسکے متناظر جو زاویہ ہے اُس پر غور کرتے ہیں۔

دائرہ کی خاصیتوں سے مہ پ = مہ پ اور اسلیے مہ پ = مہ پ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

پس مثلثات م پ م اور م پَ م مساوی ہیں اور اس لیے زاویہ
م پ م = زاویہ م پَ م ۔ لیکن زاویہ م پ م، کرہ پر کے
دو دائروں کا زاویہ تقاطع ہے اور زاویہ م پَ م، اِن کے ظلّوں کا زاویہ (۵۹)
تقاطع ہے۔ اس لیے مسئلہ ثابت ہو چکا۔

تسطیحی ظِل کے ہم شکل ہونے کا سادہ ترین ثبوت شاید یہ ہے: پ
پر کے کسی خطی عنصر (Line-element) اور پ پر کے متناظر خطی عنصر میں نسبت
$\frac{\text{وپَ}}{\text{وپ}}$ ہے، اِس کو متشابہ مثلثوں کے ذریعہ آسانی کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا
ہے۔ اب یہ واقعہ کہ یہ نسبت خطی عنصر کی سمت پر منحصر نہیں ہے ثابت کرتا ہے کہ
یہ تعبیر ہم شکل ہے۔ نیز ہم دیکھتے ہیں کہ پیمانہ $\frac{\text{وپ}}{\text{وپَ}}$ ہے۔



شکل (۱۹)

یہ ثابت کرنا آگاہی بخش ہوگا کہ تسطیحی ظِل مرکیٹری ظِل سے کس طرح دفعیہ
۱۸ کے اُصول کے ذریعہ ماخوذ کیا جا سکتا ہے یعنے اگر ع + خ و = ف (لا + خ ما) تو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

محدودوں ع، و سے ایک ایسی تعبیر ملتی ہے جو لا، ما سے حاصل ہونے والی تعبیر کے ہم شکل ہے۔

مرکیٹری ظل میں

$$\text{لا} = \text{ھ لہ}، \quad \text{ما} = \text{ھ لوک مس} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\text{بہ}}{2}\right)$$

اس لیے $\dfrac{\text{خ (لا+خ ما)}}{\text{ھ}} = \text{لوک مس} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{بہ}}{2}\right) + \text{خ لہ}$

اور اس لیے $\text{ا و}^{\frac{\text{خ (لا+خ ما)}}{\text{ھ}}} = \text{ا مس} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{بہ}}{2}\right) \text{جم لہ} + \text{خ ا مس} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{بہ}}{2}\right) \text{جب لہ}$

دائیں جانب کا رکن، لا + خ ما کا ایک تفاعل ہے اور اس لیے دفعہ ۱۸ کی رو سے (۶۰)

$$\text{ع} = \text{ا مس} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{بہ}}{2}\right) \text{جم لہ} \quad \text{اور} \quad \text{و} = \text{ا مس} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{بہ}}{2}\right) \text{جب لہ}$$

بھی ایک ہم شکل تعبیر کے محدد ہیں، اور یہ دکھانا آسان ہے کہ یہ محدد تسطیحی ظل کے ہیں کیونکہ اگر خط استواء کے مستوی کو ظل کا مستوی لیا جائے تو شکل ۱۹ میں

زاویہ ف و پ، $\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{بہ}}{2}\right)$ ہے اور

$$\text{ج پ} = \text{ج و مس} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{بہ}}{2}\right)$$

اگر پ کا طول بلد لہ ہو تو ج پ کے ظل، صفر طول بلد کی سمت میں اور اسکے علی القوائم سمت میں، علی الترتیب حسب ذیل ہیں

$$\text{ج و مس} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{بہ}}{2}\right) \text{جم لہ}، \text{ اور ج و مس} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{بہ}}{2}\right) \text{جب لہ}$$

ہم دفعہ ۱۹ کے ضابطوں سے کرہ پر کے نقطہ بہ، لہ پر تسطیحی ظل

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کا پیمانہ متعین کر سکتے ہیں جبکہ ظل کی تعریف مساواتوں

لا = ا جم لہ مس $(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{ب}}{2})$، ما = ا جب لہ مس $(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{ب}}{2})$

کے ذریعہ کی گئی ہو جس میں بنیادی دائرہ کا ضد شطب راس کے طور پر لیا گیا ہے (یعنے ظل کے مبداء کے طور پر) اور ا، کرہ کا نصف قطر ہے۔ پس

$$\frac{\text{جف لا}}{\text{جف ب}} = \frac{\text{ا جم لہ}}{-\text{ا - جب ب}}, \quad \frac{\text{جف ما}}{\text{جف ب}} = \frac{\text{ا جب لہ}}{-\text{ا - جب ب}}$$

اور اسلیے

$$\frac{1}{\text{ا}}\left\{\left(\frac{\text{جف لا}}{\text{جف ب}}\right)^2 + \left(\frac{\text{جف ما}}{\text{جف ب}}\right)^2\right\}^{\frac{1}{2}} = \frac{\text{ا}}{\text{ا + جب ب}}$$

مثال ۱ — کرہ پر کے نقطہ ب، لہ پر پیمانہ کی قیمت تسطیحی ظل کے لیے معلوم کرو جبکہ بنیادی دائرہ کے اوپر راس نقطہ لہ = ۱۸۰، ب = ۰، پر ہو اور ظل کی تعریف مساواتوں

$$\text{لا} = \frac{\text{ا جم ب جب لہ}}{\text{ا + جم ب جم لہ}}, \quad \text{ما} = \frac{\text{ا جب ب}}{\text{ا + جم ب جم لہ}}$$

کے ذریعہ کی گئی۔

مثال ۲ — ثابت کرو کہ زمین کے تسطیحی ظل میں زمین کے کسی نقطہ اور اس کے تحت قدمی نقطہ کے متناظر نقطے نقشہ کے مرکز کے ساتھ ہم خط ہونگے اور ایسے ہونگے کہ نقشہ کے مرکز سے ان کے فاصلوں کا حاصل ضرب مستقل ہوگا۔

مثال ۳ — فرض کرو کہ کرہ پر کے نقطہ ب، لہ کے جواب میں تسطیحی ظل کا نقطہ لا + مف لا، ما + مف ما ہے۔ ثابت کرو کہ مف لا، مف ما (۶۱)
مف لہ، مف ب چھوٹے ہوں تو

مف لا = — ما مف لہ — لا قط ب مف ب

مف ما = لا مف لہ — ما قط ب مف ب

مثال ۴ — دنیا کے نقشہ کو تین حصوں میں بنانا مقصود ہے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جن میں سے دو حائط قطبی ہوں تسطیحی ظل پر اور ایک، استوائی ہو مرکیٹری ظل پر۔ حائط قطبی نقشے ایسے ہونے چاہئیں کہ عرض بلد میں پیمانہ وہی ہو جو دوسرے مرکیٹری نقشہ میں خط استواء پر ہے، نیز صدودی عرض بلد فہ پر پیمانہ تینوں نقشوں کے لیے ایک ہی ہو۔ ثابت کرو کہ

$$۲ \text{ مس فہ } (۱ + \text{جب عہ}) = \text{جب عہ } (۲ + \text{جب عہ})$$

اور یہ کہ عرض بلد فہ میں پیمانہ اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ خط استواء پر کے پیمانہ کو

$$۱ + \frac{\text{جب}^۲ \text{عہ}}{۲ (۱ + \text{جب عہ})}$$

سے ضرب دیا جائے۔

ان پیمانوں سے جو دفعہ ۲۰ مثال ۱ اور دفعہ ۲۲ میں مرکیٹری اور تسطیحی ظلوں کے لیے ثابت کئے گئے ہیں ہمیں علی الترتیب حاصل ہوتا ہے

$$\text{ھ} \backslash (۱ + \text{جب عہ}) = \text{ھ} \backslash ا \text{ ، } \text{ھ} \backslash (۱ + \text{جب فہ}) = \text{ھ قط فہ} \backslash ا$$

ان دو مساواتوں سے $\frac{\text{ھ}}{ا}$ کو ساقط کرنے سے

$$\text{مس فہ} + \sqrt{۱ + \text{مس}^۲ \text{فہ}} = ۱ + \text{جب عہ}$$

اس مساوات کو فہ کے لیے حل کرو تو مطلوبہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

عرض بلد فہ پر کے پیمانہ کو خط استواء پر کے پیمانہ سے جو نسبت ہے وہ قط فہ ہے اور

$$\text{قط فہ} + \sqrt{\text{قط}^۲ \text{فہ} - ۱} = ۱ + \text{جب عہ}$$

کو حل کرنے سے قط فہ مثال میں مندرجہ شرط کے مطابق حاصل ہوتا ہے۔

۲۳۔ کرہ پر کے کسی دائرہ کا تسطیحی ظل بھی ایک دائرہ ہوتا ہے۔

فرض کرو کہ کرہ پر دائرہ کا مرکز ج ہے۔ ظل کے مبداء کرہ کے مرکز

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اور ج میں سے گذرتا ہوا ایک مستوی کھینچو۔

فرض کرو کہ اس مستوی اور دائرہ کے مستوی کا خط تقاطع پ ق ہے۔ وہ مخروط جس کی چوٹی و ہے اور جو دائرہ کے محیط کے سب نقطوں میں سے گذرتا ہے ضرور ہے کہ اس کا محور و ج ہو کیونکہ ج پ = ج ق اور اس لیے زاویہ ج و پ = زاویہ ج و ق۔ یہ ہر اُس مستوی کے لیے درست ہونا چاہئے جو و ج میں سے گذرتا ہے اور یہ صرف اُسی صورت میں ممکن ہے جبکہ و ج، مخروط کا محور ہو۔

ہر مخروط دائری تراش کے دو مستوی رکھتا ہے جو محور کے ساتھ مساوی زاوئے بناتے ہیں اور جنکا خط تقاطع محور پر عمود وار ہوتا ہے۔ ج اور و پر کرہ کے مماس مستوی، ج و کے ساتھ مساوی زاوئے بناتے ہیں اور انکا خط تقاطع، ج و پر عمود ہے۔ لیکن ج پر کا مماس مستوی ایک دائری تراش پ ق کے متوازی ہے اور اس لیے و پر کا مماس مستوی دوسری دائری تراش کے متوازی ہونا چاہئے۔ اِس طرح تشطیحی ظل (۶۲) کی بنیادی خاصیت ثابت ہو جاتی ہے۔



شکل (۲۰)

چونکہ ایک مخروط، دائری تراشوں کے صرف دو نظامات رکھتا ہے اِس لیے سوائے اُن مستویوں کے جو و پر کے مماس کے متوازی ہوں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کوئی دوسرے مستوی نہیں ہو سکتے جو تسطیحی ظل کی امتیازی خصوصیات رکھتے ہوں۔

یہ مسئلہ حسب ذیل طریقہ پر بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔

کرہ کو دئے ہوئے دائرہ کے محیط پر مس کرنے والے مخروط کا ہر مکون دائرہ کے اس مماس پر عمود ہے جو نقطہ تماس پر کھینچا گیا ہو۔ نقطہ تماس پر مکون کے چھوٹے حصوں کے متعلق یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کرہ پر واقع ہیں۔ ظل میں یہ مخروط ایک نقطہ میں سے گذرنے والے خطوط مستقیم کی ایک پنسل بنجاتا ہے اور چونکہ ظل میں زاوئے وہی رہتے ہیں اس لیے دائرہ کا ظل ایک ایسا منحنی ہونا چاہئے جو ان تمام خطوط مستقیم کو علی التوائم قطع کرے یعنی دوسرا دائرہ۔

مثال ۱ ۔ ثابت کرو کہ تسطیحی ظل میں کرہ پر کے کسی دائرہ کے مرکز کا ظل متناظر دائرہ کا مرکز ہوتا ہے اگر اصلی دائرہ کے قطر اتنے چھوٹے ہوں کہ انہیں خطوط مستقیم تصور کیا جا سکے۔

چونکہ زاوئے ظل میں بھی وہی رہتے ہیں اس لیے اصلی دائرہ میں بنایا ہوا کوئی قائم الزاویہ مثلث ظل میں بھی قائم الزاویہ مثلث رہتا ہے اور اس لیے دائرہ کے ہر قطر کا ظل متناظر دائرہ کا ایک قطر ہوتا ہے۔

مثال ۲ ۔ ثابت کرو کہ کرہ کی سطح پر کے کسی نقطہ کو ظل کا مبدا قرار دیکر کرہ کا تسطیحی ظل لیا جائے تو نصف النہاروں کے کسی نظام کا ظل ہم محور دائروں کا ایک نظام ہوگا۔

(۶۳) **مثال ۳** ۔ ثابت کرو کہ تسطیحی ظل میں کرہ پر کے ہم مرکز چھوٹے دائروں کے نظام کا ظل دائروں کا ایک نظام ہوتا ہے جن کے مرکز ہم خط ہوتے ہیں اور ان میں سے ہر دائرہ ہم محور دائروں کے وہی نظام کو علی التوائم قطع کرتا ہے۔

کیونکہ ہم مرکز دائروں کے مرکز ج میں سے گذرنے والے تمام بڑے دائروں کی تقلیب ہم محور دائروں کے ایک نظام میں ہوتی ہے اور چونکہ تقلیب میں زاوئے برقرار رہتے ہیں اسلیے ہم مرکز دائروں کے مقلوب ان ہم محور دائروں کو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

علی القوائم قطع کرنے چاہئیں اور ان کے مرکز اُس خط پر واقع ہونے چاہئیں جو برابر دائرہ وج کا مقلوب ہے جہاں وظل کا مرکز ہے۔

۲۴۔ تسطیحی ظل کے لیے عام ضابطے۔

فرض کرو کہ تسطیحی ظل کے مبدا و سے محدد ۲۷۰° ، بہ ہیں اور فرض کرو کہ کسی دوسرے نقطہ پ کے محدد لہ ، بہ ہیں جہاں ان دونوں نقطوں کے محدد ایک ہی درجہ دار بڑے دائرہ مس کے حوالے سے ہیں۔

فرض کرو کہ مس وہ بڑا درجہ دار دائرہ ہے جس کا قطب و ہے۔

فرض کرو کہ خط مستقیم وپ ، مس کے مستوی کو پ میں قطع کرتا ہے۔ اس طرح پپ کا تسطیحی ظل پ ہے اور ہم مان لیتے ہیں کہ مستوی مس میں پ کے محدد لا ، ما ہیں۔ محور + لا کرہ کا وہ نصف قطر ہے جو کرہ کے مرکز سے ، مس پر مس کے صعودی عقدہ تک کھینچا گیا ہے۔ محور + ما ، مس پر کے نقطہ ۹۰° میں سے گذرتا ہے ، اور یہ مان لیا گیا ہے کہ یہ عقدہ ، مس اور مس دونوں پر درجہ بندی کا مبدا ہے۔

اب ہمیں بہ ، لہ کی رقوم میں لا اور ما کے لیے جملے معلوم کرنا ہے۔

ہم اب کرہ کے مرکز سے حسب ذیل تین قائم محور مان لیتے ہیں :۔

محور + لا ، نقطہ بہ = ۰ ، لہ = ۰ تک

محور + ما ، نقطہ بہ = ۰ ، لہ = ۹۰ تک

محور + ی ، نقطہ بہ = ۹۰° ، لہ غیر متعین ہے

ان محوروں کے حوالے سے و ، پ ، پ کے محدد علی الترتیب حسب ذیل ہیں :۔

	لا	ما	ی
و	۰	۱ جم بہ	۱ جب بہ
پ	لا	ما جب بہ	ما جم بہ
پ	۱ جم بہ جم لہ	۱ جم بہ جب لہ	۱ جب بہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اب چونکہ و، پ اور پ ہم خط ہیں اس لیے

$$\frac{\text{ا جم بہ جم لہ ـ لا}}{\text{جم بہ جم لہ}} = \frac{\text{ا جم بہ جب لہ ـ ما جب بہ.}}{\text{جم بہ جب لہ + جم بہ.}} = \frac{\text{ا جب بہ ـ ما جم بہ.}}{\text{جب بہ ـ جب بہ.}}$$

اِن مساواتوں کو لا اور ما کے لیے حل کرنے سے

$$\text{لا} = \text{ا} \frac{\text{جم بہ جم لہ}}{\text{ا ـ جب بہ جب بہ. + جم بہ جم بہ. جب لہ}} \quad \ldots (۱)$$

$$\text{ما} = \text{ا} \frac{\text{جب بہ جم بہ. + جم بہ جب بہ. جب لہ}}{\text{ا ـ جب بہ جب بہ. + جم بہ جم بہ. جب لہ}} \quad \ldots (۲)$$

اگر و، س کا شطب ہو تو بہ. = ۹۰° اور اس لیے (۶۴)

$$\text{لا} = \text{ا} \frac{\text{جم بہ جم لہ}}{\text{ا ـ جب بہ}}, \quad \text{ما} = \text{ا} \frac{\text{جم بہ جب لہ}}{\text{ا ـ جب بہ}}$$

اگر و، س کا ضد شطب ہو تو بہ. = ـ ۹۰° اور اس لیے

$$\text{لا} = \text{ا} \frac{\text{جم بہ جم لہ}}{\text{ا + جب بہ}}, \quad \text{ما} = -\text{ا} \frac{\text{جم بہ جب لہ}}{\text{ا + جب بہ}}$$

اگر و، س پر واقع ہو تو بہ. = ۰ اور اس لیے

$$\text{لا} = \text{ا} \frac{\text{جم بہ جم لہ}}{\text{ا + جم بہ جب لہ}},$$

$$\text{ما} = \text{ا} \frac{\text{جب بہ}}{\text{ا + جم بہ جب لہ}}$$

اِن ضابطوں میں ہم نے یہ مان لیا ہے کہ س پر درجہ بندی کا صفر، س پر سَ کے صعودی عقدہ کے ساتھ منطبق ہوتا ہے۔ اگر درجہ بندی کا صفر کہیں اور ہو تو فرض کرو کہ اِس صعودی عقدہ کا طول بلد طا ہے۔ تب ضابطوں (۱) اور (۲) میں لہ کی بجائے لہ ـ طا رکھنا چاہیئے اور اِس لیے

$$\text{لا} = \text{ا} \frac{\text{جم بہ جم (لہ ـ طا)}}{\text{ا ـ جب بہ جب بہ + جم بہ جم بہ جب (لہ ـ طا)}} \quad \ldots (۳)$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$\text{ما} = \text{ا} \frac{\text{جب بہ جم بہ} + \text{جم بہ جب بہ جب (لہ - طا)}}{\text{ا - جب بہ جب بہ} + \text{جم بہ جم بہ جب (لہ - طا)}} \quad \ldots (۴)$$

ضابطوں (۱) اور (۲) یا (۳) اور (۴) کے ذریعہ ہم لا اور ما کی قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں جبکہ لہ اور بہ دئے گئے ہوں اور اس طرح قائم محددوں کے ذریعہ کرہ پر کی کسی شکل کا تسطیحی نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔

مثال ۱ — ثابت کرو کہ اگر تسطیحی ظل بنیادی دائرہ کے شطب سے ہو اور محور + لا، نقطہ لہ = ۰، بہ = ۰ سے کرہ کے مرکز تک اور محور + ما، نقطہ لہ = ۹۰° بہ = ۰ سے کرہ کے مرکز تک ہو تو لا، ما، اور لہ، بہ کے درمیان رشتے

$$\text{لا} = \text{ا جم لہ مس} \left(\frac{\pi}{۴} + \frac{\text{بہ}}{۲}\right)، \quad \text{ما} = \text{ا جب (مس} \left(\frac{\pi}{۴} + \frac{\text{بہ}}{۲}\right)$$

ہیں۔

مثال ۲ — ثابت کرو کہ اگر تسطیحی ظل بنیادی دائرہ کے ضد شطب سے ہو اور محور + لا، مرکز سے نقطہ لہ = ۰، بہ = ۰ تک اور محور + ما، مرکز سے نقطہ لہ = ۹۰°، بہ = ۰ تک ہو تو لا، ما اور لہ، بہ کے درمیان رشتے

$$\text{لا} = \text{ا جم لہ مس} \left(\frac{\pi}{۴} - \frac{\pi}{۲}\right)، \quad \text{ما} = -\text{ا جب لہ مس} \left(\frac{\pi}{۴} - \frac{\text{بہ}}{۲}\right)$$

ہیں۔

مثال ۳ — اگر ظل کا مبداء گرینوچ پر ہو اور زمین کو کروی مان لیا جائے تو بتاؤ کہ ضابطوں (۳) اور (۴) کے ذریعہ کس طرح اسٹریلیا کا تسطیحی نقشہ بنایا جا سکتا ہے۔

بہ کی بجائے گرینوچ کا عرض بلد درج کرو اور یہ مان کر کہ طول بلد لہ گرینوچ سے پیمائش کئے گئے ہیں طا = ۹۰° رکھو۔ اب اگر اسٹریلیا کے ساحل پر کسی نقطہ کے طول بلد اور عرض بلد لہ اور بہ ہوں تو (۳) اور (۴) سے متناظر مستوی قائم محدد لا اور ما متعین ہو جائیں گے اگر مستقل ا کو ایسی قیمت دی گئی ہو جو نقشہ کے مطلوبہ عرض و طول کے لحاظ سے سہولت بخش ہو۔ (۶۵)

مثال ۴ — اگر لہ، بہ متغیر محدد سمجھے جائیں لیکن اس رشتہ کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

تحت کہ

ا جم لہ جم بہ + ب جب لہ جم بہ + ج جب بہ = ۰

جہاں ا، ب، ج مستقل ہیں تو (۳) اور (۴) سے ثابت کرو کہ وہ سب نقطے جو لا، ما سے تعبیر ہوتے ہیں ایک ہی دائرہ کے محیط پر واقع ہوں گے۔

۲۵ — ایسا نقشہ بنانا جس میں کرہ پر کا ہر رقبہ، نقشہ پر سادی رقبہ کے ذریعہ تعبیر ہو۔

اگر ایسے نقشہ پر تین نقطے (لا، ما)، (لاَ، ماَ)، (لاً، ماً) ہوں تو وہ رقبہ جو ان کے اندر آتا ہے یہ ہے

$$\frac{1}{2}\{\text{لا}(\text{ماً}-\text{ماَ})+\text{لاَ}(\text{ما}-\text{ماً})+\text{لاً}(\text{ماَ}-\text{ما})\} \quad \ldots\ldots (۱)$$

فرض کرو کہ کرہ پر متناظر نقطے (بہ، لہ)، (بہ + ک، لہ) اور (بہ، لہ + ھ) ہیں جہاں ک اور ھ چھوٹی مقداریں ہیں۔ وہ رقبہ جو ان نقطوں سے کرہ پر حاصل ہوتا ہے $\frac{1}{2}$ ا^2 ھ ک جم بہ ہے

نیز محددوں لاَ، ماَ کے لیے جملے

$$\text{لا} + \frac{\text{جف لا}}{\text{جف بہ}}\text{ک}\text{،}\ \text{ما} + \frac{\text{جف ما}}{\text{جف بہ}}\text{ک}$$

اور محددوں لاً، ماً کے لیے جملے

$$\text{لا} + \frac{\text{جف لا}}{\text{جف لہ}}\text{ھ}\text{،}\ \text{ما} + \frac{\text{جف ما}}{\text{جف لہ}}\text{ھ}$$

حاصل ہوتے ہیں۔

پس (۱) میں انہیں درج کرنے سے مستوی میں رقبہ کے لیے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{1}{2}\left\{\text{لا}\left(\frac{\text{جف ما}}{\text{جف لہ}}\text{ھ}-\text{ک}\frac{\text{جف ما}}{\text{جف بہ}}\right)-(\text{لا}+\frac{\text{جف لا}}{\text{جف بہ}}\text{ک})\frac{\text{جف ما}}{\text{جف لہ}}\text{ھ}+(\text{لا}+\frac{\text{جف لا}}{\text{جف لہ}}\text{ھ})\text{ک}\frac{\text{جف ما}}{\text{جف بہ}}\right\}$$

$$= \frac{1}{2}\text{ھ ک}\left(\frac{\text{جف لا}}{\text{جف لہ}}\times\frac{\text{جف ما}}{\text{جف بہ}}-\frac{\text{جف لا}}{\text{جف بہ}}\times\frac{\text{جف ما}}{\text{جف لہ}}\right)$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

رقبہ کے لیے یہ دو جملے جو حاصل ہوئے ہیں انہیں مساوی رکھنے اور یہ دیکھنے سے کہ تمام سطحیں ایسے ہی چھوٹے رقبوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں ہم اس مسئلہ پر پہنچتے ہیں کہ

اگر ایک کرہ کا مستوی ظل ایسا ہو کہ کرہ پر کے نقطہ لہ، بہ کے متناظر نقطہ کے محدد لا اور ما، شرط

$$\frac{\text{جف لا}}{\text{جف لہ}} \times \frac{\text{جف ما}}{\text{جف بہ}} - \frac{\text{جف لا}}{\text{جف بہ}} \times \frac{\text{جف ما}}{\text{جف لہ}} = \text{ا}^{\text{۲}}\text{جم بہ} \quad \ldots\ldots (۲)$$

کو پورا کریں تو کرہ پر کا کوئی رقبہ مساوی رقبہ میں مستوی پر مظلل ہوگا۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۶۶)

تیسرے باب پر متفرق مثالیں

مثال ۱۔ اگر ایک کرہ پر کے نقطوں کو کرہ کے مرکز سے ایک مستوی پر مُظلل کیا جائے (Gnomonic Projection) تو دفعہ ۱۸ کے اصولوں کے ذریعہ اس امر کا امتحان کرو کہ آیا یہ ظل ہم شکل ہے۔

مثال ۲۔ اگر کرہ کے ایک بڑے دائرہ پر موقوعہ کسی نقطہ کا طول بلد اور عرض بلد (ل، فہ) ہوں تو ثابت کرو کہ

مس فہ = ا جم ل + ب جب ل

جہاں ا اور ب مستقل ہیں۔ پھر اگر ہم رکھیں

(۱) لا = مم فہ جم ل، ما = مم فہ جب ل

یا (۲) لا = مس فہ قطال، ما = مس ل

تو لا اور ما میں (یا لا اور ما میں) ایک خطی رشتہ حاصل ہوتا ہے۔ اسلیے لا اور ما (یا لا اور ما) کو کارٹیزی محددوں کے طور پر مرتسم کیا جائے تو تمام بڑے دائرے خطوط مستقیم ہوں گے۔

بتاؤ کہ کرہ کا منظری ظل مستوی پر لینے سے یہ دو نقشے کس طرح تیار کئے جا سکتے ہیں۔

مثال ۳۔ زمین کی سطح پر ایک دائرہ کا زاوئی نصف قطر ر ہے اور اس کا مرکز ا عرض بلد یہ میں واقع ہے۔ ثابت کرو کہ اگر شمالی قطب کو ظل کا مبدا لیکر خط استواء کے مستوی پر زمین کا تسطیحی ظل حاصل کیا جائے تو اس ظل میں مذکورہ بالا دائرہ ایک دائرہ (نصف قطر ر) سے تعبیر ہوگا جس کے مرکز کا فاصلہ اُس نقطہ سے جو ا کو تعبیر کرتا ہے حسب ذیل ہوگا

$$\text{ر مس} \frac{\text{ر}}{۲} \text{ مس} \left(\frac{۲۱}{۴} + \frac{۲۱}{۲} \right)$$

مثال ۴۔ کرہ کے اُس ظل میں جو گاؤس سے منسوب ہے نصف النہار

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ایک نقطہ و میں سے گذرنے والے خطوط مستقیم سے تعبیر ہوتے ہیں۔ ایسے کسی دو خطوں کا درمیانی زاویہ ھ لہ ہے جہاں لہ، متناظر نصف النہاروں کے طول بلدوں کا فرق ہے۔ عرض بلد کے توازی، دائری قوسوں سے تعبیر ہوتے ہیں جن کے مرکز و پر ہیں۔ اگر یہ تعبیر ہم شکل ہو تو ثابت کرو کہ اس قوس کا نصف قطر جو عرض التمام ع کے جواب میں ہے ک (مس ½ ع)^ھ ہونا چاہیئے جہاں ک مستقل ہے۔

ہمیں حاصل ہونا چاہیئے لا = ع جم (لالہ)، ما = ع جب (ھ لا) جہاں ع، عرض بلد کا ایک تفاعل ہے۔ دفعہ ۱۸ کی مساوات (۳) میں درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$ھ^{۲} ع^{۲} = جم^{۲} بہ \left(\frac{جف ع}{جف بہ}\right)$$

مثال ۵ ۔ اگر

$$لا = ھ \left(\frac{۲ا}{۲} - لہ\right)، \quad ما = ھ لوک مس \left(\frac{۲ا}{۴} + \frac{بہ}{۲}\right)$$

تو ثابت کرو کہ $مس \frac{لا + خ ما}{ھ ۲} = ع + خ و$

جہاں ع = جم بہ جم لہ \ (۱ + جم بہ جب لہ)، و = جب بہ \ (۱ + جم بہ جب لہ)

اور اس لیے بتاؤ کہ ع، و ایسے محدد ہیں کہ ان سے ایک ہم شکل تعبیر حاصل ہوتی ہے۔

(۶۷) **مثال ۶** ۔ اگر کرہ پر کا نقطہ بہ، لہ ایک مستوی پر کے اس نقطہ سے تعبیر ہو جس کے محدد

$$لا = \frac{جم بہ جم لہ}{۱ + جم بہ جب لہ}، \quad ما = \frac{جب بہ}{۱ + جم بہ جب لہ}$$

ہیں تو ثابت کرو کہ کرہ پر کا ایک دائرہ جس کا نصف قطر ر ہے اور مرکز بہ، لہ ہے مستوی پر ایک دائرہ سے تعبیر ہوگا جس کا نصف قطر جب ر \ (جم ر + جم بہ جب لہ) ہوگا اور جس کے مرکز کے محدد جم بہ جم لہ \ (جم ر + جم بہ جب لہ) اور جب بہ \ (جم ر

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

+ جم بہ جب لہ) ہونگے ۔

مساوات جم ر = جب بہ جب بہ + جم بہ جم بہ جم (لہ - لہ) کی مدد سے بہ اور لہ کو ساقط کرو ۔

مثال ۷ ۔ شمالی نصف کرہ کا ایک نقشہ اس طرح بنایا گیا ہے کہ عرض بلد کے توازی ہم مرکز دائرے ہیں اور نصف النہار ان دائروں کے نصف قطر ہیں اور یہ کہ زمین پر کے مساوی رقبے نقشہ پر مساوی رقبوں سے تعبیر ہوتے ہیں ۔ اس منحنی کی مساوات معلوم کرو اور اسے مرتسم کرو جو نقشہ پر ایک مساوی المیلان کو تعبیر کرتا ہے ۔

سوال کی شرطوں سے حاصل ہوتا ہے

لا = ر جم لہ ، ما = ر جب لہ

جہاں ر ، بہ کا تفاعل ہے ۔

چونکہ رقبے وہی رہتے ہیں ہم ان قیمتوں کو دفعہ ۲۵ میں مندرجہ شرط میں درج کرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ

$$ر \frac{\text{جف ر}}{\text{جف بہ}} = -\text{ھ جم بہ}$$

جہاں ھ ایک مستقل ہے جو کرہ پر کے اور ظل پر کے رقبوں کی نسبت کے ساتھ مربوط ہے ۔

تکمل کرنے اور اختیاری مستقل کو اس شرط سے معلوم کرنے سے کہ ر = ۰ جبکہ بہ = ۹۰° ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$ر^{۲} = ۲ \text{ھ} (۱ - \text{جب بہ})$$

اور اس لیے $ر = ۲\sqrt{\text{ھ}} \text{ جب} \left(\frac{\pi}{۴} - \frac{\text{بہ}}{۲}\right)$

اس مساوی المیلان خط کا ظل جو نصف النہاروں کو زاویہ صہ (دفعہ ۲۱) پر قطع کرتا ہے حسب ذیل مساواتوں

$$\text{لہ} = \text{مس صہ لوک ظا مس} \left(\frac{\pi}{۴} - \frac{\text{بہ}}{۲}\right)$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$\text{مس لہ} = \frac{\text{ما}}{\text{لا}}\ ،$$

$$\sqrt{\text{لا}^2 + \text{ما}^2} = 2\sqrt{\text{ھ}}\ \text{جب}\left(\frac{\pi}{4} - \frac{\text{بہ}}{2}\right)$$

کے درمیان بہ اور لہ کو ساقط کرنے سے حاصل ہوتا ہے اور یہ حاصل اسقاط قطبی محددوں میں

$$\text{ر}^2\,(1 + \text{قو}^2\,\text{ط}\,\text{مم صہ}) = 4\,\text{ھ}^2$$

ہے۔

مثال ۸۔ ثابت کرو کہ عرض بلد کے توازی پر سفر کرنے کی بجائے ایک بڑے دائرہ پر سفر کرنے سے وہ بڑے سے بڑا فاصلہ جس کی بچت کی جا سکتی ہے یہ ہے

$$\text{ا}\left[2\,\text{جب}^{-1}\frac{2}{\pi} + \sqrt{\pi^2 - 4} - \pi\right]$$

جہاں ا، زمین کا نصف قطر ہے۔

(۶۸) یہ واضح ہے کہ مفروضہ صورت میں آمد و رفت کے بندرگاہوں کے طول بلدوں کے درمیان فرق ۱۸۰° ہونا چاہئے تاکہ ان کو ملانے والا بڑا دائرہ قطب میں سے گذرے۔ اگر عرض بلد فہ ہو تو ان دو سفروں میں مسافت کا فرق ا (π جم فہ − π + ۲ فہ) ہے اور یہ اعظم قیمت اختیار کرے گا جبکہ جب فہ = $\frac{2}{\pi}$۔

مثال ۹۔ ثابت کرو کہ ایک نصف النہار سے ایک مقام تک جو دوسرے نصف النہار پر اسی عرض بلد میں ہے سفر کرنے میں مشرق اور مغرب کی سمت میں سفر کرنے کی بجائے ایک بڑے دائرہ پر سفر کرنے سے فاصلہ میں جو بچت ہوتی ہے وہ عرض بلد

$$\text{جم}^{-1}\left(\sqrt{\text{لہ}^2 - \text{جب}^2\,\text{لہ}}\ \backslash\ \text{لہ جب لہ}\right)$$

کے لیے اعظم ہے جہاں لہ ان دو نصف النہاروں کے طول بلد کا فرق ہے۔

مثال ۱۰۔ ایک جہاز کا چھوٹے سے چھوٹا راستہ معلوم کرو جسے ایک

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

نقطہ سے دوسرے نقطہ تک ایک خاص عرض بلد کو عبور کئے بغیر جانا ہے، یہ فرض کر لیا جائے کہ بڑے دائرہ کا راستہ اس عرض بلد کو قطع کرتا ہے۔

مثال ۱۱ — کیپ کلیر عرض بلد ۵۱° ۲۶′ ش اور طول بلد ۹° ۲۹′ م میں ہے۔ کیپ ریس عرض بلد ۴۶° ۴۰′ ش اور طول بلد ۵۳° ۸′ م میں ہے۔ اس امر کی تصدیق کرو کہ ان کے درمیان بڑے دائرہ کا راستہ سفر کے لیے اختیار کرنے میں اس بات کی ضرورت ہے کہ کیپ کلیر سے اوپر ½ ۱۷° شمالی راستہ اختیار کیا جائے بہ نسبت اس سیدھے راستہ کے جو مرکیٹری نقشہ سے معلوم ہوتا ہے۔ نیز یہ ثابت کرو کہ اول الذکر راستہ دوسرے راستہ کی بہ نسبت ۲۸ میل چھوٹا ہے۔

مثال ۱۲ — اگر کرہ کا نصف قطر ر اور ظل کے مبداء سے تسطیحی ظل کے مستوی کا فاصلہ م ہو، پ اور پ' متناظر نقطوں کا ایک زوج ہوں اور ظل کے مبداء میں سے گذرنے والے قطر سے پ' کا فاصلہ ر ہو تو ثابت کرو کہ پ کے قریب ایک چھوٹی قوس ر کا ظل، پ' کے قریب ایک چھوٹی قوس کا طول ر (م² + ر²)\ ۲م ر ہوگا۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۶۹)

چوتھا باب
کرۂ سماوی

دفعہ		صفحہ
۲۶	کرۂ سماوی	۱۰۶
۲۷	افق سماوی	۱۱۰
۲۸	یومی حرکت	۱۱۱
۲۹	نصف النہار اور اول السمت	۱۱۵
۳۰	ارتفاع اور السمت	۱۱۹

۲۶ — کرۂ سماوی

فرض کرو کہ تین ستارے ا، ب، ج (شکل ۲۱) ہیں اور مشاہد کا محل و ہے۔



شکل (۲۱)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

فرض کرو کہ مرکز و اور کوئی نصف قطر و ا لیکر ایک کرہ بنایا گیا ہے جو
(۷۰) و ا، و ب، و ج کو علی الترتیب ا، ب، ج پر قطع کرتا ہے اور اس طرح
کروی مثلث ا ب ج حاصل ہوتا ہے۔

زاویہ ا و ب وہ زاویہ ہے جو ستارے ا اور ب، مشاہد کی
آنکھ پر بناتے ہیں۔ اس کو آسانی کے ساتھ ا ب کے ذریعہ ناپا جا سکتا ہے
جو مثلث ا ب ج کا ایک ضلع ہے اسی طرح ب ج اور ج ا سے
ب و ج اور ج و ا کے ناپ حاصل ہوتے ہیں۔

پس دو ستاروں کا ظاہری فاصلہ اس زاویہ سے ناپا جاتا ہے جو ان
ستاروں کے محاذی مشاہد کی آنکھ پر بنتا ہے۔ مثلاً ا اور ج کا ظاہری فاصلہ
زاویہ ا و ج کے ذریعہ یعنے ا ج کے ذریعے ناپا جاتا ہے۔ دو ستاروں
کے باہمی فاصلہ سے جو فی الحقیقت صرف ایک زاویہ ہے اس امر کا کوئی
ایما نہیں ہوتا کہ ان کے درمیان اصلی فاصلہ کیا ہے، یہ فاصلہ بلا شبہ ایک
خطی مقدار ہے۔ اس اصلی فاصلہ کو معلوم کرنے کے لیے مشاہد کے مقام
سے ان ستاروں کے خطی فاصلے معلوم ہونے چاہئیں۔ ثریا (Pleiades)
کے ستارے دب اکبر (Ursa Major) کے ستاروں کی بہ نسبت باہم بہت
نزدیک نظر آتے ہیں لیکن اس سے یہ نتیجہ برآمد ہونا ضروری نہیں ہے کہ ثریا
(Pleiades) کے ستارے باہم ایک دوسرے کے قریب واقع ہیں۔

اجسام سماوی کے اضافی محلوں کی فلکی پیمائشوں سے صرف ظاہری
فاصلوں کی تعیین ہوتی ہے اور یہ فاصلے جیسا کہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں وہ
قوسیں ہیں جو و کے گرد کھینچے ہوئے کرہ پر واقع ہیں۔ اس لیے فلکی پیمائشوں
کا علم ہندسہ، کرہ کا علم ہندسہ ہے۔

زیر بحث کرہ سے اجسام سماوی کے ظاہری فاصلے بعینہ اس طرح
معلوم ہوتے ہیں جیسے وہ آسمان پر دکھائی دیتے ہیں۔ اس لیے اس کرہ کو
کرۂ سماوی کہا جاتا ہے۔ اس کے نصف قطر کا طول غیر اہم ہے اور مختلف
سماوی کروں کا مقابلہ کرنے میں ہم ان کے نصف قطروں کو مساوی مان سکتے ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کسی کرۂ سماوی کا مرکز مشاہد کا مقام ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ ہر مقام کے لیے ایک مختلف کرۂ سماوی ہوگا۔ اب ہم اس امر پر غور کریں گے کہ مختلف مقامات پر کے سماوی کرے ایک دوسرے سے کس حد تک مختلف ہوتے ہیں۔

مثلاً فرض کرو کہ مشاہد ستارہ سماک رامح (Arcturus.) پر واقع ہے تو اس کا بنایا ہوا کرۂ سماوی وہی نہیں ہوگا جو زمین کے کسی مقام پر ایک دوسرا مشاہد بناتا ہے۔ ان دو صورتوں میں ستاروں کے کسی زوج کے باہمی ظاہری فاصلے بالعموم بالکل مختلف ہوں گے۔

مشاہدوں کے مقام یعنے سماوی کروں کے مرکز جتنے قریب واقع ہوں گے سماوی کرے زیادہ تر ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے جائینگے۔ ثابت ستاروں (انہیں بالعموم ایسا ہی کہا جاتا ہے) کا جہاں تک تعلق ہے اس حد تک یہ کہنا صحیح ہے کہ وہ سماوی کرے جو سطح زمین پر کے تمام نقطوں کے لیے بنائے جائیں عملاً مماثل ہوتے ہیں۔ اس کا باعث یہ ہے کہ زمین سے ان ثابت ستاروں کے فاصلے اس قدر بڑے ہیں کہ زمین کا قطر ان کے مقابلہ میں بالکل ناقابل قدر ہے۔ تمثیلاً ہم یہ بیان کر سکتے ہیں کہ اگر مشاہد کو (۱۴) زمین کے کسی مقام سے اس کے تحت قدمی مقام پر منتقل کیا جائے تو دو ستاروں کے باہمی فاصلہ کا تغیر کسی صورت میں بھی قوس کے ایک ثانیہ کے ۱۶۰۰۰ ویں حصے سے متجاوز نہیں ہو سکتا جہاں تک کہ ہم فی الحال کو کبی فاصلوں سے واقف ہیں۔ ہمارے پیمایشی آلات اس قدر نازک نہیں ہیں کہ اس تغیر کو ناپ سکیں، اس کا ہزارگنا زاویہ لینے پر ہمارے آلات میں اس زاویہ کی کوئی قدر معلوم ہوتی ہے۔

سورج کے گرد زمین کی سالانہ حرکت کی باعث کسی ارضی مشاہد کا مقام تقریباً ایک دائری راستہ پر جس کا اوسط نصف قطر ۹۲۹۰۰۰۰۰ میل ہے حرکت کرتا ہے۔ اس لیے کوئی ارضی مشاہد چھ مہینوں کے وقفہ میں ایک ایسے فاصلہ پر منتقل ہو جاتا ہے جو اس مقدار کا تقریباً دوچند ہے۔ لیکن ان حالات میں بھی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

بیشتر ستاروں کے ظاہری فاصلے بغیر کسی قابل قدر تغیر کے برقرار رہتے ہیں اور جہاں تک ہمارے علم کا تعلق ہے کسی صورت میں بھی اس انتقال کی باعث بڑے سے بڑا تغیر ۰٫۵ اً سے متجاوز نہیں ہوتا۔ (دیکھو پندرہواں باب)

اوپر جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے وہ صرف ثابت ستاروں کے متعلق ہے۔ ہم بارہویں باب میں یہ دیکھیں گے کہ کرہ سماوی پر سورج اور سیاروں کے ظاہری مقامات کچھ حد تک اور چاند کا ظاہری مقام بڑی حد تک اس محل سے متاثر ہوتے ہیں جو زمین کی سطح پر مشاہد اختیار کرتا ہے۔

ہم ان ذاتی حرکتوں پر اس وقت غور نہیں کر رہے ہیں جو بعض اجسام سماوی کی ہوتی ہیں۔ یہ حرکتیں بلاشبہ ہر رصدگاہ کے کرہ سماوی پر ان اجسام کے محلوں کو متاثر کرتی ہیں۔

اگر ہم سماوی کروں پر صرف ان اجسام سماوی کو مرتسم کریں جیسے کہ بیشتر ثابت ستارے ہیں جو اس قدر دور ہیں کہ وہ ظاہری فاصلے جو انہیں ایک دوسرے سے جدا کرتے ہیں نظام شمسی کے تمام حصوں سے قریب قریب وہی رہتے ہیں تو ہم سماوی کروں کے متعلق حسب ذیل بیان دے سکتے ہیں جس میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ان تمام کروں کے نصف قطر مساوی ہیں۔

نظام شمسی میں ہر مقام کے جواب میں ایک کرہ سماوی ہوگا جس کا مرکز یہ مقام ہوگا۔

نظام شمسی میں ہر کرہ سماوی ہر دوسرے کرہ سماوی کے مانند ہوتا ہے نہ صرف نصف قطر کے لحاظ سے بلکہ ان ستاروں کے لحاظ سے بھی جو اس پر نشان زدہ ہوں۔

کسی دئے ہوئے لمحہ پر سماوی کرے سب کے سب متشابہاً واقع ہوتے ہیں یعنے ایک کرہ کا کوئی نصف قطر جو کسی مخصوص ستارے تک

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کھینچا گیا ہو ہر دوسرے کرہ کے متناظر نصف قطر کے مساوی ہوتا ہے۔ اکثر اس میں سہولت ہے کہ کرۂ سماوی پر اس طرح بحث کی جائے کہ گویا اس کا مرکز زمین کے مرکز پر منطبق ہے۔

(۲۰) **مثال ۱**۔ ثابت کرو کہ محدود فاصلے پر کے کسی نقطہ کو کرۂ سماوی کا مرکز خیال کیا جا سکتا ہے اگر کرہ کا نصف قطر لا انتہا بڑا ہو۔

فرض کرو کہ کرۂ سماوی کا مرکز و ہے اور فرض کرو کہ و سے محدود فاصلہ پر کوئی نقطہ لا ہے اور کرہ کی سطح پر کوئی نقطہ س ہے تو

$$\text{لا س}^2 = \text{و س}^2 - 2\,\text{و س} \times \text{و لا جم لا و س} + \text{و لا}^2$$

$$= \text{و س}^2 \left(1 - 2\frac{\text{و لا}}{\text{و س}} \text{جم لا و س} + \frac{\text{و لا}^2}{\text{و س}^2}\right)$$

اب چونکہ و لا محدود ہے اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے و س لا انتہا ہی کی طرف مائل ہوتا ہے $\frac{\text{و لا}}{\text{و س}}$ صفر کے قریب آتا ہے اسلیے انتہا لینے سے $\frac{\text{لا س}}{\text{و س}}$ = ۱۔ لیکن چونکہ و س، کرہ پر کے تمام نقطوں س کے لیے مستقل ہے اس لیے لا س بھی مستقل ہونا چاہیے یعنی لا کو کرہ کا مرکز متصور کیا جا سکتا ہے اور اس سے کوئی قابل قدر خطا واقع نہیں ہوتی۔

مثال ۲۔ ثابت کرو کہ لا س اور و س کی سمتیں انتہا میں منطبق ہونے کا میلان رکھتی ہیں۔

۲۷۔ اُفق سماوی۔

فرض کرو کہ زمین کی سطح پر مشاہد کا مقام پ ہے اور فرض کرو کہ اُس کا کرۂ سماوی کھینچ لیا گیا ہے جس کا نصف قطر زمین کے نصف قطر کے مقابلہ میں بہت زیادہ بڑا ہے۔ اب اگر نقطہ پ پر زمین کا مماس مستوی کھینچا جائے تو یہ مستوی اس کرہ سماوی کو ایک بڑے دائرہ میں قطع کرے گا، اس بڑے دائرہ کو پ کا اُفق سماوی کہا جاتا ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کسی مقام پر افق کا مستوی، اُس مائع کی سطح کا مستوی بھی ہے جو ایک کھلے برتن میں اِس مقام پر سکون کی حالت میں ہو۔ یہ مستوی، ارضی کشش کی سمت پر عمود ہوتا ہے اور اِس لیے زمین کی سطح کے کسی مقام پ پر خط شاقول کی سمت اُس مستوی پر عمود ہوتی ہے جو پ کے افق کو تعبیر کرتا ہے۔ اگر اِس خط شاقول کو ہر دو طرف خارج کیا جائے تو وہ کرۂ سماوی کو دو نقطوں میں قطع کرے گا۔ یہ نقطے علم ہیئت کروی میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ نقطہ س، جو اس طرح ٹھیک سر کے اوپر حاصل ہو پ کا راس کہلاتا ہے۔ دوسرا نقطہ ف قدم کہلاتا ہے جو کرۂ سماوی پر اس طرح حاصل ہوتا ہے کہ ہم خط شاقول کی سمت کو ٹھیک قدموں کی سمت میں خارج کریں، یہ سمت کرۂ سماوی کو اِس نقطہ پر قطع کرے گی۔

۲۸ — یومی حرکت۔

زمین کی روزانہ گردش، اپنے محور کے گرد، ۲۳ گھنٹے ۵۶ منٹ ۴ ثانیوں کے تقریبی وقفہ میں مکمل ہوتی ہے اور اسے بالعموم شمسی دن کہا جاتا ہے (دیکھو دفعہ ۳۳)۔ زمین کی اس روزانہ گردش کی باعث کرۂ سماوی کی ظاہری گردش مخالف سمت میں یعنے مشرق سے مغرب کی طرف حاصل ہوتی ہے، یہ ظاہری گردش یومی حرکت کے طور پر مشہور ہے۔

زمین کی محوری گردش کو ثابت کرنے کا راست ترین طریقہ فوکو (Foucault) کے رقاص کے تجربہ سے ہم پہنچتا ہے۔ اگر ہم زمین کو ایک (۴۳) کامل کرہ تسلیم کریں اور اِس کا مرکز د ہو تو فوکو کے رقاص کے اصول حسب ذیل ہیں:—

فرض کرو کہ مقام پ پر مشاہد کا شمالی عرض بلد فہ ہے اور زمین کی زاوئی رفتار اپنے محور کے گرد سہ ہے۔ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ سہ کو دو اجزاے ترکیبی میں تحلیل کیا گیا ہے ایک جزو تحلیلی، و پ کے گرد، سہ جب فہ ہے اور دوسرا، و ق کے گرد، سہ جم فہ ہے جہاں ق وہ نقطہ ہے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جس کا جنوبی عرض بلد ۹۰° - فہ ہے اور جو پ کے نصف النہار پر واقع ہے۔ جہاں تک کہ پ اور اس کے نزدیک کے مقامات کا تعلق ہے اس آخری گردش کا اثر ان مقامات پر صرف انتقالی ہے اور اس لیے موجودہ مقصد کے لحاظ سے یہ جزو تحلیلی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے جزو تحلیلی کا یہ اثر ہوگا کہ اس کی باعث پ پر افق کا مستوی، و پ کے گرد، زاوئی رفتار سہ جب فہ کے ساتھ گردش کرے گا۔ اس لیے اگر پ پر کا کوئی انتصابی مستوی و پ کے گرد گردش میں کوئی حصہ نہ لے یعنے وہ ساکن متصور کیا جائے تو اس کے ساتھ کوئی اور انتصابی مستوی جو و پ کے گرد گردش میں حصہ لیتا ہے ایسا زاویہ بنائے گا جو رفتار سہ جب فہ کے ساتھ بڑھتا رہے گا۔ فوکو رقاص وہ ذرائع بہم پہنچاتا ہے جو اس تجربہ کی تصدیق کرتے ہیں۔ عملی تفصیلات میں گئے بغیر اس تجربہ کی لازمی خصوصیت حسب ذیل ہے:-

ایک ثابت نقطہ سے لمبے تار کے ذریعہ ایک بھاری وزن لٹکایا جاتا ہے پھر اس وزن کو ایک طرف ہٹا کر احتیاط کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے تو یہ وزن آہستہ آہستہ آگے پیچھے اہتزاز کرتا ہے۔ وہ مستوی جس میں یہ رقاص اہتزاز کرتا ہے و پ کے گرد گردش میں حصہ نہیں لیتا۔ لیکن چونکہ مشاہد و پ کے گرد ارضی گردش کو دیکھ نہیں سکتا، اہتزاز کا مستوی اطراف و اکناف کی ارضی اشیاء کے حوالے سے گردش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس حرکت کی سمت اور اس کی مقدار کی پیمایشوں سے زمین کی یومی حرکت متعین ہوتی ہے۔ اگر زمین کے کسی ایک قطب پر اس تجربہ کو عمل میں لانا ممکن ہوتا تو اس کو دکھانے کی یہ بہترین صورت ہوتی۔ خط استواء کے کسی مقام پر اہتزاز کے مستوی کی کوئی ظاہری حرکت نہیں ہوگی۔

سماوی کرۂ پر کے سب نقطے، بجز دو نقطوں کے، یومی حرکت میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ دو نقطے بلاشبہ سماوی کرہ کے شمالی اور جنوبی قطب ہیں۔ ان نقطوں کو ملانے والا خط زمین کے مرکز میں سے گذرتا ہے اور یہ خط وہ محور ہے جس کے گرد زمین گردش کرتی ہے۔ یہ ہمیشہ ذہن نشین رہے کہ زمین کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ابعاد سماوی کرہ کے مقابلہ میں ناقابل قدر ہیں اور اس لیے موجودہ مقاصد کے لیے ہم زمین کو صرف یہ سمجھیں گے کہ وہ، سماوی کرہ کے مرکز پر صرف ایک نقطہ ہے۔ زمین کو ایسا سمجھنے میں خاص فائدہ یا سہولت یہ ہے کہ ہم نہ صرف سماوی کرہ کے محور کو زمین کے مرکز میں سے گذرتا ہوا فرض کر سکتے ہیں بلکہ (۷۴) ہم ہمیشہ یہ بھی تصور کر سکتے ہیں کہ یہ محور کسی مشاہد کے مقام میں سے بھی گذرتا ہے خواہ وہ زمین کی سطح پر کہیں واقع ہو۔ وہ قطب جو سماوی کرہ کے اُس حصہ میں واقع ہے جو شمالی عرض بلدوں میں رہنے والوں کو نظر آتا ہے شمالی قطب کے طور پر مشہور ہے۔ شمالی ہیئت داں طبقہ کی یہ خوش قسمتی ہے کہ شمالی قطب کا محل وقوع ایک چمکدار متصلہ ستارے سے جسے قطب تارہ کہتے ہیں بہت عمدگی سے نمایاں ہے۔ جنوبی آسمان کا متناظر نقطہ جو جنوبی قطب کے طور پر مشہور ہے اتنی عمدگی سے نمایاں نہیں ہے کیونکہ اس کے قریب کوئی چمکدار ستارہ موجود نہیں۔

زمین کے خط استواء کا مستوی یومی گردش سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ مستوی سماوی کرہ کو ایک بڑے دائرہ میں قطع کرتا ہے، یہ بڑا دائرہ سماوی خط استواء کے نام سے مشہور ہے اور اس کے قطب آسمان کے شمالی اور جنوبی قطب ہیں۔ خط استواء کے متوازی اور اس سے محدود فاصلہ پر کا کوئی مستوی سماوی کرہ کو سماوی خط استواء پر قطع کرتا ہے۔ ایسے سب مستویوں کے لیے خط استواء منعدم خط ہوتا ہے۔ زمین کا کوئی قطر (یا بلاشبہ کوئی مستقیم خط جو استوار طور پر زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو اور دونوں طرف غیر محدود خارج کر دیا گیا ہو) سماوی کرہ کو دو نقطوں میں قطع کرے گا اور یہ نقطے زمین کی یومی گردش کی باعث وہ دائرے مرتسم کریں گے جنھیں متوازی دائرے کہا جاتا ہے۔ یہ دائرے بالعموم سماوی کرے کے چھوٹے دائرے ہوتے ہیں اور جب ان کو پیدا کرنے والا خط زمین کے محور کے متوازی ہوتا ہے تو یہ دائرے علی الترتیب شمالی اور جنوبی قطبوں میں ضم ہو جاتے ہیں اور جب یہ خط زمین کے محور پر عمود ہوتا ہے تو وہ ایک دوسرے پر منطبق ہو کر خط استواء بن جاتے ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

افق سماوی، کرۂ سماوی کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہے، ایک وہ نیم کرہ جو مرئی ہے اور دوسرا وہ نیم کرہ جو غیر مرئی ہے۔ جب کوئی ستارہ افق کے نیچے سے افق کے اوپر آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ستارہ طلوع ہو رہا ہے اور جب وہ افق کے اوپر سے افق کے نیچے جا رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ستارہ غروب ہو رہا ہے۔ اگر مشاہد زمین کے شمالی قطب پر ہو تو سماوی قطب شمالی اس کے راس پر ہوگا اور اس کا افق سماوی خط استواء ہوگا۔ اس صورت میں زمین کی یومی حرکت کی باعث ستارے افق کے متوازی حرکت کرتے نظر آئیں گے اور طلوع اور غروب کے مظاہر پیش نہ آئیں گے، کرہ سماوی کے ایک نصف کا کوئی حصہ افق کے اوپر کبھی نہ آئے گا اور دوسرے نصف کا کوئی حصہ کبھی غروب نہ ہوگا۔ اگر مشاہد ارضی خط استواء پر ہو تو شمالی اور جنوبی قطب اس کے افق پر ہوں گے اور وہ نیم کرے جن میں افق سماوی کرہ کو تقسیم کرتا ہے مسلسل بدلتے رہیں گے۔ ستارے افق کے عمود وار طلوع ہوں گے اور آسمان کا ہر ستارہ مشاہد کے افق کے اوپر نیم شمسی[1] یوم تک نمودار رہے گا اور افق کے نیچے دوسرے نیم یوم تک غروب رہے گا۔ پس قطب پر کے مشاہد اور خط استواء پر کے مشاہد کے حالات میں یہ فرق ہوگا کہ اول الذکر مقام پر کرہ سماوی کا جتنا حصہ کسی لمحہ نظر آتا ہے وہ حصہ کبھی بھی زمین کی یومی گردش کی وجہ سے غیر مرئی نہیں ہو سکتا، برخلاف اس کے خط استواء پر کے مشاہد کے لیے سماوی کرہ کا ہر جزو کبھی غیر مرئی ہو جاتا ہے اور کبھی مرئی۔ (۷۵)

کسی ارضی مقام پر جو نہ قطب ہے اور نہ خط استواء پر واقع ہے سماوی کرہ کا کچھ حصہ ہمیشہ افق کے اوپر رہے گا اور کچھ حصہ ہمیشہ افق کے نیچے رہے گا اور ما بقی حصہ کبھی افق کے اوپر اور کبھی افق کے نیچے۔ ہر ستارہ زمین کی یومی حرکت کی وجہ سے کرہ سماوی کے ایک چھوٹے دائرہ میں گردش کرتا نظر آئے گا، اس چھوٹے دائرہ کا مرکز سماوی کرے کا ایک قطب ہوگا۔ اگر یہ چھوٹا

[1] اس میں انعطاف کی رعایت نہیں رکھی گئی ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

دائرہ بالکلیہ افق کے اوپر واقع ہو تو ستارہ کبھی غروب نہ ہوگا اور اس لیے ہمیشہ نمودار رہے گا (بادلوں یا سورج کی روشنی وغیرہ کی مداخلت فی الحال خارج از بحث ہے)۔ اگر یہ دائرہ بالکلیہ افق کے نیچے واقع ہو تو ستارہ کبھی طلوع نہ ہوگا اور اس لیے زیر بحث مقام پر کبھی بھی نمودار نہ ہوگا۔ لیکن اگر یہ دائرہ افق کو قطع کرے تو ستارہ کبھی افق کے اوپر اور کبھی افق کے نیچے ہوگا۔

۲۹۔ نصف النہار اور اول السمت۔

وہ بڑا دائرہ جو سماوی قطبین میں سے اور مشاہد کے راس اور قدم میں سے گذرتا ہے اس مقام کا نصف النہار کہلاتا ہے جہاں مشاہد مقیم ہے۔ سماوی نصف النہار وہ بڑا دائرہ بھی ہے جو مشاہد کے ارضی نصف النہار کے مستوی اور سماوی کرہ کے تقاطع سے حاصل ہوتا ہے۔ پس سماوی نصف النہار وہ بڑا دائرہ ہے جو شمالی نقطہ ش (شکل ۲۲) سے افق کے علی القوائم نکلتا ہے اور پھر جنوبی نقطہ ج پر آکر افق سے عموداً ملتا ہے اور پھر افق کے نیچے اپنے راستے کو ش تک جاری رکھتا ہے۔

سماوی کرہ کی یومی گردش میں ہر ستارہ نصف النہار کو لازماً دو مرتبہ عبور کرے گا اور ہر موقع پر ہم کہتے ہیں کہ ستارہ مرور کر رہا ہے۔ شمالی اور جنوبی قطبوں سے نصف النہار دو نیم دائروں میں تقسیم ہوتا ہے، ان میں سے ایک میں راس ہوتا ہے اور دوسرے میں قدم۔ جب ستارہ پہلے نیم دائرہ کو مرور کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ بالائی تکبد پر ہے اور جب وہ دوسرے نیم دائرہ کو مرور کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ زیرین تکبد پر ہے۔ (۷۶)

سماوی کرہ کے بڑے دائروں میں نصف النہار سب سے زیادہ اہم ہے کیونکہ وہ کرہ کے دو اہم ترین نقطوں یعنے قطب ق اور راس ر (شکل ۲۲) میں سے گذرتا ہے۔ تین اور نقطے ہیں جو خاص طور پر قابل یادداشت ہیں۔ یہ نقطے حسب ذیل ہیں، شمالی نقطہ ش اور جنوبی نقطہ ج جن میں نصف النہار افق کو قطع کرتا ہے، اور نقطہ ا جس میں نصف النہار سماوی خط استواء کو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

قطع کرتا ہے۔

عرض بلد فہ وہ زاویہ ہے جو خط شاقول کی سمت اور خط اُستواء کے درمیان ہوتا ہے۔ پس (شکل ۲۲) مُشاہد کا عرض بلد زاویہ ر و ا ہے یعنے



شکل (۲۲) شمالی نیم کرہ میں عرض بلد فہ پر نصف النہار

وہ زاویہ جو راس اور خط اُستواء کے درمیان ہے۔ چونکہ ق و ا اور ر و ش دونوں قائمہ زاوئے ہیں اس لیے ش و ق، فہ کے مساوی ہونا چاہئے اور زاویہ ش و ق جو افق کے اوپر قطب کا زاویہ ارتفاع ہے اِس کا ارتفاع کہلاتا ہے جیسا کہ ہم دفعہ ۳۰ میں دیکھینگے۔ پس ہم اِس بنیادی مسئلہ پر پہنچتے ہیں کہ

قطب کا ارتفاع مُشاہد کا عرض بلد ہوتا ہے۔

راس ر سے اوپر کے قطب ق تک جو قوس ر ق = ۹۰° - فہ ہے اِس کو بالعموم **عرض التمام** (Colatitude) کہتے ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ کوئی ستارہ لا غروب نہیں ہوتا جب تک کہ اوپر کے قطب سے اِس کا فاصلہ ق لا مُشاہد کے عرض بلد سے متجاوز نہ ہو۔ اُس ستارہ کو جو غروب نہیں ہوتا حائط قطبی (Circumpolar) ستارہ کہتے ہیں اور خط اُستواء سے شمالی قطب کی جانب اِس کا فاصلہ ا لا یعنے اِس کا

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

شمالی میل (دفعہ ۳۱) ۹۰° - فہ سے کم نہ ہونا چاہیئے۔ کوئی ستارہ طلوع نہ ہوگا اگر اس کا جنوبی میل ۹۰° - فہ سے زیادہ ہو۔

(۷۷) شکل ۲۲ کے جواب میں وہ نقشہ جو جنوبی نیم کرہ میں نصف النہار کو تعبیر کرتا ہے شکل ۲۳ میں دیا گیا ہے۔ یہ یاد رہے کہ جنوبی عرض بلد اکثر اس طرح ظاہر کئے جاتے ہیں کہ عرض بلد کی عددی قیمت کے ماقبل منفی علامت لگا دی جاتی ہے مثلاً شکل ذیل میں عرض بلد - فہ کا نصف النہار دکھایا گیا ہے۔



شکل (۲۳) جنوبی نیم کرہ میں جنوبی عرض بلد فہ پر نصف النہار

وہ بڑا دائرہ جو راس میں سے گذرتا ہے اور نصف النہار پر علی القوائم ہے (اول السمت) کہلاتا ہے۔ یہ بڑا دائرہ افق کے مشرقی اور مغربی نقطوں میں سے گذرتا ہے۔

مثال ۱ - ثابت کرو کہ عرض بلد فہ کے ایک مقام کے حوالہ سے ایک ستارہ کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے راسی فاصلے علی الترتیب ۱۸۰° - {۰° ~ (فہ + ضہ)} اور فہ ~ ضہ ہیں جہاں ضہ، ستارہ کا میل ہے۔

مثال ۲ - اگر کسی ستارہ کا راسی فاصلہ ہمیشہ ایک ہی رہے تو ثابت کرو کہ مشاہد کا عرض بلد ۹۰° ہے یا ستارہ کا میل ۹۰° ہے۔

مثال ۳ - ثابت کرو کہ اگر کوئی ستارہ ہمیشہ افق کے اوپر رہے تو {۰° ~ (فہ + ضہ)} < ۹۰°، اگر وہ ہمیشہ افق کے نیچے رہے تو فہ - ضہ < ۹۰°،

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اور اگر وہ طلوع اور غروب ہوتا ہو تو {۰ ≤ (فہ + ضہ)} < ۹۰° اور فہ ~ ضہ < ۹۰°۔

مثال ۴ — اگر مشاہد کا عرض بلد معلوم ہو تو بتاؤ کہ کسی ستارہ کا میل، مرور کے وقت اس کے راسی فاصلہ کا مشاہدہ کرنے سے کس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۵ — گرینوچ کا عرض بلد ۵۱° ۲۸′ ۳۸٫۱″ ہے، ثابت کرو کہ گرینوچ کے نصف النہار میں (شکل ۲۲)

ج ا = ر ق = ۳۸° ۳۱′ ۲۱٫۹″

اور ا ر = ق ش = ۵۱° ۲۸′ ۳۸٫۱″

مثال ۶ — ثابت کرو کہ وہ کم سے کم عرض بلد ۵۱° ۲۹′ ہے جس پر کے تمام ستارے جن کا شمالی میل ۳۸° ۳۱′ سے متجاوز ہو حائط قطبی ستارے ہیں۔ نیز ثابت کرو کہ اس عرض بلد پر وہ تمام ستارے جن کا جنوبی میل ۳۸° ۳۱′ سے متجاوز ہو نمودار نہیں ہوتے۔

مثال ۷ — ۱۳ نومبر کو سورج قطب شمالی سے ۱۰۸° پر ہے۔ ثابت کرو کہ کسی شمالی عرض بلد میں جو ۷۲° سے متجاوز ہو سورج افق کے اوپر طلوع نہیں ہوتا۔

مثال ۸ — اسٹاک ہوم (Stockholm) کی رصدگاہ عرض بلد ۵۹° ۲۰′ ۳۳٫۰″ ش میں ہے اور راس امید (Cape of Good Hope) کی رصدگاہ عرض بلد ۳۳° ۵۶′ ۳۵٫۵″ ج میں واقع ہے۔ شعری (Sirius) کا میل ۱۶° ۳۵′ ۲۲٫۰″ ہے۔ اس کے ارتفاع معلوم کرو جب وہ علی الترتیب اسٹاک ہوم اور راس امید پر تکبد میں ہو۔ (۷۸)

نصف النہار پر قطب شمالی سے افق کے جنوبی نقطہ تک فاصلہ ۱۸۰° ~ فہ ہے جہاں فہ شمالی عرض بلد ہے (شکل ۲۲)۔ قطب سے کسی ستارہ کا فاصلہ جس کا میل ضہ ہو ۹۰° ~ ضہ ہے (جبکہ ضہ کے ماقبل مناسب علامت لگائی جائے) اس لیے افق کے جنوبی نقطہ سے ستارہ کا فاصلہ

۱۸۰° ~ فہ ~ (۹۰° ~ ضہ) = ۹۰° ~ فہ + ضہ

ہے۔ پس اسٹاک ہوم کی صورت میں (چونکہ شعری کا میل منفی ہے) شعری کا ارتفاع

۹۰° ~ (۵۹° ۲۰′ ۳۳″) ~ (۱۶° ۳۵′ ۲۲″) = ۱۴° ۴′ ۵″

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جنوبی عرض بلد پر (شکل ۲۳) قطب جنوبی سے شمالی نقطہ تک قوس ۱۸۰° - فہ ہے اور قطب جنوبی سے شمالی میل ضہ تک قوس ۹۰° + ضہ ہے۔ اس لیے تکبّد کے وقت ارتفاع

۱۸۰° - فہ - (۹۰° + ضہ) = ۹۰° - فہ - ضہ

ہے۔ پس راس امید پر شعری کا ارتفاع بوقت تکبّد یہ ہے

۹۰° - (۳۳° ۵۶′ ۳٫۵″) + ۱۶° ۳۵′ ۰٫۳۲″ = ۷۲° ۳۹′ ۵٫۱۸″

مثال ۹ — اگر ایک حائط قطبی ستارے کے راسی فاصلے بالائی اور زیرین تکبّدوں پر علی الترتیب ر۱، ر۲ ہوں اور اگر یہ دونوں تکبّد راس کے شمال میں ہوں تو ثابت کرو کہ مشاہد شمالی عرض بلد ۹۰° - ½ (ر۱ + ر۲) میں ہے۔

۳۰ — ارتفاع اور السمت۔

سماوی محددوں کا صریح ترین نظام شاید وہ ہے جس میں افق کو بنیادی دائرہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم فرض کریں گے کہ ستارہ افق کے اوپر ہے اور ایک بڑا دائرہ راس سے ستارہ میں سے گذرتا ہوا کھینچا گیا ہے جو افق پر آکر ختم ہوتا ہے جسے یہ علی القوائم قطع کرتا ہے۔ ایسے دائرہ کو انتصابی دائرہ کہتے ہیں۔ اِس دائرہ کی وہ قوس جو افق اور ستارہ کے درمیان ہے ستارہ کا **ارتفاع** کہلاتی ہے اور ستارہ کا مقام متعین کرنے میں ایک محدد کا کام کرتی ہے۔ دوسرا محدد **السمت** ہے جو افق پر مختلف طریقوں سے شمار کیا جاتا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اِس معاملہ میں ایک یکساں طریق عمل اختیار کیا جائے۔ اِس لیے ہم کسی جرم فلکی کا السمت افق کے شمالی نقطہ سے افق کے گرد مشرق اور پھر جنوب کی طرف ستارہ کے انتصابی دائرہ کے پائین تک قوسی فاصلہ سے پیمائش کریں گے[1]۔ پس السمت کی ۰° سے ۳۶۰° تک

[1] السمت محسوب کرنیکا یہ طریقہ قدما کا اختیار کردہ ہے۔ میں نے اسے ۱۹۴۰ء کے کمپس کارڈ (Compass Card) پر دیکھا ہے جسے پروفیسر سلوینس تھامسن نے ازراہ مہربانی مجھے دکھایا تھا۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کوئی قیمت ہو سکتی ہے اور اس افق کا ضد شطب جسکی اس طرح درجہ بندی ہوئی ہو قدم ہے ، راس نہیں ہے۔ جب کسی ستارے کے ارتفاع اور السمت معلوم ہوں تو اس کا محل متعین ہو جاتا ہے۔

(۷۹) مثلاً اگر ایک ستارہ کا السمت ۳۱۰° اور اس کا ارتفاع ۱۵° ہو تو ستارہ کا محل اس طرح معلوم کیا جاتا ہے۔ ہم افق کے شمالی نقطہ سے چلتے ہیں اور مشرق کی طرف السمت ۹۰° تک بڑھتے ہیں اور پھر وہاں سے جنوب کی طرف السمت ۱۸۰° تک اور مغرب کی طرف السمت ۲۷۰° تک جاکر اسی سمت میں اور ۳۶۰° طے کرتے ہیں تو السمت ۳۱۰° پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ انتصابی دائرہ جس پر ہم اس طریقہ سے پہنچتے ہیں اس طرح بھی کھینچا جا سکتا تھا کہ اس کا السمت ۵۰° ہو یعنے وہ شمالی نقطہ سے مغربی جانب ۵۰° پر واقع ہے لیکن اس محدود میں منفی قیمتوں سے بچنا زیادہ سہولت بخش ہے کیونکہ ۳۶۰° جمع کرنے سے ہمیشہ ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس نقطہ کی جس پر انتصابی دائرہ افق سے ملتا ہے اس طور پر السمت کے ذریعہ تعیین ہو جانے کے بعد انتصابی دائرہ پر معلومہ ارتفاع پر ایک نقطہ لینا ہوگا جو اس صورت میں افق کے اوپر ۱۵° پر ہے، اس طرح ہمیں ستارہ کا مطلوبہ محل حاصل ہو جائیگا۔

ستارے کے ارتفاع کی بجائے ارتفاع کا متمم استعمال کرنا اکثر سہولت کا باعث ہوتا ہے، یہ متمم بالعموم راسی فاصلہ کے طور پر مشہور ہے۔ مثلاً زیر بحث سوال میں ۱۵° ارتفاع ہے اور اس لیے ۷۵° راسی فاصلہ ہے۔

السمت کی تقریبی پیمائشوں کے لیے مقناطیسی کمپاس (قطب نما) استعمال کیا جاتا ہے۔ کمپاس کی سوئی مقناطیسی شمال کو دکھاتی ہے جو اصلی شمال سے کسی قدر منحرف ہوتا ہے، ان دو شمالوں کے درمیان جو زاوی فصل ہے اس کو **مقناطیسی انصراف** کہتے ہیں۔ یہ انصراف مختلف اوقات اور نیز مختلف مقامات پر متغیر ہوتا ہے۔ جزائر برطانیہ کے لیے سنہ ۱۹۰۸ء میں سوئی اوسطاً ۱۸° اصلی شمال سے مغربی جانب ہٹی ہوئی رہتی تھی اس طرح مقناطیسی شمال کا السمت سنہ ۱۹۰۸ء میں جزائر برطانیہ کیلئے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

تقریباً ۳۴۲° تھا۔[1]

(۸۰) بحری کمپاس میں محیط کو $\frac{1}{4}$ اُ کے مساوی وقفوں پر ۳۲ مساوی نقطوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور سمتیں تیروں کے ذریعہ ایک کارڈ پر دکھائی جاتی ہیں۔ اِس کمپاس کا نمونہ ذیل میں درج ہے۔



[1] نیا شنل فیزیکل لیابوریٹری نے حسب ذیل معلومات ازراہ مہربانی ارسال کئے ہیں:۔

سنہ ۱۹۰۶ء میں اوسط مقناطیسی انصراف:۔

کیو	۱۶° ۵′ ۲۸٫ م
اسٹونی ہرسٹ	۱۷° ۳′ ۴۸٫ م
ویالنسیا	۲۱° ۳′ ۶٫ م

مقناطیسی انصراف گھٹ رہا ہے اور کیو پر اِس کے تغیر کی سالانہ مقدار کی اوسط

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کارڈ پر چار خاص نقطے ش (مقناطیسی شمال پر) م (مشرق) ج (جنوب) اور غ (مغرب) نشان زدہ ہوتے ہیں۔ اِن میں سے ہر ایک ۹۰° کے وقفہ پر ہے۔ اِن میں سے ہر وقفہ اُن نقطوں سے جن پر ش م، ج م، ج غ، ش غ کے نشان ہیں علی الترتیب تنصیف ہوتا ہے۔ اِس طرح محیط آٹھ مساوی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ پھر اِن میں سے ہر حصہ کی تنصیف کی گئی ہے ش اور ش م کی تنصیف ش ش م سے نشان زدہ ہے، اور ش م اور م کی تنصیف م ش م سے نشان زدہ ہے اور علی ہذا القیاس اِس طرح سولہ نقطوں کی تعیین عمل میں آتی ہے۔ باقی سولہ نقطوں کو پہلے آٹھ نقطوں ش، م، ج، غ، ش م، ج م، ج غ، ش غ سے اِس طرح اخذ کیا جاتا ہے کہ صرف لفظ "سے" کا اضافہ کر کے حرفوں ش، م، ج، غ میں سے کوئی ایک ساتھ لکھدیا جاتا ہے۔ مثلاً "غ سے ش" کے معنی "مغرب سے شمال کی طرف ایک نقطہ ہے۔ اسی طرح "غ سے ج" کے معنی "مغرب سے جنوب کی طرف ایک نقطہ" ہے اور "ج م سے م" کے معنی "ج م سے م کی طرف ایک نقطہ"۔

(۸۱) **مثال ۱۔** نقطہ "ش م سے ش" کا السمت معلوم کرو جبکہ یہ

بقیہ نوٹ:۔

قیمتیں مظہرہ سنین کے سلسلوں کے لیے حسب ذیل ہیں:۔

سنہ ۱۸۷۰ء تا سنہ ۱۸۸۰ء ..... ۸٫۱ھ سنہ ۱۸۹۰ء تا سنہ ۱۹۰۰ء ..... ۵٫۸ھ

سنہ ۱۸۸۰ء تا سنہ ۱۸۹۰ء ..... ۶٫۸ھ سنہ ۱۹۰۰ء تا سنہ ۱۹۰۶ء ..... ۴٫۰ھ

ویالنسیا میں مشاہدات سنہ ۱۹۰۱ء میں شروع ہوئے سنہ ۱۹۰۱ء سے سنہ ۱۹۰۶ء تک پانچ سالوں کے لیے انصراف میں سالانہ تغیرات کی اوسط قیمتیں حسب ذیل تھیں:۔

اسٹونی ہرسٹ .... ۳٫۴ھ فالماوتھ ..... ۴٫۰ھ

کیپ ..... ۴٫۱ھ ویالنسیا ..... ۴٫۳ھ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

السمت مقناطیسی شمال سے پیمائش کیا گیا ہو۔

ش م، مقناطیسی شمال سے چار نقطوں پر ہے اور "ش م سے ش" کے معنے ش م سے شمال کی طرف (یعنے الٹے) ایک نقطہ۔ اس لیے جواب ہے تین نقطے یعنی ۳ × ۱۱ ۱/۴ = ۳۳ ۳/۴°۔

مثال ۲۔ اسی طرح ثابت کرو کہ مقناطیسی شمال سے غ ش غ کا السمت ۲۹۲ ۱/۲° پر ہے۔

مثال ۳۔ اگر ایک نقطہ کا السمت جو کمپس سے معلوم کیا گیا ہو ۲۳° ہو تو اصلی السمت معلوم کرو جبکہ مقناطیسی انصراف ۱۸ ۱/۲° غ ہو۔

مثال ۴۔ مقناطیسی شمال سے نقطہ "ج م سے ج" کا اصلی السمت معلوم کرو اگر مقناطیسی انصراف ۱۷° غ ہو۔

چوتھے باب پر مختلف مثالیں

مثال ۱۔ اگر مشاہد سے دو ستاروں کے حقیقی فاصلے $ر_1$، $ر_2$ ہوں اور ان ستاروں کے درمیان کرۂ سماوی پر ظاہری فاصلہ طہ ہو تو ثابت کرو کہ ان ستاروں کے درمیان حقیقی فاصلے کا مربع حسب ذیل ہے

$$ر_1^2 - ۲ ر_1 ر_2 \text{ جم طہ} + ر_2^2$$

مثال ۲۔ ثابت کرو کہ اول السمت، افق، اور خط استوا ایک دوسرے کو وہی دو نقطوں پر قطع کرتے ہیں۔

مثال ۳۔ اگر زمین کو ایک کرۂ نما تسلیم کرنے سے اس کے استوائی اور قطبی نصف قطر ا اور ب ہوں تو ثابت کرو کہ زمین کے کسی نقطہ پر بڑے سے بڑا ممکن زاوئی فرق جو اس نقطہ پر زمین کے نصف قطر اور خط شاقول کے درمیان ہو سکتا ہے یہ ہے

$$\text{مس}^{-1} \frac{ا^2 - ب^2}{۲ ا ب}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۴ — اگر ایک ستارہ کا میل ضہ، عرض بلد فہ سے بڑا ہو تو ثابت کرو کہ اس ستارہ کے السمت کو، نصف النہار کی ایک جانب زاویہ

جبتا (جم ضہ قط فہ)

اور دوسری جانب اس کے مساوی زاویہ کے درمیان امتیاز کرنا چاہئے۔

مثال ۵ — ثابت کرو کہ اس زاویہ کی جیب التمام جو ایک ستارہ کا طریق بوقت غروب افق کے ساتھ بناتا ہے

"عرض بلد کی جیب مضروب میل کا قاطع"

کے مساوی ہے۔

مثال ۶ — دو مقامات کا عرض بلد ایک ہی ہے اور ان میں سے گذرنے والے بڑے دائرہ سے قطب کا فاصلہ سورج کے میل کے مساوی ہے۔ ثابت کرو کہ ان مقامات پر شب کا طول، ان کے طول البلدوں کے فرق کے مساوی ہوگا۔



CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۸۴)

پانچواں باب

صعود مستقیم اور میل۔ سماوی عرض بلد اور طول بلد

دفعہ		صفحہ
۳۱	صعود مستقیم اور میل	۱۲۵
۳۲	نقطۂ راس الحمل یا ♈	۱۲۵
۳۳	ساعتی زاویہ اور کوکبی یوم	۱۳۰
۳۴	ساعتی زاویہ اور میل سے راسی فاصلہ اور السمت کی تعیین	۱۳۶
۳۵	تقرتی ضابطوں کے اطلاقات	۱۴۰
۳۶	کسی جرم فلکی کے تکبّد کا وقت	۱۴۸
۳۷	کسی جرم فلکی کا طلوع و غروب	۱۵۷
۳۸	سماوی عرض بلد اور طول بلد	۱۶۲

۳۱۔ صعود مستقیم اور میل۔ اگرچہ ارتفاع اور السمت ایک لحاظ سے کسی ستارے کے سادہ ترین محدود ہوتے ہیں لیکن بعض دوسرے محدودوں کے نظاموں سے زیادہ سہولت پیدا ہوتی ہے کسی ستارے کے ارتفاع اور السمت وقت کے ساتھ مسلسل بدلتے رہتے ہیں، جس کا باعث یومی حرکت ہے۔ نیز ایک ہی آن پر ایک ہی ستارے کے ارتفاع اور السمت دو مختلف رصدگاہوں میں مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ امر قابل ترجیح ہے کہ ایسے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

محدد استعمال کئے جائیں جو یومی حرکت کی وجہ سے نہ بدلیں اور وہی رہیں خواہ مشاہد کے محل کے عرض بلد اور طول بلد کچھ بھی ہوں۔ ہم ایسے محدد معلوم کر سکتے ہیں جن میں مطلوبہ خاصیتیں موجود ہوں اگر ہم ستارہ کا حوالہ کرہ سماوی پر کے ایک ثابت بڑے دائرہ سے دیں۔

سماوی خط استواء جیسا کہ قبل ازیں بتایا جا چکا ہے (دفعہ ۲۸) اپنے محل میں یومی گردش کے باوجود غیر متغیر رہتا ہے۔ نیز خط استواء یومی حرکت کے ساتھ ایک ایسا فطری تعلق رکھتا ہے کہ وہ خاص طور پر بنیادی دائرہ کا کام دینے کے لیے موزوں ہے چنانچہ علم ہیئت کروی میں سب سے زیادہ کارآمد محدد خط استواء کے حوالہ سے ہی پیمائش کئے جاتے ہیں۔ جب محددوں کو خط استواء کے حوالہ سے لیا جاتا ہے تو کرہ سماوی کے کسی نقطہ کے محدد یومی حرکت کی وجہ سے نہیں بدلتے اور نہ اُس وقت بدلتے ہیں جبکہ مشاہد کا مقام تبدیل ہو سوائے اس (۸۴) صورت کے جبکہ جرم سماوی زمین سے اس قدر نزدیک ہو کہ اختلاف منظر قابل قدر ہو جائے۔ اِس پر بارھویں باب میں بحث کی جائے گی اِس لیے یہاں اِس کی تشریح ضروری نہیں ہے۔

کسی ستارہ کے محدد خط استواء کے لحاظ سے معلوم کرنے میں ہم حسب ذیل طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ فرض کرو کہ



شکل (۲۴)

خط استواء ر پ ع ہے
اور ایک بڑا دائرہ ش پ
(شکل ۲۴) سماوی قطب شمالی ش
سے ستارہ س میں سے گذرتا ہوا
کھینچا گیا ہے اور یہ دائرہ خط استواء
سے پ پر ملتا ہے۔ اِس دائرہ پر
مقطوعہ قوس پ س جو خط
استواء اور ستارہ کے درمیان ہے
ستارہ کا میل کہلاتی ہے۔ قوس ر پ جو خط استواء پر کے ایک خاص

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

نقطہ ۷ سے اُس سمت میں ناپی گئی ہے کہ شِ اِس کا شطب ہے ستارہ کا صعود مستقیم کہلاتی ہے۔

صعود مستقیم (یا ص۔ مر جیسا کہ اکثر اختصاراً لکھا جاتا ہے) کو بالعموم ہم صرف ع۔ سے ظاہر کرینگے اور اس کی پیمائش ۰° سے ۳۶۰° تک ہو سکے گی۔ میل کو ہم بالعموم ضہ سے ظاہر کرینگے اور اِس کے ماقبل منفی علامت لگا دینگے اگر ستارہ س خط استواء کے جنوب میں ہو۔ س ش یعنے ۹۰° - ضہ شمال قطبی فاصلہ ہے اور بعض اوقات ضہ کی جگہ ستارے کے دوسرے محدد کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔

۳۲ — نقطۂ راس الحمل یا ♈ — ہم کسی آئندہ باب میں ثابت ستاروں کے لحاظ سے سورج کی ظاہری سالانہ حرکت پر غور کریں گے۔ لیکن ہم یہاں اِس قدر کہہ سکتے ہیں کہ سورج ثابت ستاروں کے حوالہ سے سال میں ایک مرتبہ زمین کی یومی گردش کی سمت میں (یعنے مغرب سے جنوب اور پھر جنوب سے مشرق کی طرف) ایک مکمل دَور مرتسم کرتا ہے۔ اِس حرکت میں سورج کا مرکز تقریباً کرۂ سماوی کے ایک بڑے دائرہ پر حرکت کرتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ یہ بڑا دائرہ طریق الشمس (Ecliptic) کے طور پر مشہور ہے۔ قدماء نے اسے (Ecliptic) اِس وجہ سے کہا کہ جب خسوف واقع ہوتے ہیں تو چاند اِس بڑے دائرہ کو عبور کرتا ہے۔

اُس سمت کا مُشاہدہ کرنے سے جس میں سورج طریق الشمس کے گرد حرکت کرتا ہے ہم طریق الشمس اور خط استواء کے نقاط تقاطع یا دو عقدوں کے درمیان امتیاز کر سکتے ہیں۔ اِن عقدوں کی تخصیص اِس طرح عمل میں آئی ہے۔ اُس عقدہ کو جس پر سورج خط استواء کو اس کے جنوب سے شمال کی طرف حرکت کرتا ہوا عبور کرتا ہے راس الحمل کہتے ہیں اور ♈ سے علامت ♈ (۸۴) سے ظاہر کرتے ہیں۔ سورج ♈ میں سے اُس آن گذرتا ہے جسے اعتدال ربیع (Vernal equinox) کہتے ہیں۔ یہ ہر سال تقریباً بتاریخ ۲۱ مارچ واقع ہوتا ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثلاً سنہ ۱۹۰۹ء میں اعتدال ربیع بتاریخ ۲۱ مارچ بوقت ۶ گ ۱۳ م گرینوچ اوسط وقت واقع ہوا تھا۔

دوسرا عقدہ یا وہ نقطہ جس پر سورج خط استوا کو اس کے شمال سے جنوب کی طرف حرکت کرتا ہوا عبور کرتا ہے برج میزان کا پہلا نقطہ (First pt. of Libra) کہلاتا ہے اور اسے علامت ♎ سے تعبیر کرتے ہیں۔ سورج ♎ میں سے اُس آن گذرتا ہے جو اعتدال خریف (Autumnal equinox) کے طور پر مشہور ہے۔ (سنہ ۱۹۰۹ء، ستمبر ۲۳ بوقت ۴ گ ۴۵ م گ۔ (۱-۹)۔

ہیئت دانوں نے متفقہ طور پر صعود مستقیم کی پیائش کے لیے راس الحمل یعنے ♈ کو مبداء قرار دیا ہے۔ خط استوا پر مثبت سمت وہ ہے کہ سورج کا صعود مستقیم جو سورج کی حرکت کی وجہ سے ہر آن متغیر ہے ہمیشہ بڑھتا ہے۔ مثلاً چونکہ ستاروں کے درمیان سورج کا راستہ مغرب سے جنوب کی طرف اور جنوب سے مشرق کی طرف ہوتا ہے اس لیے خط استوا پر طریق الشمس کا صعودی عقدہ ♈ ہے اور نزولی عقدہ ♎۔

چونکہ راس الحمل علم ہیئت میں اس قدر غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے اسلیے اس کا ذکر کر دینا مناسب ہے کہ اس جملہ میں لفظ "حمل" کی اہمیت محض تاریخی ہے اس میں شک نہیں کہ ایک زمانہ میں وہ عقدہ جس میں سے سورج بوقت اعتدال ربیع گذرا کرتا تھا برج حمل میں واقع تھا لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ ہم استقبال (Precession) کے باب (آٹھویں) میں دیکھینگے کہ گو طریق الشمس کا مستوی فضاء میں صرف قدرے ہٹتا ہے لیکن خط استوا کا مستوی اس طرح گردش کرتا ہے کہ طریق الشمس کے ساتھ اس کا نقطہ تقاطع اس دائرہ (طریق الشمس) پر منفی سمت میں تقریباً ۵۰ سالانہ کی شرح سے حرکت کرتا ہے حالانکہ طریق الشمس کے ساتھ وہ تقریباً مستقل زاویہ بناتا ہے۔ پس صرف اس وجہ سے ہی آسمان کے بڑے حصہ میں کسی جرم فلکی کا ص۔ مد ہمیشہ بڑھتا رہتا ہے۔

♈ کا موجودہ محل تقریبی طور پر اس طرح دکھایا جا سکتا ہے۔ جب فرس (Pegasus) کا بڑا مربع جنوب کی طرف ہو تو اپنے ذہن میں خیال کرو کہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِس کا بایاں انتصابی ضلع نیچے کی طرف اِس کے اپنے طول کے مساوی خارج کیا گیا ہے۔ اِس طرح جو نقطہ حاصل ہوا اُس کی دائیں طرف ایک خط کھینچو جو مُربع کے نچلے افقی ضلع کے متوازی اور اِس کے طول کا ایک چوتھائی ہو۔ یہ خط ایسے نقطہ پر ختم ہوگا جو راس الحمل کے موجودہ محل کے بہت ہی قریب واقع ہے۔

شکل (۲۵) میں ♈ ھ ھَ خط اُستواء ہے، ♈ ک کَ طریق الشمس ہے، ق اور قَ علی الترتیب اُستواء کے شطب اور ضد شطب ہیں اور ط طَ علی الترتیب طریق الشمس کے شطب اور ضد شطب ہیں۔ ♈ ک پر کے تیر سے سورج کی ظاہری حرکت کی سمت (بلحاظ ستاروں کے) دکھائی گئی ہے۔ ♈ ھ پر کے تیر سے وہ سمت دکھائی گئی ہے جس میں صعود مستقیم کی پیمائش عمل میں آتی ہے۔ (۸۵)



شکل (۲۵)

بڑا دائرہ ھ ک ھَ کَ دائرہ انقلابین (Solstitial Colure) کے طور پر مشہور ہے اور ک، کَ وہ نقطے ہیں جن پر سورج بالترتیب انقلاب گرما اور انقلاب سرما کے وقت پایا جاتا ہے۔ ق، ♈، ♎ میں سے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

گذرنے والے بڑے دائرہ کو دائرہ اعتدالین (Equinoctial Colure) کہتے ہیں۔
خط استواء اور طریق الشمس کے درمیان میلان کو بالعموم طریق الشمس کا میلان (Obliquity) کہتے ہیں۔ طریق الشمس کے میلان کی اوسط قیمت جو ایفیمرس بابتہ ۱۹۰۹ء میں دی گئی ہے ۲۳° ۲۷′ ۴۰٫۴″ ہے۔ اس میں کبو (Nutation) کی باعث قدرے عارضی کمی و بیشی ہوتی ہے (دیکھو آٹھواں باب) اور نیز اس میں خفیف مسلسل تنزل ۴۶٫۸۴″ فی صد سال کی شرح سے عمل میں آتا ہے۔

مثال ۱ — اگر کرہ سماوی پر ایک نقطہ کا صعود مستقیم عہ اور میل ضہ ہو تو ثابت کرو کہ اس کرہ پر بعض خاص نقطوں کے لیے (شکل ۲۵) عہ، ضہ کی قیمتیں حسب ذیل ہیں جہاں سہ طریق الشمس کا میلان ہے:-

	عہ	ضہ		عہ	ضہ
ھ	۰°	۰	ق	؟	۹۰°
ھ	۱۸۰°	۰	قَ	؟	۹۰-
ک	۹۰°	سہ	ط	۲۷۰°	۹۰°-سہ
کَ	۲۷۰°	-سہ	طَ	۹۰°	سہ-۹۰°
۲	۰	۰	═	۱۸۰°	۰

(۸۶) **مثال ۲** — ثابت کرو کہ سورج کا صعود مستقیم عہ اور میل ضہ ہمیشہ مساوات

مس ضہ = مس سہ جب عہ

سے مربوط ہوتے ہیں۔

مثال ۳ — بتاریخ ۹ مئی ۱۹۱۰ء سورج کا صعود مستقیم ۳ھ ۴۵° ۳۰′ ہے اور طریق الشمس کا میلان ۲۳° ۲۷′ ہے۔ ثابت کرو کہ سورج کا میل + ۱۷° ۵′ ۱۱″ ہے۔

۳۳ — ساعتی زاویہ اور کوکبی یوم

— بعض اوقات اس میں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

سہولت ہوتی ہے کہ مبداء کو جہاں سے خط استواء پر محددوں کی پیمائش عمل میں آتی ہے، اُس نقطہ پر لیا جائے جو افق کے اوپر خط استواء اور مشاہد کے نصف النہار کا نقطہ تقاطع ہے۔ یومی حرکت کی باعث جو نصف النہار کو ایک کوکبی یوم کے عرصہ میں کرہ سماوی کے گرد پھراتی ہے یہ مبداء کرہ سماوی پر ثابت نقطہ نہیں ہے بلکہ وہ خط استواء پر یکساں طور پر حرکت کرتا ہے اور اپنی گردش ایک کوکبی یوم میں مکمل کرتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی جرم فلکی کرہ سماوی پر ثابت ہو تو اس کا ایک محدد جس کی پیمائش اس متحرک مبداء سے عمل میں آئی ہو وقت کے ساتھ ضرور بدلنا چاہیئے۔ اگر ایک بڑا دائرہ جسے ساعتی دائرہ کہتے ہیں قطب سے کسی ستارہ تک کھینچا جائے تو وہ زاویہ جو یہ ساعتی دائرہ نصف النہار کے ساتھ بنائے ساعتی زاویہ کہلاتا ہے۔ اس طرح کسی ستارہ کا ساعتی زاویہ اور اس کا میل (اس کا قطبی فاصلہ) محددوں کا ایک نظام بناتے ہیں جو اکثر سہولت کا باعث ہوتے ہیں۔

کسی جرم فلکی کا میل یومی حرکت کی وجہ سے تبدیل نہیں ہوتا۔ لیکن اسکا ساعتی زاویہ برابر بدلتا رہتا ہے۔ چونکہ ستارہ بالائی تکبّد سے مغربی جانب حرکت کرتا نظر آتا ہے اس لیے ہم ساعتی زاویہ کی پیمائش نصف النہار سے مغربی جانب کریں گے۔ پس ساعتی زاویہ صفر ہوگا جب جرم بالائی تکبّد پر ہو اور بتدریج ۱۸۰° تک بڑھے گا جیسے جیسے جرم زیرین تکبّد تک سفر کریگا اس کے بعد وہ مسلسل بڑھتا رہے گا تا آنکہ وہ پھر بالائی تکبّد پر آکر ۳۶۰° ہو جائے اس لیے نصف النہار کی مغربی جانب ساعتی زاویہ ۰° اور ۱۸۰° کے درمیان ہوتا ہے۔ نصف النہار کی مشرقی جانب ساعتی زاویہ ۱۸۰° اور ۳۶۰° کے درمیان ہوتا ہے۔ پس اس قرارداد کی بموجب ساعتی زاوے ہمیشہ بڑھتے ہیں اور چونکہ کسی زاویہ میں ۳۶۰° جمع یا تفریق کئے جا سکتے ہیں جبکہ یہ زاویہ مثلثی تفاعل میں استعمال ہو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب ساعتی زاوے ۱۸۰° اور +۱۸۰° کے درمیان واقع ہوتے ہیں اور یہ کہ مغربی جانب ساعتی زاوے مثبت ہوتے ہیں اور مشرقی جانب منفی۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ساعتی زاویہ (برخلاف میل کے) مشاہد کے مقام کے ساتھ بدلتا ہے۔ مثلاً جب کوئی ستارہ بمقام گرینوچ نصف النہار کو عبور کر رہا ہو تو اس کا ساعتی زاویہ وہاں صفر ہے۔ لیکن اُسی آن پر یہ ستارہ مشرقی مقامات کے نصف النہاروں کو عبور کر چکا ہوگا اور اس لیے ایسے مقامات پر اس سے مغربی ساعتی زاویوں کا اظہار ہوگا۔ اُس مقام پر جہاں طول بلد گرینوچ کے مشرق میں ۲ گھنٹے ہے ستارہ کا ساعتی زاویہ دو گھنٹے مغرب نظر آئے گا حالانکہ اُسی آن پر گرینوچ کے مشاہد کو یہ ستارہ نصف النہار پر نظر آئے گا۔ (۸۷)

زیادہ عام طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دو مقامات پر جن کے مشرقی طول بلد علی الترتیب ل اور ل' ہیں ایک ہی جرم کے ساعتی زاوئے (مغربی) ایک ہی آن پر طہ اور طہ + ل' - ل ہوں گے۔

کسی منتخبہ نصف النہار پر راس الحمل کے دو متصلہ مرووں کے درمیان وقت کا جو وقفہ ہوتا ہے اس کو "کوکبی یوم" کہتے ہیں۔ اگر ہم یہ یاد رکھیں کہ ستارے کرۂ سماوی پر عملاً ثابت ہیں اور اگر ہم بعض چھوٹی بے قاعدگیوں کو فی الحال نظر انداز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نصف النہار پر ایک ہی ستارہ کے دو متصلہ مرووں کے درمیان وقت کا وقفہ کوکبی یوم ہے۔ نیز کوکبی یوم کی تعریف تمام علمی مقاصد کے لیے کافی صحت کے ساتھ یوں بھی کی جا سکتی ہے کہ یہ وہ وقفہ ہے جس میں زمین اپنے محور کے گرد ایک مکمل گردش کر لیتی ہے (دیکھو دفعہ ۲۸)۔ اگر اسے اوسط شمسی وقت میں بیان کیا جائے تو کوکبی یوم ۲۳ گ ۵۶ م ۰۹۰۶ ۴ ث کا ہوتا ہے۔

شمسی یوم کی طرح کوکبی یوم بھی ۲۴ مساوی وقفوں میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ان وقفوں کو کوکبی گھنٹے کہتے ہیں۔ کوکبی گھنٹہ ۶۰ منٹوں (دقیقوں) میں تقسیم ہوتا ہے اور ہر منٹ ۶۰ ثانیوں میں۔

کسی ستارہ کے مرور کے بعد کوکبی وقت کے ایک گھنٹہ میں اس کا ساعتی زاویہ درجوں میں پیمائش کردہ ۱۵° ہوگا، یہ محیط کا ۲۴ واں حصہ ہے۔ ساعتی زاویہ کو درجوں میں بیان کرنے کی بجائے کوکبی وقت میں بیان کرنے کا

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

دستور ہے۔ مثلاً اگر ستارہ کو نصف النہار سے گذرے تین گھنٹے (کوکبی) ہو گئے ہوں اور اگر ستارہ اور خط استواء کے درمیان اس ثانوی دائرہ کا مقطوعہ ۳۵° ہو جو قطب سے خط استواء تک ستارہ میں سے گذرتا ہوا کھینچا گیا ہے تو ہم اس مخصوص مقام اور اس مخصوص آن پر ستارہ کے محل کو یہ کہہ کر متعین کر سکتے ہیں کہ اس کا مغربی ساعتی زاویہ تین گھنٹے اور اس کا شمالی میل ۳۵° ہے۔

ساعتی زاویہ کو جو راس الحمل سے مغربی جانب ہو ۱۵° فی گھنٹہ کی شرح سے وقت میں تبدیل کریں تو کوکبی وقت حاصل ہوگا۔ جب راس الحمل نصف النہار پر بالائی تکبّد میں ہو تو کوکبی وقت ۰ گ ۰ ث ہوتا ہے۔ نصف النہار سے گذر جانے کے بعد راس الحمل کا ساعتی زاویہ ۱۵° ہو جائے تو کوکبی وقت ایک گھنٹہ ہوتا ہے اور اگر اسے نصف النہار سے گذرے اتنی دیر ہوئی ہو کہ (۸۸)
اس کا ساعتی زاویہ ۲۸۵° ہو تو کوکبی وقت ۱۹ گھنٹے ہوگا۔

فرض کرو کہ ایک ستارہ س کا صعود مستقیم وقت میں بیان کردہ ع ہے اور فرض کرو کہ ساعتی زاویہ مغربی س ہے اور کوکبی وقت طا ہے۔



شکل (۲۶)

فرض کرو کہ ش ر نصف النہار ہے (شکل ۲۶) اور ش ع دائرہ اعتدالین تو کوکبی وقت طا حسب تعریف بالا زاویہ ع ش ر سے ناپا جاتا ہے۔

س کا صعود مستقیم ع ش س ہے اور علامت کے متعلق کوئی ابہام نہیں ہو سکتا کیونکہ ش، خط استواء کا شطب ہے اور صعود مستقیم دائرہ اعتدالین سے مثبت سمت میں ناپا جاتا ہے۔ نیز ر ش س، س کا ساعتی زاویہ ہے۔ اس لیے

س = طا - ع

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِس طرح ہمیں ایک اہم رشتہ حاصل ہوتا ہے جو کسی جرم کے ساعتی زاویہ اور صعود مستقیم کو کوکبی وقت کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔

مثال ۱ — ثابت کرو کہ اگر کسی ستارہ کا صعود مستقیم معلوم ہو تو اس کا ساعتی زاویہ ناپ کر کوکبی وقت معلوم کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۲ — اگر ایک ستارہ کا ساعتی زاویہ مشرقی ۹۸° ۱۱′ ۱۵″ ہو اور اس کا صعود مستقیم ۲۱ گ ۹ م ۲۳ ث ہو تو ثابت کرو کہ کوکبی وقت ۱۴ گ ۳۶ م ۳۸ ث ہے۔

ساعتی زاویہ مغربی ہے ۳۶۰° — (۹۸° ۱۱′ ۱۵″) = ۲۶۱° ۴۸′ ۴۵″ اسلیے اسے ۱۵° فی گھنٹہ کی شرح سے وقت میں تبدیل کیا جائے تو حاصل ہوتا ہے ۱۷ گ ۲۷ م ۱۵ ث اس لیے

طا = عہ + س = ۳۸ ث ۳۶ م ۱۴ گ = ۳۸ ث ۳۶ م ۱۴ گ

کیونکہ ۲۴ گ کو ہمیشہ خارج کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۳ — اگر طہ ساعتی زاویہ ہو جس کی پیمائش درجوں میں ہوئی ہے تو ثابت کرو کہ اس زاویہ کا دائری ناپ ۲ ط ہ / ۳۶۰° ہے۔

مثال ۴ — اگر کسی ساعتی زاویہ میں گھنٹوں کی تعداد ت ہو تو ثابت کرو کہ اس زاویہ کا دائری ناپ ۲ ت / ۱۲ ہے۔

مثال ۵ — شمالی عرض بلد فہ کے کسی مقام پر السمت ا کے ایک انتصابی دائرہ پر کسی ستارہ کے ایک مرور اور دوسرے انتصابی دائرہ پر جو نصف النہار کے ساتھ وہی زاویہ بنائے ایک مرور کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے وہ سب ستاروں کے لیے وہی ہوتا ہے اور ایک کوکبی یوم کے مم ۱ (جب فہ مس ا) / ۲۱ کے مساوی ہوتا ہے۔

(۸۹) فرض کرو کہ شش (شکل ۲۷) قطب سماوی، راس ر ہے، ر پ اور ر ق مفروضہ انتصابی دائرے ہیں، شش پ اور شش ق بڑے دائرے ہیں جو انتصابی دائروں پر عمود ہیں، پ۱ اور پ۲ وہ نقطے ہیں جن پر کوئی دیا ہوا ستارہ ر پ کو عبور کرتا ہے اور ق۱، ق۲ وہ نقطے ہیں جن پر

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

یہ ستارہ ر ق کو عبور کرتا ہے ۔ اب تشاکل سے

زاویہ پ$_۱$ ش پ = زاویہ پ ش پ$_۲$ = زاویہ ق$_۱$ ش ق = زاویہ ق ش ق$_۲$

اور اس لیے

زاویہ پ$_۱$ ش ق$_۱$ = زاویہ پ$_۲$ ش ق$_۲$ = زاویہ پ ش ق

اور اس لیے یہ منتخبہ ستارہ پر منحصر نہیں ہے ۔



شکل (۲۷)

نیز م پ ش ر = جب فہ مس $\frac{۱}{۲}$ اور مطلوبہ وقفہ کو کبھی یوم کا

$\frac{۱}{۲}$ (جب فہ مس $\frac{۱}{۲}$) $\frac{۱}{\pi}$

ہے ۔

مثال ۶ ۔ اگر عرض بلد فہ کے ایک مقام پر ستاروں کا ایک زوج جن کے محدد علی الترتیب عہ، ضہ اور عہ، ضہ ہیں کبھی ایک ہی انتصابی دائرہ پر آجائے تو ثابت کرو کہ

جم فہ > جم ضہ جم ضہ جب (عہ ~ عہ) قم طہ

جہاں طہ وہ قوس ہے جو ان ستاروں کو ملاتی ہے ۔

فرض کرو کہ یہ دو ستارے س، س$_۱$ (شکل ۲۸) ہیں ۔ تب مثلث

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

س ش سَ، ش کے گرد گردش کرتا ہے۔ فرض کرو کہ ش ت (= ع) س سَ پر عمود ہے۔ تو بڑے دائرہ س سَ پر کے کسی نقطہ کا ش سے فاصلہ ع سے کم نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر س، سَ ایک ہی انتصابی دائرہ پر ہوں تو یہ قوس راس میں سے گذرنی چاہئے۔ اس لیے ۹۰° - فہ > ع یا جم فہ > جب ع۔ لیکن جم ضہ جب ش س سَ = جب ع اور جب ش س سَ جب ط = جم ضہَ جب (عہ - عہَ) اس لیے

جب ع = جم ضہ جم ضہَ جب (عہ - عہَ) قم ط



شکل (۲۸)

مثال ۷ — ثابت کرو کہ شمسی وقت کے ۲ گ ۲۳ م ۲۳ ۹۲ ۲۴ ش کوکبی وقت کے ۲ گ ۲۳ م ۴۸ ۸ ۴۸ ش کے معادل ہیں اور یہ کہ کوکبی وقت کے ۱۵ گ، اوسط شمسی وقت میں تبدیل ہو جائیں گے اگر ۲ م ۴۴ ۲۷ ش تفریق کئے جائیں۔

مثال ۸ — ثابت کرو کہ ۱۴ ۶۵ کوکبی دن بہت تقریبی طور پر ۱۴ ۶۱ اوسط شمسی دنوں کے برابر ہوتے ہیں۔

۳۴ — ساعتی زاویہ اور میل سے راسی فاصلہ اور السمت کی تعیین (۹۰)

— مطلوبہ ضابطے محددوں کے استحالہ کی عام مساواتوں سے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

لکھ لیے جا سکتے ہیں۔ اس قرارداد کی بموجب کہ السمت کی پیمائش نقطۂ شمالی سے عمل میں آنی چاہئیے (دفعہ ۳) السمت (ایسی سمت میں لیا جاتا ہے کہ قدم افق کا شطب ہو جب اسے (افق) ایک بڑا دائرہ سمجھا جائے جس کی درجہ بندی السمت کی پیمائش کے لیے عمل میں آئی ہو۔ بلاشبہ قطب شمالی خط استوا کا شطب ہے جبکہ اس کی درجہ بندی صعود مستقیم کی پیمائش کے لیے کی گئی ہو۔ شطب کی تعریف سے (دفعہ ۶) یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر دو درجہ دار بڑے دائروں ل اور ل کے شطب ش اور شَ ہوں تو ش ش شَ (∠ ۱۸۰°) کا شطب ل پر لَ کا صعودی عقدہ ہے اور شَ ش (∠ ۱۸۰°) کا شطب لَ پر ل کا صعودی عقدہ ہے۔ اس طرح خط استوا پر افق کا صعودی عقدہ وہ نقطہ ہوگا جو مغربی جانب ہے اور اس لیے قہ یعنی اس صعودی عقدہ کا السمت ۲۷۰° ہے جبکہ اس کی پیمائش نقطہ شمالی کو مبدا مان کر عمل میں آئے۔ کوکبی وقت طا وہ ساعتی زاویہ ہے جس قدر ۲ نصف النہار کے مغرب میں ہے۔ اس لیے اس سمت کو ذہن میں رکھنے سے جس میں صعود مستقیم کی پیمائش کی جاتی ہے خط استوا پر افق کے صعودی عقدہ کا صعود مستقیم قہ + ۲۷۰° طا کے مساوی حاصل ہونا چاہئیے۔ افق اور خط استوا کے درمیان زاویہ ۹۰° + فہ ہے کیونکہ یہ وہ زاویہ ہے جو ان کے شطبوں کے درمیان ہے۔ آخر الامر چونکہ راس افق کا ضد شطب ہے اس لیے ضہ منفی ہے اور ی ۔ ۹۰° کے مساوی ہے جہاں ی راسی فاصلہ ہے۔ دفعہ ۱۲ (۹۱) کے ضابطوں (۴)، (۳)، (۴)، (۵)، (۶) میں ضروری اندراجات عمل میں لانے سے مطلوبہ مساواتیں

$$\left.\begin{array}{l} -\text{جب ا جب ی} = \text{جم ضہ جب (طا - عہ)} \\ \text{جم ا جب ی} = \text{جم فہ جب ضہ - جب فہ جم ضہ جم (طا - عہ)} \\ \text{جم ی} = \text{جب فہ جب ضہ + جم فہ جم ضہ جم (طا - عہ)} \end{array}\right\} \ldots (۱)$$

اور ان کے مماثل حسب ذیل مساواتیں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$\left.\begin{array}{l} \text{جب (طا - عہ) جم ضہ = جب ا جب ی} \\ \text{جم (طا - عہ) جم ضہ = جم فہ جم ی - جب فہ جم ا جب ی} \\ \text{جب ضہ = جب فہ جم ی + جم فہ جم ا جب ی} \end{array}\right\} \ldots (۲)$$

حاصل ہوتی ہیں۔

مساواتوں (آ) سے ہم راسی فاصلہ اور السمت محسوب کر سکتے ہیں جبکہ میل اور ساعتی زاویہ (طا - عہ) معلوم ہوں، اور اس کے بالعکس مساواتوں (۲) سے ہم میل اور ساعتی زاویہ معلوم کر سکتے ہیں جبکہ راسی فاصلہ اور السمت معلوم ہوں۔

اگر ساعتی زاویہ اور میل معلوم ہوں تو راسی فاصلہ کی تعیین کے لیے حسب ذیل طریقہ بہت سہولت بخش ہے۔ وہ زاویہ جو ستارہ پر اُس قوس کے محاذی بنتا ہے جو راس اور قطب کو ملاتی ہے اختلاف منظری زاویہ (Parallactic angle) کہلاتا ہے۔ ہم اسے عا سے تعبیر کریں گے۔ اب اسکی تعیین کے لیے دفعہ (۱) کی بنیادی مساواتوں (۱)، (۲)، (۳) سے حسب ذیل مساواتیں ملتی ہیں جن میں ساعتی زاویہ (طا - عہ) کی بجائے س لکھا گیا ہے:

$$\left.\begin{array}{l} \text{جم ی = جب فہ جب ضہ + جم فہ جم ضہ جم س} \\ \text{جب عا جب ی = جم فہ جب س} \\ \text{جم عا جب ی = جب فہ جم ضہ - جم فہ جب ضہ جم س} \end{array}\right\} \ldots (۳)$$

اگر س اور ضہ معلوم ہوں تو اختلاف منظری زاویہ عا اور راسی فاصلہ ی دونوں، اِن مساواتوں سے معلوم کئے جا سکتے ہیں۔ چونکہ جب ی اور جم فہ دونوں ہمیشہ مثبت ہوتے ہیں اِس لیے دوسری مساوات سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عا اور س کی ایک ہی علامت ہے۔ یہ دونوں نصف النہار کے مغرب میں مثبت ہیں اور نصف النہار کے مشرق میں منفی۔

اکثر اس امر میں سہولت ہوتی ہے کہ اِن اعمال حساب کو ذیلی مقداروں کی مدد سے مکمل کیا جائے۔ ہم دو نئی مقداریں م اور ن، شرطوں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$\left.\begin{aligned} \text{جم ن} &= \text{جم فہ جب س} \\ \text{جب ن جم م} &= \text{جب فہ} \\ \text{جب ن جب م} &= \text{جم فہ جم س} \end{aligned}\right\} \quad \ldots\ldots\ldots (۴)$$

کے ذریعہ داخل کرتے ہیں۔ اگر م اور ن کی قیمتوں کا ایک زوج ن، م. اِن مساواتوں کو پورا کرے تو یہ مساواتیں ۳۶۰° ـ ن. اور ۱۸۰° + م سے بھی پوری ہوں گی۔ اِس لیے کوئی ہرج نہ ہوگا اگر ہم آیندہ عمل میں ن، م. استعمال کریں یا ۳۶۰° ـ ن، ۱۸۰° + م. استعمال کریں۔ اِن دو زوجوں میں سے (۹۲)
کسی ایک کو ن، م کے طور پر لو تو (۳) میں اندراج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\left.\begin{aligned} \text{جم ی} &= \text{جب ن جب (ضہ + م)} \\ \text{جب عا جب ی} &= \text{جم ن} \\ \text{جم عا جب ی} &= \text{جب ن جم (ضہ + م)} \end{aligned}\right\} \quad \ldots\ldots\ldots (۵)$$

اِن مساواتوں کو اِس طرح بھی لکھا جا سکتا ہے

$$\left.\begin{aligned} \text{مس عا} &= \text{م ن قط (ضہ + م)} \\ \text{مس ی} &= \text{قط عام (ضہ + م)} \end{aligned}\right\} \quad \ldots\ldots\ldots (۶)$$



شکل (۲۹)

اِن میں سے پہلی مساوات سے عا معلوم ہوتا ہے اور پھر دوسری مساوات سے ی ملتا ہے۔ اِس میں شک نہیں کہ ی کو مساواتوں (۵) میں سے پہلی مساوات سے بھی معلوم کیا جا سکتا ہے لیکن ہمیشہ یہ امر قابل ترجیح ہے کہ کسی زاوئے کو اسکی جیب التمام سے معلوم کرنے کی بجائے اس کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مماس سے معلوم کیا جائے (دفعہ ۳)۔

ضوابط (۴) اور (۵) ہندسی طور پر فوراً حاصل کئے جا سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر ر ل، ش ق پر عمود ہو (شکل ۲۹) تو ش ل = م اور ر ل = ۹۰° - ن

مساواتوں (۴) سے یہ واضح ہے کہ ن اور م چونکہ صرف عرض بلد اور ساعتی زاویے پر منحصر ہوتے ہیں اس لیے وہ، سب میلوں کے ستاروں کے لیے وہی ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی معلومہ رصدگاہ کے لیے یا زیادہ صحیح طور پر کسی دئے ہوئے عرض بلد کے لیے ایک مرتبہ ایک جدول کا تیار کر لینا سہولت بخش ہوتا ہے جس سے اس عرض بلد پر کے کسی مقام کے لیے ہر مخصوص ساعتی زاویہ کے جواب میں م اور ل م ن کی قیمتیں فوراً حاصل کیجا سکتی ہیں۔

مثال ۱ — اس امر کی تصدیق کرو کہ مساواتوں

مس عا = م ن قط (ضہ + م) اور مس ی = قط عا م (ضہ + م)

میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی جبکہ م اور ن کو علی الترتیب ۱۸۰° + م اور ۳۶۰° - ن میں تبدیل کیا جاتا ہے۔

مثال ۲ — ستارہ ۶۱ دجا جہ (61 Cygni) کا راسی فاصلہ اور اختلاف منظری زاویہ معلوم کرو جبکہ وہ نصف النہار سے ۳ گ م پر ہو۔ اس کا میل + ۳۸° ۹' ہے اور مشاہد کا عرض بلد ۵۳° ۲۳' ہے۔

مساواتوں (۴) سے ہم معلوم کرتے ہیں م = ۲۷° ۴۳' اور ل م ن = ۹۱۶۶۷۶ (ن) اس لیے ضہ + م = ۶۵° ۵۲' اور (۶) سے عا = ۴۸° ۴۱'، ی = ۱۰° ۳۴'

۳۵ — تفرقی ضابطوں کے اطلاقات۔ (۹۳)

فرض کرو کہ قطب ش، ستارہ ق، اور راس ر کو ملانے سے ایک مثلث ش ق ر حاصل کیا گیا ہے (شکل ۲۹)۔ اس مثلث پر دفعہ (۴) کے بنیادی ضابطے استعمال کرنے سے جو چھ تفرقی ضابطے حاصل ہوتے ہیں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اُن کا ایک ساتھ لکھ لینا سہولت بخش ہے۔ قوس ش ق قطبی فاصلہ ہے جو ۹۰° ۔ ضہ کے مساوی ہے، عرض التمام ش ر ہے یعنے ۹۰° ۔ فہ ش ر راسی فاصلہ ی ہے اور عرض بلد ۹۰° ۔ ی ہے۔ اختلاف منظری زاویہ عا ق پر ہے۔ یہ زاویہ مثبت ہے کیونکہ وہ، نصف النہار کے مغرب میں ہے۔ ساعتی زاویہ س، طا ۔ عہ کے مساوی ہے جہاں طا، مشاہدے کا کوکبی وقت ہے اور عہ، ستارہ کا صعود مستقیم ہے۔ السمت ا، شمال سے مشرق کی طرف ناپا جاتا ہے اور اس لیے ق ر ش، ۳۶۰° ۔ ا ہے۔

دفعہ ۴ کے چھ تفرقی ضابطے جن میں سے صرف تین غیر تابع ہیں ذیل کی شکلوں میں لکھے جا سکتے ہیں:

مف ضہ + جم عا مف ی ۔ جم س مف فہ ۔ جب س جم فہ مف ا = ۰ ،... (۱)

مف ی + جم ا مف فہ + جم عا مف ضہ + جم فہ جب ا مف س = ۰ ،... (۲)

مف فہ + جم ا مف ی ۔ جم س مف ضہ + جم ضہ جب س مف عا = ۰ ،... (۳)

مف ا ۔ جم ی مف عا ۔ جب فہ مف س ۔ جب س جم فہ مف ضہ = ۰ ،... (۴)

مف س + جب ضہ مف عا ۔ جب فہ مف ا ۔ جب عا جم ضہ مف ی = ۰ ،... (۵)

مف عا ۔ جم ی مف ا + جب ضہ مف س ۔ جب ا جب ی مف فہ = ۰ ،... (۶)

مثلث کے چھ عنصروں میں سے چار چار عنصروں کے اجتماعات پندرہ ہو سکتے ہیں۔ چار کا ہر ایک جٹ ایک مساوات سے مربوط ہوتا ہے (دفعہ ۱)۔ اکثر صورتوں میں جہاں عنصروں کے تغیرات مطلوب ہوتے ہیں دو عنصر مستقل رہتے ہیں اور باقی دو عنصروں کے اضافی تغیرات معلوم کرنے ہوتے ہیں۔ اسلیے ہم اِن پندرہ مساواتوں میں سے وہ مساوات منتخب کرتے ہیں جس میں وہ دو عناصر جو مستقل ہیں اور وہ دو عناصر جن کے اضافی تغیر مطلوب ہیں شامل ہوں۔ اگر اِس مساوات کو اِن دو متغیروں کے لحاظ سے تفرق کیا جائے تو مطلوبہ رشتہ مل جاتا ہے۔

مثلاً ہم وہ صورت لیتے ہیں جو اکثر عرض بلد کی تعیین میں پیش ہوتی ہے جبکہ کسی ستارہ کے راسی فاصلہ کا مشاہدہ کیا جاتا ہے۔ فرض کرو کہ ایک

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ستارہ کا ساعتی زاویہ اور میل صحت کے ساتھ ہمیں معلوم ہیں لیکن مفروضہ راسی فاصلہ میں خطا مفروضی ہے۔ ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ محسوبہ عرض بلد میں کیا خطا واقع ہوگی کیونکہ خطادار راسی فاصلہ، صحیح ساعتی زاویہ اور میل کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ یہاں چار متعلقہ مقداریں س، ضہ، ی، فہ ہیں (۹۴) اور اس لیے ضابطہ ہے

جم ی = جب فہ جب ضہ + جم فہ جم ضہ جم س

تفرق کرنے اور س اور ضہ کو مستقل فرض کرنے سے

۔ جب ی مف ی = (جم فہ جب ضہ ۔ جب فہ جم ضہ جم س) مف فہ

اور مف فہ کے سر کی بجائے جب ی جم ۱ درج کرنے سے

مف فہ = ۔ قط ۱ مف ی

بلاشبہ اسے مندرجۂ صدر ضابطہ (۲) سے راست، مف ضہ = ۰، مف س = ۰ بناکر حاصل کیا جاسکتا تھا۔

دوسری مثال میں فرض کرو کہ اختلاف منظری زاویہ عا شامل ہوتا ہے۔ ہم یہ معلوم کریں گے کہ ایک دئے ہوئے ستارہ کا اختلاف منظری زاویہ عا یومی حرکت کی اثناء میں کس وقت اعظم ہوتا ہے۔ شرطیں یہ ہیں کہ فہ اور ضہ مستقل ہوں اور س، ی اور ۱ اس طریقہ سے متغیر ہوں کہ عا میں کوئی تبدیلی نہ ہونے پائے یعنی مف عا معدوم ہونا چاہئے۔ فہ، ضہ، عا، س پر مشتمل ضابطہ یہ ہے

مس فہ جم ضہ = مم عا جب س + جب ضہ جم س

تفرق کرنے سے حاصل ہوتا ہے

(مم عا جم س ۔ جب ضہ جب س) مف س = ۰

اور چونکہ مف س کے سر کو معدوم ہونا چاہئے اس لیے مم عا = جب ضہ مس س جس سے جم ۱ = ۰ اور اس لیے ستارہ اول السمت پر ہونا چاہئے۔

اس میں ہمیں ان استثنائی صورتوں کی ایک اور مثال ملتی ہے جن میں اگرچہ تین تغیرات صفر ہوتے ہیں لیکن ضابطوں سے یہ لازم نہیں آتا کہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

دوسرے تین تغیر بھی صفر ہوں (دفعہ ۴)۔

یہ تفرقی ضابطے خاص کر یہ دکھانے میں سبق آموز ہیں کہ مشاہدات کو کس طرح مرتب کرنا چاہئے کہ اگرچہ اثنائے مشاہدہ میں ایک چھوٹی خطا واقع ہوئی ہو لیکن اس خطا کے وجود سے اس نتیجہ پر کم سے کم اثر پڑے جس کی ہمیں تلاش ہے۔

مثلاً فرض کرو کہ ملاح اپنا وقت پیما ٹھیک کرنے کی غرض سے سورج کا ساعتی زاویہ معلوم کرنا چاہتا ہے۔ جس چیز کی وہ پیمائش کرتا ہے وہ سورج کا ارتفاع ہے۔ لیکن انعطاف اور دوسرے اسباب سے جنہیں کوئی تدبیر کلاً رفع نہیں کر سکتی اس ارتفاع میں ایک چھوٹی خطا واقع ہوگی اور اس لیے راسی فاصلہ کے محسوب کرنے میں خطا واقع ہوگی۔ مشاہد راسی فاصلہ کو ی کے طور پر پیمائش کر لیتا ہے اور پھر نتیجہ نکالتا ہے کہ ساعتی زاویہ س ہے۔ لیکن صحیح راسی فاصلہ ی + مف ی ہے یعنی مف ی وہ مقدار ہے جسے مشاہدہ کردہ راسی (۹۵)
فاصلہ میں جمع کرنا ہوگا تاکہ صحیح راسی فاصلہ حاصل ہو۔ اس لیے صحیح ساعتی زاویہ س نہیں ہے بلکہ قدرے مختلف مقدار س + مف س ہے جہاں مف س وہ تصحیح ہے جو س پر استعمال کرنی ہوگی پس مف س وہ مقدار ہے جس کی اب تلاش ہے۔

وہ ضابطہ جس میں صرف اجزاء ی، فہ، ضہ، س شامل ہوتے ہیں یہ ہے

جم ی = جب فہ جب ضہ + جم فہ جم ضہ جم س

اس کو تفرق کرنے اور فہ اور ضہ کو مستقل سمجھنے سے

- جب ی مف ی = - جم فہ جم ضہ جب س مف س

اور - جب ا جب ی = جب س جم ضہ درج کرنے سے

- مف ی = جب ا جم فہ مف س

اس لیے مف س = - قط فہ قم ا مف ی

اس ضابطہ کا ہندسی ثبوت حسب ذیل ہے:-

اگر سورج، قطب مش کے گرد (شکل ۳۰) پ سے پ تک

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

حرکت کرے تو پ پَ چونکہ ایک چھوٹی قوس ہے اس لئے اس کا راسی فاصلہ ر پ سے ر پَ تک بدلتا ہے۔



شکل (۳۰)

اگر پ ت، ر پَ پر عمود ہو تو مف ی = ت پَ۔ چونکہ زاویہ ش پ پَ اور زاویہ ر پ ت دونوں ۹۰° ہیں، اس لیے زاویہ ت پ پَ = ا اور مف س جب ش پ = پ پَ = مف ی قم ا۔ اس لیے اگر ش ک، ر پ پر عمود ہو تو حاصل ہونا چاہئے مف ی = مف س جب ش ک جس سے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وقت کے لحاظ سے سورج کے راسی فاصلہ کی شرح تبدیلی اُس عمود کی جیب کے متناسب ہے جو قطب سے اُس انتصابی دائرہ پر جو سورج میں سے گذرتا ہے کھینچا گیا ہو۔ نیز (۹۶)

جب ش ک = جب ر ش جب (ا - ۱۸۰°) = - جم فہ جب ا

جس سے حسب سابق

مف س = - قط فہ قم ا مف ی

پس مشاہدے کو ایسے وقت پر عمل میں لانا چاہئے کہ قم ا اتنا چھوٹا ہو جتنا ممکن ہے کیونکہ ایسی صورت میں خطا مف ی، ساعتی زاویہ کی تعئین پر کم سے کم اثر انداز ہوگی۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ا کو ۹۰° یا ۲۷۰° کے قریب ہونا

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

چاہیئے۔ پس عملی قاعدہ جس سے ملاح خوب واقف ہوتے ہیں یہ ہے کہ وقت کی تعیین کے لیے سورج کا ارتفاع اُسوقت مُشاہدہ کیا جائے جبکہ سورج اول السمت پر یا اِس کے قریب ہو۔ اگر سورج اول السمت پر نہ آئے تو $\frac{\text{مف س}}{\text{مف ی}}$ کی کم سے کم قیمت قطع فہ ہے۔

مثال ۱ — مف ضہ، مف ی، اور مف فہ کے لیے ضابطوں (۱) (۲)، (۳) کو حل کر کے معلوم کرو کہ ضابطے (۴)، (۵)، (۶) کس طرح اخذ کئے جا سکتے ہیں

مثال ۲ — ہندسی طور پر ثابت کرو کہ اگر سورج کا مفروضہ میل، مف ضہ کی حد تک غلط ہو تو سورج کے راسی فاصلہ کے مُشاہدے سے ساعتی زاوئے کی تعیین میں مفروضہ میل کی خطاء سے جو خطا پیدا ہو گی وہ مم عا قط ضہ × مف ضہ ہو گی۔

مثال ۳ — کِن حالات کے تحت یومی حرکت کی باعث دن بھر ایک ستارہ کے راسی فاصلہ کی تبدیلی اِس کے ساعتی زاوئے کی تبدیلی کے متناسب ہو گی۔

(۲) سے حاصل ہوتا ہے مف ی | مف س = ۔ جب ا جم فہ اور یہ مستقل ہونا چاہیئے، اِس لیے ا مستقل ہونا چاہیئے اور اِس لیے مُشاہد خط استوا پر ہونا چاہیئے اور ستارہ ایک اُستوائی ستارہ ہونا چاہیئے۔

مثال ۴ — اگر معلومہ میل کے کسی جرم فلکی کا راسی فاصلہ مُشاہدہ کیا جائے اور اِس راسی فاصلہ سے ساعتی زاویہ متعین کیا جائے تو ہندسی طور پر ثابت کرو کہ مفروضہ عرض بلد فہ میں ایک چھوٹی خطا مف فہ کی موجودگی ساعتی زاویہ میں ۔ مم ا قط فہ مف فہ کی خطا پیدا کرے گی جہاں ا السمت ہے۔

نیز دکھاؤ کہ یہ خطا بالعموم غیر اہم ہو گی بشرطیکہ جرم اول السمت کے نزدیک ہو

قطبی فاصلہ ق س (= ۹۰° ـ ضہ)، راسی فاصلہ ر س (= ی) اور عرض التمام ق ر (= ۹۰° ـ ضہ) سے مثلث ق س ر حاصل ہوتا ہے۔ (شکل ۳۱) اختلاف منظری زاویہ عا منفی ہے کیونکہ وہ، نصف النہار کے مشرق میں ہے (دفعہ ۳۴)۔

قطبی فاصلہ ق س (= ق سَ)، راسی فاصلہ ر س (= رَ سَ) اور عرض التمام ق رَ (= ۹۰° ـ فہ ـ مف فہ) سے مثلث ق سَ رَ حاصل ہوتا ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

رَ م اور سَ ل، س ر پر عمود کھینچو تو چونکہ س ر اور سَ رَ بہت قریب ہیں اس لیے سَ رَ = ل م، لیکن چونکہ سَ رَ = س ر اس لیے ہمیں حاصل ہونا چاہئے س ل = ر م۔

زاویہ س ر رَ، الشمت ا ہے، اس لیے س ل = ر م = - جم ا مف فہ

زاویہ ق س ر = - عا اور س سَ = س ل قط (۹۰° + عا)

= + جم ا قم عا مف فہ

لیکن مف س = س سَ قم ق س، اس لیے (۹۷)

مف س = جم ا قم ق س قم عا مف فہ = - م ا قط فہ مف فہ



شکل (۳۱)

مثال ۵ — میل ضہ کے ایک ستارہ کے راسی فاصلے ی۱، ی۲ ایسے لمحوں پر مشاہدہ کئے گئے ہیں جن کے درمیان وقفہ ۲ تہ ہے۔ بتاؤ کہ عرض التمام ج، مساوات

جب ½ ج = جب ½ (ی + لا) جب ½ طہ قم صہ

سے معلوم ہو سکتا ہے، جہاں لا، د، ی، طہ، صہ امدادی زاوئے ہیں جو مساوات

(۱) مس لا = مم ضہ جم تہ

(۲) جب د = جم ضہ جب تہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۳) جم ی = جم ½ (ی۱ + ی۲) جم ½ (ی۱ − ی۲) قط د

(۴) جب طہ = جب ½ (ی۱ + ی۲) جب ½ (ی۱ − ی۲) قم ی قم د

(۵) مس صہ = جب ½ (ی + لا) قم ½ (ی − لا) مس ½ طہ

سے حاصل ہوتے ہیں۔ [Math. Trip]

مثال ۶ ۔ اگر قطب تارے (Polaris) کا شمال قطبی فاصلہ ف اور راسی فاصلہ ی، قطب کے نیچے نصف النہار سے ساعتی زاویہ س پر مشاہدہ کیے گیے ہوں تو ثابت کرو کہ عرض التمام ع مساواتوں

جب ما = جب ف جب س، مس لا = مس ف جم س،

مس² ½ (ع + لا) = مس ½ (ی + ما) مس ½ (ی − ما)

سے معلوم ہو سکتا ہے۔

امدادی زاویوں لا اور ما کی ہندسی اہمیت کیا ہے؟ [Math. Trip.]

مثال ۷ ۔ اگر ایک ستارہ کا میل ضہ اور اس کا اعظم السمت ا ہو تو ثابت کرو کہ اُس لمحہ سے جبکہ السمت ا ہے وقت کے ت ثانیوں میں السمت بقدر

قوس کے ½ ۱۵² ت² جب² أ جب² ضہ مس ا ثانیوں

کے بدل جائے گا۔

اگر السمت کی قیمت اعظم ہو تو ستارہ قطب اور راس کے درمیان تکبد کرے گا اور اعظم السمت کے لیے راسی فاصلہ اُس چھوٹی قوس پر مماس ہوتا ہے جو ستارہ اپنی ظاہری یومی حرکت میں مرتسم کرتا ہے۔

(۹۸) ۔ مم ا = جم فہ مس ضہ قم س ۔ جب فہ مم س کو تفرق کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{قم}^2 \text{ ا} \frac{\text{فر ا}}{\text{فر س}} = \text{جم فہ مس ضہ قم س مم س} - \text{جب فہ قم}^2 \text{س}$$

$$= - \text{مم ا مم س} - \text{جب فہ}$$

پھر تفرق کرنے اور $\frac{\text{فر ا}}{\text{فر س}} = 0$ بنانے سے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$\text{قم}^2\ 1 \frac{\text{فر}^2\ 1}{\text{فر س}^2} = \text{م}\ 1\ \text{قم}^2\ \text{س}$$

اور $$\frac{\text{فر}^2\ 1}{\text{فر س}^2} = \text{س}\ 1\ \text{جب}^2\ \text{ضہ}$$

اِس لیے اعظم السمت کی آن سے ت ثانیوں میں السمت کی تبدیلی لا ہو تو

$$1\ \text{جب}\ \text{أ} = \frac{1}{2}\ 15\ 1\ \text{ت}^2\ \text{جب}^2\ \text{أ}\ \text{جب}^2\ \text{ضہ س}\ 1$$

۳۶ ۔ کسی جرم فلکی کے تکبُّد کا وقت ۔

بالائی تکبُّد کے لمحہ پر (دفعہ ۲۹) جرم کا صعود مستقیم کوکبی وقت ہوتا ہے۔ اس لیے بالائی تکبُّد کا وقت معلوم کرنے کا مسئلہ اِس مسئلہ میں تحویل ہو جاتا ہے کہ اِس جرم کا صعود مستقیم اُس آن پر معلوم کیا جائے جبکہ وہ نصف النہار کو عبور کرتا ہے۔

ستارے کے بالائی تکبُّد کا وقت

کسی ستارے کی صورت میں عمل حساب بہت سادہ ہے کیونکہ ظاہری صعود مستقیم بہت سُست رفتار سے بدلتا ہے اور اِس لئے ہم جدولوں سے دیکھ کر اسے ہمیشہ معلوم کر سکتے ہیں اور پھر بالائی تکبُّد کا کوکبی وقت فوراً حاصل ہو جاتا ہے۔

مثلاً فرض کرو کہ ہم سماک رامح (Arcturus) کے مرور کا وقت بمقام گرینوچ بتاریخ ۱۲ فروری سنہ ۱۹۰۶ء معلوم کرنا چاہتے ہیں جو اس مخصوص مقصد کے لیے ۱۲ فروری کی ظاہری ظہر سے ۱۳ فروری کی ظاہری ظہر تک آسانی سے شمار کیا جا سکتا ہے۔ ایفیمریس بابتہ سنہ ۱۹۰۶ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ۱۰ فروری کو بالائی تکبُّد کے وقت صعود مستقیم ۱۴ گ ۱۱ م ۴۲ ث ۲۲ ہے۔ یہ صعود مستقیم ۱۰ دن میں ۲۹ ث بڑھتا ہے اور اس لیے ۱۲ فروری کو تکبُّد کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

وقت صعود مستقیم ۱۴ گ ۱۱ م ۲۲٫۴۸ ش ہے۔ اُس دن اوسط ظہر پر پنوچ کا کوکبی وقت ۲۱ گ ۲۶ م ۲۹٫۹۱ ش ہے (دفعہ ۶۹)۔

اِس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سماک رامح بتاریخ ۱۲ فروری ۱۹۰۶ء اوسط ظہر کے بعد کوکبی وقت

۲۴ گ + (۱۴ گ ۱۱ م ۲۲٫۴۸ ش) − (۲۱ گ ۲۶ م ۲۹٫۹۱ ش) = ۱۶ گ ۴۴ م ۵۲٫۵۷ ش

پر نصف النہار پر پہنچیگا۔ ہم اِس کوکبی وقت کو اوسط وقت میں جدولوں کے ذریعہ جو بحری جنتری میں دیجاتی ہیں تحویل کرتے ہیں، اِس طرح

۱۶ گ	۱۵ گ	۲۲٫۷۳ ش
۴۴ م	۵۷ م	۵۲٫۷۹ ش
۵۲ ش	۴۳ م	۵۱٫۸۶ ش
۵۷٫		۵۷٫
۱۶ گ	۴۲ م	۹۵٫۷ ش

اِس لیے سماک رامح کا تکبّد ۱۲ فروری ۱۹۰۶ء کو بوقت ۱۶ گ ۴۲ م ۹۵٫۷ ش واقع ہوتا ہے۔

(۹۹) کسی متحرک جرم مثلاً سیارہ یا چاند کی صورت میں صعود مستقیم ساعت بہ ساعت تیزی سے بدلتا ہے۔ اِس کے تکبّد کا وقت معلوم کرنے کے لیے ہم حسب ذیل عمل کرتے ہیں۔

فرض کرو کہ جرم کا صعود مستقیم تین متصل وقت کے وقفوں $ت_1$، $ت_2$، $ت_3$ پر $ع_1$، $ع_2$، $ع_3$ ہے۔ یہ وقت کے وقفے ایسے ہیں جن کے لیے محسوبہ قیمتیں جدولوں سے ملتی ہیں اور نیز ایسے کہ تکبّد $ت_1$ اور $ت_3$ کے درمیان واقع ہوتا ہے۔ اب مساوی وقفوں $ت_2$ - $ت_1$ یا $ت_3$ - $ت_2$ میں سے کسی ایک کو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

وقت کی اکائی کے طور پر لو اور یہ فرض کرو کہ تکبُّد ت۱ کے بعد وقت کی ت اکائیوں پر واقع ہوتا ہے تو بینی ادراج کے ذریعہ تکبُّد کے وقت صعود مستقیم کے لیے حاصل ہوتا ہے

$$عہ_۱ + ت (عہ_۲ - عہ_۱) + \frac{۱}{۲} ت (ت - ۱) (عہ_۱ - ۲ عہ_۲ + عہ_۳)$$

یہ جرم کے تکبُّد کا کوکبی وقت ہوگا۔ فرض کرو کہ وقفہ ت۱ پر کوکبی وقت طہ۱ ہے اور فرض کرو کہ کوکبی وقت میں مذکورۂ بالا اکائی کی قیمت ھ ہے۔ تب تکبد کی آن پر کوکبی وقت ہے

$$طہ_۱ + ھ ت$$

لیکن یہ اُس جملہ کے مساوی ہونا چاہئے جو ابھی اوپر لکھا جا چکا ہے۔ اِس لیے

$$طہ_۱ + ھ ت = عہ_۱ + ت (عہ_۲ - عہ_۱) + \frac{۱}{۲} ت (ت - ۱) (عہ_۱ - ۲ عہ_۲ + عہ_۳)$$

اِس مساوات سے ت معلوم کرنا ہوگا۔ مساوات دو درجی ہے لیکن ہمارے مطلب کی اہم اصل صریحًا اِس واقعہ سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ $\frac{۱}{۲} ت (ت - ۱) (عہ_۱ - ۲ عہ_۲ + عہ_۳)$ ایک چھوٹی مقدار ہے۔ اِس لیے اِس مساوات کو حل کرنے میں ہم ت کی بجائے تقریبی قیمت تَ مساوات

$$طہ_۱ + ھ تَ = عہ_۱ + تَ (عہ_۲ - عہ_۱)$$

کو حل کر کے معلوم کر لیتے ہیں اور پھر ہم اِس قیمت تَ کو مذکورۂ بالا چھوٹی رقم میں داخل کرتے ہیں اور ت کے لیے حسب ذیل مفرد مساوات حل کرتے ہیں

$$طہ_۱ + ھ ت = عہ_۱ + ت (عہ_۲ - عہ_۱) + \frac{۱}{۲} تَ (تَ - ۱) (عہ_۱ - ۲ عہ_۲ + عہ_۳)$$

کسی سیّارہ کے بالائی تکبُّد کا وقت

متذکرۂ صدر عمل کو واضح کرنے کے لیے ہم مشتری (Jupiter) کے تکبُّد کا

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

وقت بمقام گرینچ بتاریخ ۲۵ ستمبر ۱۹۰۶ء محسوب کریں گے۔

بحری جنتری (Nautical almanac) کے صفحہ ۲۳۷ سے ہمیں حسب ذیل مواد ملتا ہے:-

	اوسط ظہر	مشتری کا صعود مستقیم	فرق اول	فرق دوم
۲۵ ستمبر ۱۹۰۶ء	۶ گ	۳۹ م ۵۳٫۵۹ ث		
			+ ۲۶٫۹۰ ث	
۲۶ "	۶ گ	۴۰ م ۲۰٫۹۶ ث		- ۰٫۶۸ ث
			+ ۲۶٫۲۲ ث	
۲۷ "	۶ گ	۴۰ م ۴۷٫۱۸ ث		

اس لیے مشتری کا صعود مستقیم ۲۵ ستمبر ۱۹۰۶ء کی ظہر کے ت دن بعد یہ ہے (۱۰۰)

$$۶^{گ}\ ۳۹^{م}\ ۵۳٫۵۹^{ث} + ۲۶٫۹۰^{ث}\ ت - ۰٫۳۴^{ث}\ ت\ (ت-۱)$$

تکبد کی آن پر یہ صعود مستقیم کو کبی وقت کے مساوی ہوتا ہے جو یہ ہے

$$۱۲^{گ}\ ۱۳^{م}\ ۳۴٫۶۲^{ث} + ت\ [۲۴^{گ}\ ۳^{م}\ ۵۶٫۵۵^{ث}]$$

اس لیے ت کے لیے مساوات حاصل ہوتی ہے

$$۳۰^{گ}\ ۳۹^{م}\ ۵۳٫۵۹^{ث} + ۲۶٫۹۰^{ث}\ ت - ۰٫۳۴^{ث}\ ت\ (ت-۱)$$

$$= ۱۲^{گ}\ ۱۳^{م}\ ۳۴٫۶۲^{ث} + ت\ [۲۴^{گ}\ ۳^{م}\ ۵۶٫۵۵^{ث}]$$

دائیں جانب کی آخری رقم کو نظر انداز کرنے اور پہلے حل میں سب ثانیوں کو ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$۱۸^{گ}\ ۲۶^{م} = ت\ (۲۴^{گ}\ ۳^{م})$$

اس لیے ت = ۰٫۷۷

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ت کی اِس تقریبی قیمت کو ۔۳۴٫۰ ث ت (ت ۔ ۱) میں داخل کرنے سے
وہ ۰٫۰۶ ث میں تحویل ہو جاتا ہے۔
اِس لیے مساوات مندرجۂ بالا ہو جاتی ہے

$$۳۰^{گ}\ ۳۹^{م}\ ۵۳٫۶۵^{ث} + ۰٫۹۰^{ث}\ ت = ۱۲^{گ}\ ۱۳^{م}\ ۳۴٫۶۲^{ث} + ت\ (۲۴^{گ}\ ۳^{م}\ ۵۶٫۵۵^{ث})$$

پس
$$ت = \frac{۱۸^{گ}\ ۲۶^{م}\ ۱۹٫۰۳^{ث}}{۲۴^{گ}\ ۳^{م}\ ۲۹٫۶۵^{ث}} = ۰٫۷۶۶۴۱۶$$

اِس لیے مشتری کا تکبّد ظہر کے بعد اوسط شمسی دن کا ۰٫۷۶۶۴۱۶ ہے
یعنی ۱۸ گ ۲۳ م ۳۴٫۳۸ ث گ ۔ ا ۔ و پر (دیکھو بحری جنتری سنہ ۱۹۰۶ء صفحہ ۲۷۲)

چاند کے بالائی تکبد کا وقت

چاند کی صورت میں حرکت اِس قدر تیز ہوتی ہے کہ ساعت بہ ساعت اِس کے مقامات جو ایفیمرس سے حاصل ہو سکتے ہیں دیکھنے پڑتے ہیں۔ مثلاً ہم وہ وقت محسوب کریں گے جس پر چاند نے بمقام گرینوچ بتاریخ ۲۹ اکتوبر سنہ ۱۹۰۶ء نصف النہار کو عبور کیا تھا۔

اُس دن اوسط ظہر پر کوکبی وقت ۱۴ گ ۲۷ م ۴۲٫۳۷ ث ہے (بحری جنتری سنہ ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۶۵) ۔ چاند کا صعود مستقیم بوقت ظہر (بحری جنتری صفحہ ۱۷۵) ۲۳ گ ۲۳ م ۶۲٫۲۳ ث ہے۔ اگر چاند میں حرکت نہ ہوتی تو اِس سے یہ نتیجہ نکلتا کہ چاند کو شام میں تقریباً دس بجے تکبّد کرنا چاہیئے۔ دس بجے چاند کا صعود مستقیم تقریباً ۲۳ گ ۴۳ م ہے اور اِس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر اور چاند کے تکبّد کے درمیان وقفہ تقریباً کوکبی وقت کے ۱۰ گ ۱۶ م ہے یا اوسط شمسی وقت کے ۱۰ گ ۱۴ م۔ اِس لیے ہم ایفیمرس سے حسب ذیل مواد لیکر چاند کے تکبد کا وقت معلوم کر لیتے ہیں :۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

صعود مستقیم چاند فرق اول فرق دوم

۲۹ر اکتوبر سنہ ۱۹۰۶ء گھنٹے ۱۰ گ ۰ م ۴۲ ث ۵۲٫۰۳

+ ا ۵۶٫۴۰ ث

گھنٹے ۱۱ گ ۰ م ۴۴ ث ۴۸٫۴۳

- ۰٫۰۶ ث

+ ا ۵۶٫۳۴ ث

گھنٹے ۱۲ گ ۰ م ۴۶ ث ۴۴٫۷۷

(۱۰۱) پس یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ظہر کے بعد (۱۰ + ت) گھنٹوں پر چاند کا صعود مستقیم ہے

گ ۴۲ م ۵۲٫۰۳ ث + ۱۱۶٫۴۰ ت - ۰٫۰۳ ت (ت - ۱)

چونکہ ت تقریباً ۱/۴ ہے اس لیے آخری رقم تقریباً ایک ثانیہ کا ۱/۲۰۰ حصہ ہے اور اس لیے وہ نظر انداز کی جا سکتی ہے - اس لیے ت معلوم کرنے کے لیے حسب ذیل مساوات ملتی ہے

گ ۴۲ م ۵۲٫۰۳ ث + ۱۱۶٫۴۰ ت

= اوسط وقت ۱۰ گ پر کوکبی وقت + ت [۱ گ ۰ م ۸۶٫۹ ث]

بائیں جانب ت کا سر ایک اوسط گھنٹے کی کوکبی قیمت ہے - زیر بحث یوم میں اوسط ظہر پر کوکبی وقت ۱۴ گ ۲۷ م ۴۲٫۳۷ ث ہے - اگر اس میں ہم ۱۰ گ ۱ م ۳۸٫۵۶ ث جمع کریں جو کہ اوسط وقت کے ۱۰ گ کا کوکبی معادل ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ۱۰ گ گ - ۱ - ۹ پر کوکبی وقت ۲۹ گ ۹۸٫۱۵ ث ہے - اس لیے مساوات بالا ہے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

گ ۴۲ م ۳ ث ۵۲٫۰۳ - گ ۲۹ م ۱۵٫۹۸ ث = ت (۱ گ ۰ م ۸۶٫۹ ث - ۱ م ۴۰٫۵۶ ث)

$$ت = \frac{\text{م } ۱۳ \quad \text{ث } ۳۶٫۰۵}{\text{م } ۵۸ \quad \text{ث } ۱۳٫۴۶} = ۰٫۲۳۳۵۹۴$$

یہ دس بجے شام کے بعد ایک اوسط گھنٹے کی وہ کسر ہے جس پر تکبد واقع ہوتا ہے یعنے تکبد کا وقت ۱۰ گ ۱۴ م ۱۴٫۹۴ ث ہے (بحری جنتری ۱۹۰۶ء صفحہ ۱۶۷)

طول بلد لہ پر تکبد کا وقت

فرض کرو کہ کسی جرم فلکی کے بالائی تکبد کا وقت بمقام پ معلوم کرنا مقصود ہے جو طول بلد لہ میں گرینچ کے مغرب میں واقع ہے۔

تکبد کی آن پر جرم کا صعود مستقیم بلا شبہ اس مقام پر کے کوکبی وقت کے مساوی ہوگا۔ فرض کرو کہ مقامی اوسط وقت طہ ہے تو گرینچ پر اوسط وقت اسی آن پر طہ + لہ ہوگا اور اس لیے جرم کے صعود مستقیم کو بینی ادراج کے ذریعہ طہ + لہ کے ایک تفاعل کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔

پس ہمیں اوسط وقت طہ کے جواب میں صرف پ پر کا کوکبی وقت معلوم کرنا ہے۔ ایفیمرس سے گرینچ پر اوسط ظہر کے جواب میں کوکبی وقت ملیگا۔ اس میں

$$\frac{\text{لہ}}{\text{ک}} \times \text{(اوسط شمسی اور کوکبی دن کے درمیان فرق کوکبی وقت میں)}$$

۲۴

کا اضافہ کرنا ہوگا تاکہ بمقام گرینچ اوسط ظہر پر کوکبی وقت حاصل ہو۔ اس میں طہ کو بقدر اس نسبت کے بڑھا کر جمع کرنا چاہئے جو اوسط دن کے وقفہ کو کوکبی دن کے وقفہ سے ہے۔ محصلہ کوکبی وقت کو صعود مستقیم کے مساوی رکھنے سے طہ معلوم ہو جائیگا۔

(۱۰۲) مثلاً فرض کرو کہ ہم وہ وقت معلوم کرنا چاہتے ہیں جس پر چاند رصدگاہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

لِک، ماونٹ ہملٹن کیالیفورنیا کے نصف النہار کو بتاریخ ۲۵۔ دسمبر ۱۹۰۶ء عبور کرتا ہے۔۔۔ اِس مقام کا طول بلد ۸ گ ۶ م ۳۴٫۸۹ ث ہے اور اگر تکبّد کا اوسط مقامی وقت طہ ہو تو گرینوچ اوسط وقت ۸ گ ۶ م ۳۴٫۸۹ ث + طہ ہے۔

ایفیمرس سے معلوم ہوتا ہے کہ بتاریخ ۲۵۔ دسمبر ۱۹۰۶ء گرینوچ اوسط ظہر پر کوکبی وقت ۱۸ گ ۱۲ م ۱۲٫۱۳ ث ہے اور چاند کا صعود مستقیم ۲ گ ۱۹ م ۲۹٫۸۴ ث سے ۲۳ گ پر ۳ گ ۳ م ۳۲٫۴۰ ث تک متغیر ہوتا ہے اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ گرینوچ پر تکبّد تقریباً ۸ گ ۲۲ م گ۔ ا۔ و پر واقع ہوتا ہے۔ بعد کے ۸ گھنٹوں میں چاند کے صعود مستقیم میں تقریباً ۱۵ م کا اضافہ ہوتا ہے۔ اِس لیے لِک کی رصدگاہ پر تکبّد تقریباً ۸ گ ۳۷ م مقامی اوسط وقت پر واقع ہوگا یا تقریباً ۱۶ گ ۴۳ م گرینوچ اوسط وقت پر۔ پس جدولوں کا وہ حصہ جسے صحیح عمل حساب میں استعمال کرنا ہوگا حسب ذیل ہے:۔

	گ۔ ا۔ و	چاند کا صعود مستقیم	فرق اول	فرق دوم
۱۹۰۶ء سنہ ۲۵۔ دسمبر	۱۶ گھنٹے	۲ گ ۵۰ م ۹٫۷۳ ث		
			+ ۱ م ۵۵٫۵۵ ث	
	۱۷	۲ گ ۵۲ م ۵٫۲۸ ث		+ ۰٫۰۸ ث
			+ ۱ م ۵۵٫۶۳ ث	
	۱۸	۲ گ ۵۴ م ۱۱٫۹۱ ث		

فرض کرو کہ ۸ گ ۶ م ۳۴٫۸۹ ث + طہ = ۱۶ گ + ت جہاں ت، ایک گھنٹہ کی کسر ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

تب $طہ = ۷^{گ}\ ۵۳^{م}\ ۱۱\frac{۲۵}{۶۰}^{ث} + ت$

لِک کی رصدگاہ پر مقامی اوسط وقت طہ کے جواب میں کوکبی وقت حسب طریقہ ذیل معلوم کیا جاتا ہے ۔

کوکبی وقت گرینوچ

اوسط ظہر پر $= ۱۸^{گ}\ ۱۲^{م}\ ۱۳\frac{۲۱}{۶۰}^{ث}$

لِک کا طول بلد

$\times (۳^{م}\ ۵۶\frac{۵۶}{۶۰}^{ث}) \div ۲۴^{گ} = ۱^{م}\ ۱۹\frac{۹۳}{۶۰}^{ث}$

$(۷^{گ}\ ۵۳^{م}\ ۱۱\frac{۲۵}{۶۰}^{ث} + ت)$ کوکبی وقت میں بیان شدہ

$= ۷^{گ}\ ۵۴^{م}\ ۴\frac{۲۸۸}{۶۰}^{ث} + (۱^{گ}\ ۰^{م}\ ۹\frac{۸۶}{۶۰}^{ث})\ ت$

ان تین سطروں کو جمع کرنے سے مقام لِک پر چاند کے بالائی تکبُّد کا کوکبی وقت حاصل ہوتا ہے جو $= ۲^{گ}\ ۸^{م}\ ۲۳\frac{۹۴}{۶۰}^{ث} + (۱^{گ}\ ۰^{م}\ ۹\frac{۸۶}{۶۰}^{ث})\ ت$

چاند کا صعود مستقیم $(۱۶ + ت)^{گ}$ گ - ا - و پر

$۲^{گ}\ ۵۰^{م}\ ۹\frac{۷۳}{۶۰}^{ث} + ت\ (۱۱۵\frac{۵۵}{۶۰}^{ث}) + ۰\frac{۴}{۶۰}^{ث}\ ت\ (ت - ۱)$ ہے ۔

چونکہ ت تقریباً $۰\frac{۱}{۶۰}^{گ}$ ہے اس لیے اِس جملہ کی تیسری رقم $-\ ۰\frac{۱}{۶۰}^{ث}$ ہے اور ت معلوم کرنے کے لیے مساوات حاصل ہوتی ہے

$۲^{گ}\ ۸^{م}\ ۲۳\frac{۹۴}{۶۰}^{ث} + ت\ (۱^{گ}\ ۰^{م}\ ۹\frac{۸۶}{۶۰}^{ث})$

$= ۲^{گ}\ ۵۰^{م}\ ۹\frac{۷۲}{۶۰}^{ث} + ت\ (۱۱۵\frac{۵۵}{۶۰}^{ث})$

یا $ت = \frac{۴۱^{م}\ ۷۸\frac{۴۵}{۶۰}^{ث}}{۵۸^{م}\ ۱۴\frac{۳۱}{۶۰}^{ث}} = ۰\frac{۷۱۷۱۰۳}{۱۰۰۰۰۰}$ گھنٹے (۱۰۳)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$= ۴۳^م ۵۷^ث ۱$

پس بمقام لِک چاند کا تکبُّد $۱۶^گ ۴۳^م ۵۷^ث ۱$ گرینوچ اوسط وقت پر

یا $۸^گ ۳۶^م ۲۶^ث ۶۸$ مقامی اوسط وقت پر واقع ہوا۔

۳۷۔ کسی جرم فلکی کا طلوع وغروب۔

کسی جرم فلکی کے طلوع اور غروب ہونے کا وقت بڑی حد تک انعطاف سے متاثر ہوتا ہے۔ ہم انعطاف کے اثر پر کسی آیندہ باب (چھٹے) میں غور کریں گے اور فی الحال اِس کو ملتوی کرتے ہیں۔ ہم یہاں وہ مناسبتے بیان کریں گے جن سے یہ معلوم ہوگا کہ کوئی جرم فلکی کرۂ ہوائی کے اثرات کے قطع نظر کس وقت افق پر یعنے راس سے $۹۰°$ پر ہوتا ہے۔ شکل (۳۲) میں نقطے ش اور ر علی الترتیب قطب شمالی اور راس ہیں۔ پ ایک



شکل (۳۲)

ستارہ ہے بوقت طلوع یا غروب جبکہ ر پ $= ۹۰°$۔ اس لیے حاصل ہوتا ہے

$$۰ = \text{جب فہ جب ضہ} + \text{جم فہ جم ضہ جم س}$$

اس لیے $\text{جم س} = -\text{مس فہ مس ضہ}$

اِس کے بالعموم دو حل ہوں گے ایک س $(< ۱۸۰°)$ جو غروب کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جواب میں ہوگا اور دوسرا ۳۶۰° - س جو طلوع کے جواب میں ہوگا بشرطیکہ ستارہ ایسا ہو کہ مشاہد کے عرض بلد پر طلوع اور غروب ہوتا ہو -

مثال ۱ - ثابت کرو کہ میل ضہ کا کوئی جرم عرض بلد فہ کے مقام پر نہ طلوع ہوگا نہ غروب الا آنکہ مس فہ مس ضہ < ۱ (بلالحاظ علامت)-

مثال ۲ - اگر ایک ستارہ کا شمالی میل ۴۰° ہو تو ثابت کرو کہ کوئی دن میں گھنٹوں کی وہ تعداد جن کے اثناء میں ستارہ اس مقام کے افق کے نیچے ہوگا جس کا عرض بلد ۳۰° ہے ۸ ۱۳۶ ہے -

مثال ۳ - سماک رامح کا میل ۱۹۰۹ء میں ۱۹° ۳۹' ش ہے اور کیمبرج کا عرض بلد ۵۲° ۱۳' ہے - یہ ستارہ طلوع اور تکبد کے درمیانی وقفہ میں جس ساعتی زاویہ میں سے حرکت کرتا ہے اس کو معلوم کرو -

مثال ۴ - فرض کرو کہ ایک ستارہ کے طلوع کا کوکبی وقت ک اور غروب کا وقت ک' ہے اور ستارہ کے محدد عہ، ضہ ہیں - ثابت کرو کہ ک = عہ + سہ اور ک' = عہ + سہ جہاں سہ اور سہ' مساوات (۱۰۴)

جم سہ = - مس فہ مس ضہ

کی دو اصلیں ہیں -

مثال ۵ - کن حالات کے تحت ایک ستارہ کا السمت طلوع سے تکبد تک مستقل رہے گا -

اگر ستارہ کا السمت مستقل ہے تو اسے راس میں سے گذرنے والے ایک بڑے دائرہ پر حرکت کرنا چاہئے - اس لیے ستارہ سماوی خط استواء پر ہونا چاہئے اور قطب مشاہد کے افق پر ہونا چاہئے یعنی مشاہد ارضی خط استواء پر ہونا چاہئے -

مثال ۶ - اگر عرض بلد فہ اور ایک جرم فلکی کا میل ضہ، اور س اس کا وہ ساعتی زاویہ ہو جو بوقت طلوع یا غروب حاصل ہوتا ہے تو ثابت کرو کہ

$$۲ \text{ جم}^{۲} \frac{۱}{۲} \text{ س} = \text{قط فہ قط ضہ جم (فہ + ضہ)}$$

جبکہ انعطاف کے اثر کو نظر انداز کر دیا گیا ہو -

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۷ - ثابت کرو کہ عرض بلد ۵۴° میں وہ وقفہ مستقل ہے جو کسی ستارہ کے مشرقی سمت میں سے گزرنیکے وقت اور اس کے غروب کے وقت کے درمیان ہوتا ہے۔

فرض کرو کہ ستارہ کا محل جبکہ وہ مشرقی سمت میں ہو م ہے اور فرض کرو کہ راس ر اور قطب ق ہے (شکل ۳۳) - تب زاویہ م ر ق = ۹۰°، ر ق = ۵۴° - ر ق کو نر تک اس طرح خارج کرو کہ ق نر = ۵۴° اور فرض کرو کہ ر ھ (= ۹۰°)، م ق محدود ہ کو ھ پر قطع کرتا ہے۔



شکل (۳۳)

چونکہ ر نر = ر ھ = ۹۰° اس لیے زاویہ ر نر ھ = ۹۰° اور اس لیے مثلثات ر ق م اور نر ق ھ میں ر ق = ق نر اور م ر ق = ھ نر ق = ۹۰° - اس لیے یہ مثلث مساوی ہیں اور م ق = ھ ق اور چونکہ ھ، راس سے ۹۰° پر ہے اس لیے وہ ستارہ کے غروب کا محل ہے۔ پس ستارہ، م سے ھ تک نصف کوکبی یوم میں حرکت کرتا ہے۔

مثال ۸ — دو ستارے جن کے میل ضہ، ضہ ہیں مشاہدہ کئے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ ایک ہی وقت پر مشرق میں ہوتے ہیں اور نیز ایک ہی وقت پر غروب ہوتے ہیں۔ ثابت کرو کہ مشاہد کے مقام کا عرض بلد ۵۴° ہے (۱۰۵)
اور اگر ستاروں کے طلوع کے وقتوں کے درمیان گھنٹوں کی تعداد ہو تو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$۲ جم \frac{۱۵° \times ت}{۴} = \sqrt{(۱+مس ضہ_۱)(۱+مس ضہ_۲)} + \sqrt{(۱-مس ضہ_۱)(۱-مس ضہ_۲)}$$

قطب سے اُس بڑے دائرہ پر عمود کھینچو جو اِن دو ستاروں کو ملاتا ہے۔ اِس عمود کا طول یومی حرکت سے متاثر نہیں ہوتا اور اِس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ قطبِ اول السمت اور افق سے مساوی فاصلہ پر ہے یعنی اُس مقام کا عرض بلد ۴۵° ہے۔

نیز وہ وقت جس کے اثناء میں ستارہ افق کے اوپر رہتا ہے غروب کے وقت ستارہ کے ساعتی زاویہ کا دگنا ہے یعنی

$$۲ جم^{-۱} (-مس فہ مس ضہ)$$

ہے۔

اب چونکہ ستارے ایک ساتھ غروب ہوتے ہیں اور فہ = ۴۵° اِسلیے اِن کے طلوع کے وقتوں کے درمیان وقفہ

$$۲ جم^{-۱} (-مس ضہ_۱) - ۲ جم^{-۱} (-مس ضہ_۲)$$

ہے۔ اس سے مطلوبہ نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے۔

مثال ۹۔ اگر دو ستارے جن کے محدد علی الترتیب عہ، ضہ اور عَہ، ضَہ ہیں ایک ہی لمحہ پر عرض بلد فہ کے ایک مقام پر طلوع ہوں تو ثابت کرو کہ

$$جب^{۲} (عہ - عَہ) مم^{۲} فہ = مس^{۲} ضہ + مس^{۲} ضَہ - ۲ مس ضہ مس ضَہ جم (عہ - عَہ)$$

مثال ۱۰۔ اگر کرۂ سماوی کا رقبہ ۱ ہو تو ثابت کرو کہ کسی عرض بلد فہ میں رہنے والے مُشاہد کے لیے ایک حصہ ۱ جب^۲ ½ فہ میں کے ستارے کبھی بھی اُس کے افق کے اوپر نہیں ہوں گے، دوسرے حصہ ۱ جب^۲ ½ فہ میں کے ستارے ہمیشہ اِس کے افق کے اوپر ہوں گے، حصہ ۱ جم فہ میں کے ستارے روزانہ طلوع و غروب ہوں گے اور حصہ ۱ جم^۲ ½ فہ میں وہ سب ستارے آجائیں گے جن سے وہ واقف ہو سکتا ہے۔

اگر ایک کرہ کا نصف قطر ۱ ہو تو اس کا وہ رقبہ جو نصف قطر فہ کے ایک چھوٹے دائرہ سے منقطع ہوتا ہے ۲ π ۱^۲ (۱ - جم فہ) ہے۔ شمالی اور

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جنوبی قطبوں کے گرد نصف قطر فہ کے چھوٹے دائرے کرہ کے وہ حصے قطع کریں گے جو علی الترتیب ہمیشہ افق کے اوپر اور ہمیشہ افق کے نیچے رہیں گے۔

مثال ۱۱ — ایک مقام پر جس کا شمالی عرض بلد فہ ہے دو ستارے جن کے ش۔ ق۔ ف (شمال قطبی فاصلے) علی الترتیب ف اور فَ ہیں ایک ساتھ طلوع ہوتے ہیں اور پہلا ستارہ نصف النہار پر اُس وقت آتا ہے جبکہ دوسرا غروب ہوتا ہے۔ ثابت کرو کہ

$$\frac{\text{مس فہ}}{\text{مس ف}} = ۱ - \frac{۲\ \text{مس}^۲\ \text{فہ}}{\text{مس}^۲\ \text{ف}}$$

یہ ظاہر ہے کہ اگر دوسرے ستارے کا ساعتی زاویہ بوقت طلوع س ہو تو پہلے ستارہ کا ساعتی زاویہ ۲ س ہونا چاہیئے، اِس لیے

۰ = جم ف جب فہ + جب ف جم فہ جم ۲ س

۰ = جم فَ جب فہ + جب فَ جم فہ جم س

اِن مساواتوں سے س کو ساقط کریں تو مطلوبہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

مثال ۱۲ — اگر کسی آن پر فوکو کے رقاص کا اہتزازی مستوی ایک ستارہ میں سے گذرے جو افق کے قریب ہو تو ثابت کرو کہ جب تک یہ ستارہ افق کے قریب رہیگا اہتزازی مستوی ستارہ میں سے گذرتا رہے گا۔

فوکو کے رقاص کا مستوی انتصابی کے گرد ایک ایسی زاوئی رفتار سے گردش کرتا نظر آتا ہے جو کرہ سماوی کی زاوئی رفتار کو عرض بلد کی جیب سے ضرب دینے سے حاصل ہوتی ہے۔ وقت کے چھوٹے وقفہ فرت میں ستارہ س (شکل ۳۴) قوس س سَ پر سَ تک حرکت کرتا ہے جہاں (۱۰۶)

س سَ = جم ضہ فرت۔ اگر سَ ر س پر سَ ت عمود ہو تو

سَ ت = سَ س جب سَ س ت = جم ضہ جم عا فرت = جب فہ فرت

اس لیے سَ ر س = جب فہ فرت

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



شکل (۳۴)

۳۸ - سماوی عرض بلد اور طول بلد - بعض خاص قسم کی تحقیقات

میں کرہ سماوی پر محددوں کے ایک اور نظام کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح خط استوا سے وہ ذرائع مہیا ہوتے ہیں جن سے کسی ستارہ کے صعود مستقیم اور میل کی تعریف عمل میں آتی ہے عین اسی طرح طریق الشمس کو محددوں کے ایک نظام کی اساس قرار دیا جاتا ہے، یہ محدد سماوی طول بلد اور عرض بلد کے نام سے مشہور ہیں - راس الحمل کا نقطہ ♈ وہ مبدا ہے جہاں سے طول بلد کی پیمائش عمل میں آتی ہے اور پیمائش کی سمت وہ رکھی جاتی ہے جو طریق الشمس پر سورج کی ظاہری سالانہ حرکت کی ہے جیسا کہ شکل (۳۵) میں ایک تیر کے نشان سے ظاہر کیا گیا ہے -

طریق الشمس کے شطب ک سے ایک بڑا دائرہ ستارہ س میں سے گذرتا ہوا کھینچا جاتا ہے اور اس بڑے دائرہ کا مقطوعہ ت س جو ستارہ اور طریق الشمس کے درمیان ہے وہ محدد ہے جسے ستارہ کا عرض بلد کہتے ہیں - یہ عرض بلد مثبت ہوگا اگر ستارہ اس نیم کرہ میں واقع ہو جس میں طریق الشمس کا شطب ہے اور منفی ہوگا اگر ستارہ اس نیم کرہ میں واقع ہو جس میں طریق الشمس کا

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ضد شطب ہے۔ ابتداء ۷ سے عمود کے پائین ت تک طریق الشمس کی جو قوس ہے اُسے ستارہ کا طول بلد کہتے ہیں جو دو سو احد دے ہے۔ اس کو طریق الشمس پر ۰° سے ۳۶۰° تک ناپا جاتا ہے، اس طرح اگر طریق الشمس پر کسی جرم کا صعود مستقیم بڑھ جائے تو اس کا طول بلد بھی بڑھ جاتا ہے۔ (۱۰۷)

ہم بلاشبہ اس امر کا مشاہدہ کریں گے کہ لفظوں عرض بلد اور طول بلد کے معنی جو یہاں ہیئتی مفہوم میں سمجھائے گئے ہیں ان الفاظ کے اُن معنوں سے بالکل مختلف ہیں جو ارضی معاملات کے لحاظ سے بالعموم مستعمل ہیں۔ ہیئتی عرض بلد کو بہ سے اور ہیئتی طول بلد کو لہ سے بالعموم تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس ۷ ت = لہ اور ت س = بہ

دائرہ انقلابین کی قوس ل ھ جو خط استواء اور طریق الشمس کے درمیان منقطع ہوتی ہے طریق الشمس کے میلان کے مساوی ہے۔

اگر س کا صعود مستقیم عہ اور میل ضہ ہو تو استحالہ کے ضابطے دفعہ ۱۲ کے عام ضابطوں سے حاصل ہو سکتے ہیں یا راست مثلث س ک ش سے (شکل ۳۵) اور عرض بلد اور طول بلد کی تعیین کے لیے ہمیں حسب ذیل مساواتیں ملتی ہیں:-

$$\left.\begin{array}{l} \text{جب بہ} = \text{جم س جب ضہ} - \text{جب س جم ضہ جب عہ} \\ \text{جم بہ جب لہ} = \text{جب س جب ضہ} + \text{جم س جم ضہ جب عہ} \\ \text{جم بہ جم لہ} = \text{جم ضہ جم عہ} \end{array}\right\} \ldots (۱)$$

ان مساواتوں سے ہم بہ اور لہ معلوم کر سکتے ہیں جبکہ عہ اور ضہ دئے گئے ہوں۔ مسئلہ کی نوعیت سے بالعموم یہ معلوم کر لینا آسان ہوگا کہ طول بلد ۱۸۰° سے بڑا ہے یا چھوٹا۔ جب یہ معلوم ہو جائے تو آخری دو مساواتوں میں سے کسی ایک کو خارج کر سکتے ہیں۔

ہم لوکارتمی عمل کے لیے ان مساواتوں کو ایک امدادی مقدار

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۱۰۸) م = زاویہ س ۲ ل کے ادخال سے زیادہ سہولت بخش بنا سکتے ہیں،
اس طرح مس م = قم عہ مس ضہ (دفعہ ۱۳) اور



شکل (۳۵)

جب بہ = جب ضہ جب (م - سہ) قم م،
جم بہ جب لہ = جب ضہ جم (م - سہ) قم م،
جم بہ جم لہ = جم ضہ جم عہ

مساواتوں کی شکل سے یہ ظاہر ہے کہ م کی اختیار کردہ قیمت کو بقدر ۱۸۰° کے تبدیل کرنے سے نتیجہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

اگر ہم ک ش کے محاذی س پر جو زاویہ بنتا ہے اس کو ۹۰° - ع سے تعبیر کریں تو ڈلمبر کے ضابطوں سے حاصل ہوتا ہے

جم ½ (ع + لہ) جم (۴۵° - ½ بہ) = جم {۴۵° - ½ (ضہ + سہ)} جم (۴۵° + ½ عہ)

جب ½ (ع + لہ) جم (۴۵° - ½ بہ) = جم {۴۵° - ½ (ضہ - سہ)} جب (۴۵° + ½ عہ)

جب ½ (ع - لہ) جب (۴۵° - ½ بہ) = جب {۴۵° - ½ (ضہ + سہ)} جم (۴۵° + ½ عہ)

جم ½ (ع - لہ) جب (۴۵° - ½ بہ) = جب {۴۵° - ½ (ضہ - سہ)} جب (۴۵° + ½ عہ)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِن مساواتوں سے لہ اور بہ اور نیز ع متعین کئے جا سکتے ہیں۔

اگر اس کا معکوس مسئلہ حل کرنا ہو یعنی اگر صعود مستقیم اور میل معلوم کرنا ہو جبکہ طول بلد اور عرض بلد دئے گئے ہوں تو (۱) کے استحالہ سے حاصل ہوتا ہے

$$\left.\begin{aligned} \text{جب ضہ} &= \text{جم سہ جب بہ} + \text{جب سہ جم بہ جب لہ} \\ \text{جم ضہ جب عہ} &= \text{جب سہ جب بہ} + \text{جم سہ جم بہ جب لہ} \\ \text{جم ضہ جم عہ} &= \text{جم بہ جم لہ} \end{aligned}\right\} \ldots (۲)$$

مثال ۱ — ثابت کرو کہ طریق الشمس کے شطب کا صعود مستقیم اور میل علی الترتیب ۲۷۰° اور ۹۰°۔ سہ ہیں اور یہ کہ ضدِ شطب کا صعود مستقیم اور میل ۹۰° اور سہ۔ ۹۰° ہیں۔

مثال ۲ — اگر طریق الشمس کے اُس نقطہ کا صعود مستقیم اور میل عہ، ضہ ہوں جس کا طول بلد لہ ہے تو ثابت کرو کہ

$$\text{جم لہ} = \text{جم عہ جم ضہ}$$
$$\text{جب لہ جب سہ} = \text{جب ضہ}$$
$$\text{جب لہ جم سہ} = \text{جب عہ جم ضہ}$$

مثال ۳ — اگر دو ستاروں کے صعود مستقیم اور میل علی الترتیب عہ۱، ضہ۱ اور عہ۲، ضہ۲ ہوں اور اِن کا طول بلد ایک ہی ہو تو ثابت کرو کہ

$$\text{جب}(\text{عہ}_۲ - \text{عہ}_۱) = \text{مس ضہ}_۱ \text{جم عہ}_۲ - \text{مس ضہ}_۲ \text{جم عہ}_۱)$$

مثال ۴ — جبار (عہ) (a Orionis) کا صعود مستقیم ۵گ ۹م ۴۹ اور اس کا میل + ۷° ۲۳′ ہے اور طریق الشمس کا میلان ۲۳° ۲۷′ ہے۔ ثابت کرو کہ اِس ستارہ کا طول بلد اور عرض بلد علی الترتیب ۸۷° ۱۰′ اور − ۱۶° ۲′ ہیں

مثال ۵ — اگر عہ = ۶° ۳۳′ ۲۹″، ضہ = − ۱۶° ۲۲′ ۳۵″ اور سہ = ۲۳° ۲۷′ ۳۲″ تو ثابت کرو کہ

$$\text{لہ} = ۳۵۹° ۱۷′ ۴۴″، \quad \text{بہ} = - ۱۷° ۳۵′ ۳۷″$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۱۰۹)

پانچویں باب پر مختلف مثالیں

مثال ۱ - ثابت کرو کہ زمین کے شمالی قطب پر رہنے والے مشاہد کے لیے کسی ستارہ کا ارتفاع اس کا میل ہوگا اور وہ یومی حرکت سے غیر متغیر رہے گا۔ نیز اسی صورت میں ثابت کرو کہ کسی ستارہ کا السمت (جو کسی ثابت نصف النہار سے ناپا گیا ہو) اس کے صعود مستقیم سے صرف بقدر ایک قوس کے فرق رکھے گا جو کسی دئے ہوئے لمحہ پر سب ستاروں کے لیے وہی ہوگی۔

مثال ۲ - صعود مستقیم عہ اور میل ضہ کے ایک ستارہ کا عرض بلد بہ چھوٹا ہے۔ ثابت کرو کہ سورج کا طول بلد جبکہ اس کا صعود مستقیم عہ ہو ستارہ کے طول بلد سے بقدر بہ جب ضہ مم عہ (تقریباً) کے فرق رکھتا ہے۔

مثال ۳ - ثابت کرو کہ منطقہ باردہ شمالی یا منطقہ باردہ جنوبی کے اندر کسی مقام کے لیے افق اور طریق الشمس کے نقاط تقاطع ایک کو کبھی یوم میں افق کے گرد پوری گردش کرتے ہیں لیکن کسی دوسرے مقام کے لیے یہ نقطے مشرق اور مغرب کے نقطوں کے گرد اہتزاز کرتے ہیں۔

مثال ۴ - مشرق کے نقطہ کو م سے، قطب کو ق سے اور دو ستاروں کے مقامات کو ا اور ب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ق ا م ب سے ا پر ملتا ہے اور ق ب، م ا سے ب پر ملتا ہے۔ ا ب، ا ب کے میل علی الترتیب ضہ، ضہ، ضہ، ضہ ہیں۔ ثابت کرو کہ

$$\text{مس ضہ}_2 \text{ مس ضہ}_4 = \text{مس ضہ}_1 \text{ مس ضہ}_3$$

فرض کرو کہ م ا اور م ب، نصف النہار کو قطب سے علی الترتیب فاصلوں ل، مہ پر قطع کرتے ہیں۔ اب چونکہ م، نصف النہار کا قطب ہے

اسلیے مس ل / مس مہ = مس ضہ$_1$ / مس ضہ$_3$ اور مس مہ / مس ل = مس ضہ$_4$ / مس ضہ$_2$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۵ — اگر مقام پ پر ایک ستارہ کا راسی فاصلہ ی ہو تو اُسی آن ایک دوسرے مقام پَ پر جو پ سے چھوٹے فاصلہ ف پر واقع ہے اِس ستارہ کا راسی فاصلہ یَ ہوگا جہاں

$$\text{یَ} = \text{ی} - \text{ف جم طہ} + \frac{1}{2}\text{ف}^2 \text{جب}^2 \text{آ م ی جب}^2 \text{طہ}$$

جس میں طہ وہ فرق ہے جو ستارہ اور پَ کے السمتوں کے درمیان ہے جبکہ انہیں پ سے دیکھا جاتا ہے۔

ہم فرض کرتے ہیں کہ یَ۔ ی اور ف دونوں قوس میں بیان کئے گئے ہیں، اِس لیے نیم قطری زاویوں میں اِن کے ناپ علی الترتیب (یَ۔ ی) × جب آ اور ف جب آ ہیں۔ پس

$$\text{جم یَ} = \text{جم ی جم ف} + \text{جب ی جب ف جم طہ}$$

$$= \text{جم ی}\left(1 - \frac{1}{2}\text{ف}^2 \text{جب}^2 \text{آ}\right) + \text{ف جب آ جب ی جم طہ}$$

لیکن

$$\text{جم یَ} = \text{جم}(\text{یَ} - \text{ی})\,\text{جم ی} - \text{جب}(\text{یَ} - \text{ی})\,\text{جب ی}$$

$$= \text{جم ی}\left\{1 - \frac{1}{2}(\text{یَ} - \text{ی})^2 \text{جب}^2 \text{آ}\right\} - (\text{یَ} - \text{ی})\,\text{جب آ جب ی}$$

جم یَ کی اِن دو قیمتوں کو مساوی رکھنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{یَ} - \text{ی} = -\text{ف جم طہ} + \frac{1}{2}\text{ف}^2 \text{جب آ م ی} - \frac{1}{2}(\text{یَ} - \text{ی})^2 \text{جب آ م ی}$$

پہلے تقرب کے طور پر یَ۔ ی = − ف جم طہ حاصل ہوتا ہے اور آخری رقم میں اِس کو درج کرنے سے مطلوبہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔

مثال ۶ — فرض کرو کہ افق پر کے ایک نقطہ کا السمت، میل، اور اختلاف منظری زاویہ علی الترتیب آ، ضہ، عا ہیں۔ ثابت کرو کہ دے ہوئے عرض بلد فہ کے لیے یہ مقداریں حسب ذیل ضابطوں کے ذریعہ کسی ساعتی زاویہ (۱۱۰)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

س کے لیے محسوب کی جا سکتی ہیں :—

مس ضہَ = − مم فہ جم س ، جب اَ = − جب س جم ضہَ ، جم اَ = + قط فہ جب ضہَ

مس اَ = + جب فہ مس س ، جم عَا = + جب فہ قط ضہَ ، جب عَا = + جب س جم فہ

مثال ۷ — اگر ایک ستارہ کا میل اور ساعتی زاویہ علی الترتیب ضہَ س ہوں تو حسب ذیل ضابطے حاصل کرو جن سے اس کا السمت ا اور راسی فاصلہ ی آسانی سے معلوم ہو سکیں جبکہ عرض بلد فہ کے لیے اَ ، ضہَ ، عَا (حسب تعریف مندرجۂ مثال ماسبق) کی قیمتیں ساعتی زاویہ س کے جواب میں معلوم ہوں ۔

جم ی = جب (ضہَ − ضہ) جم عَا ،

جب (اَ − ا) جب ی = جب (ضہَ − ضہ) جب عَا ،

جم (اَ − ا) جب ی = جم (ضہَ − ضہ)

مثال ۸ — پچھلی مثال پر مستعمل مقداروں کو لیکر ثابت کرو کہ ستارہ کا اختلاف منظری زاویہ عا معلوم کرنے کے لیے حسب ذیل مساواتیں ملتی ہیں ۔

جب عا = جب (ا − اَ) قم (ضہَ − ضہ) ،

جم عا = مم عا م (ضہَ − ضہ)

مثال ۹ — امثلہ ۶ اور ۷ کے ضابطوں کی مثال کے طور پر سماک رامح کا راسی فاصلہ اور السمت ساعتی زاویہ ۲ گ ۳۵ م پر معلوم کرو جبکہ یہ دیا گیا ہو کہ میل + ۱۹° ۴۴′ اور عرض بلد ۵۲° ۱۳′ ہے ۔

مثال ۱۰ — بتاؤ کہ قطبی ستارہ کے ارتفاع ا کا مشاہدہ کرنے سے جس کا ساعتی زاویہ مشاہدہ کے وقت س اور قطبی فاصلہ ق ہے عرض بلد فہ کو متعین کیا جا سکتا ہے اور یہ کہ عرض بلد معلوم کرنے کا ضابطہ تقریبی طور پر حسب ذیل ہے

$$\text{فہ} = \text{ا} - \text{ق جم س} + \frac{1}{2} \text{جب}^2 \text{ق جب}^2 \text{س مس ا}$$

مثال ۱۱ — بتاؤ کہ ایک ستارہ کے ساعتی زاویہ س یا راسی فاصلہ ی کو جبکہ وہ مشرقی سمت یا مغربی سمت پر ہو مساواتوں

جب ضہ = جب فہ جم ی ، جب س جم ضہ = = جب ی ، جم س جم ضہ = جم فہ جم ی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

سے معلوم کر سکتے ہیں۔ پہلی صورت میں اوپر کی علامت اور دوسری صورت میں نیچے کی علامت استعمال کی جائے۔

مثال ۱۲ کسی ستارہ کے راسی فاصلہ ی کا پہلا اور دوسرا تفرقی سر بلحاظ ساعتی زاویہ س معلوم کرو۔

ہم اس کی تحقیق اساسی ضابطوں سے یا ہندسی طور پر حسب ذیل کر سکتے ہیں (شکل ۳۶)۔ فرض کرو کہ قطب شمالی ش، راس ر اور ستارہ پ ہے۔ وقت فرس میں ستارہ ھ تک حرکت کر چکا ہوگا جہاں پ ھ، ش پ اور ش ھ پر عمود ہے۔ اگر پ ق، ر ھ پر عمود ہو تو

فری = ھ ق = ھ پ جب عا = جم ضہ جب عا فرس = جم فہ جب ا فرس

نیز

فرا = پ ق قم ی = پ ھ جم عا قم ی = جم ضہ جم عا قم ی فرس

$$\frac{\text{فرا}}{\text{فرس}} = \text{جم ضہ جم عا قم ی}$$



شکل (۳۶)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۱۱۱) دوسرا تفرق سر معلوم کرنے کے لیے ہم $\frac{\text{فری}}{\text{فرس}}$ کو جو اوپر حاصل ہو چکا ہے س کے لحاظ سے تفرق کرتے ہیں اور یہ فرض کرتے ہیں کہ ا اور س دونوں نیم قطری زاویوں میں بیان ہوئے ہیں۔ اس طرح

$$\frac{\text{فر}^2\text{ی}}{\text{فرس}^2} = -\text{جم فہ جم ا} \frac{\text{فرا}}{\text{فرس}}$$

$$= -\text{جم فہ جم ا جم ضہ جم عاقمی}$$

مثال ۱۳ — اگر ایک ستارہ کا میل، عرض بلد سے بڑا ہو تو ثابت کرو کہ راسی فاصلہ میں یومی حرکت کی باعث جو تبدیلی ہوتی ہے اس کی تیز ترین شرح، میل کی جیب التمام کے مساوی ہے۔ اگر میل عرض بلد سے کم ہو تو ثابت کرو کہ راسی فاصلہ میں تبدیلی کی تیز ترین شرح عرض بلد کی جیب التمام کے مساوی ہے

مثال ۱۴ — اگر ایک جرم کا راسی فاصلہ ساعتی زاویہ س پر ی ہو اور اس کا راسی فاصلہ ساعتی زاویہ س پر ی ہو جہاں س، س سے بہت قریب ہے تو مثال ۱۲ سے ثابت کرو کہ

$$\text{ی} - \text{ی} = -۱۵(\text{س} - \text{س}) \text{جم فہ جب ا} - \frac{۱}{۲} \times ۲۲۵ \text{ جب}^2 (\text{س} - \text{س}) \text{جم فہ جم ا جم ضہ جم عاقمی}$$

جس میں راسی فاصلے قوس میں اور ساعتی زاوئے وقت میں بیان کئے گئے ہیں۔

مثال ۱۵ — متواتر ساعتی زاویوں س۱، س۲، ... س ن پر جو بہت قریب قریب ہیں ایک ہی ستارہ کے راسی فاصلوں ی۱، ی۲، ... ی ن کا ایک سلسلہ حاصل کیا گیا ہے۔ فرض کرو کہ راسی فاصلوں اور ساعتی زاویوں کے حسابی اوسط ی، س ہیں۔ ثابت کرو کہ س کے جواب میں ی کی قیمت ی اس طور پر حاصل ہوتی ہے کہ ی پر تصحیح

$$+ \frac{۱}{۲ن} ۲۲۵ \text{ جب}^2 \text{جم فہ جم ا جم ضہ جم عاقمی} \Sigma_{۱}^{ن} (\text{س}_ر - \text{س})^2$$

عمل میں لائی جائے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۱۱۲) رکھو ا = جم فہ جب ا، ب = $\frac{1}{2}$ ۲۲۵ × جب أجم فہ جم اجم ضہ جم عاقمی

تو آخری مساوات (مثال ۱۲) سے حاصل ہوتا ہے

$$ی_۱ = ی_۰ + ا (س_۱ - س_۰) + ب (س_۱ - س_۰)^۲ ،$$

$$ی_۲ = ی_۰ + ا (س_۲ - س_۰) + ب (س_۲ - س_۰)^۲ ،$$

. . . . . .

. . . . . .

$$ی_ن = ی_۰ + ا (س_ن - س_۰) + ب (س_ن - س_۰)^۲$$

جمع کرنے اور ن سے تقسیم کرنے پر

$$ی_۰ = ی_۰ + \frac{۱}{ن} ب \sum_{۱}^{ن} (س_ن - س_۰)^۲$$

جس سے مسئلہ ثابت ہے۔

یہ ضابطہ اُس وقت مفید ہوتا ہے جبکہ راسی فاصلوں کے ایک سلسلہ سے جو بہت جلد جلد متواتر مشاہدہ کئے گئے ہوں بہترین نتیجہ حاصل کرنا مقصود ہو۔

مثال ۱۶ — اگر میل ضہ کے ایک ستارہ کا ساعتی زاویہ س ہو جبکہ اس کا السمت ا ہے اور سَ ہو جبکہ اس کا السمت ۱۸۰° ا ہے تو ثابت کرو کہ عرض بلد فہ مساوات

$$\text{مس فہ} = \text{مس ضہ} \frac{\text{جم } \frac{۱}{۲} (سَ + س)}{\text{جم } \frac{۱}{۲} (سَ - س)}$$

سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔

مثال ۱۷ — شمالی عرض بلد ۴۵° میں ایک حائط قطبی ستارہ کا بڑے بڑا السمت افق کے شمالی نقطہ سے ۴۵° حاصل ہوتا ہے۔ ثابت کرو کہ اس ستارہ کا قطبی فاصلہ ۳۰° ہے۔

[Math. Trip.]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۱۸ — بتاؤ کہ مقامی کوکبی وقت کا مشاہدہ کرنے سے جبکہ دو معلومہ ستاروں کا السمت ایک ہی ہو عرض بلد کس طرح معلوم کیا جا سکتا ہے۔

وہ ساعتی زاویے س، سَ جن پر ان دو ستاروں کا السمت ا ہے معلوم ہیں اور (صفحہ ۴)

مم ا جب س = - جم فہ مس ضہ + جب فہ جم س،

مم ا جب سَ = - جم فہ مس ضہَ + جب فہ جم سَ

پس ا ساقط کرنے پر

$$\text{مس فہ} = \frac{\text{مس ضہ جب سَ} - \text{مس ضہَ جب س}}{\text{جب (سَ - س)}}$$

مثال ۱۹ — سورج کے دو ارتفاع بہ اور بہ + مف بہ ایکساں دو قریب کے مقامات سے جو ایک ہی نصف النہار پر ہیں اُس وقت مشاہدہ کئے گئے جبکہ سورج کا میل ضہ ہے۔ اگر ان میں سے ایک مقام کا عرض بلد فہ ہو تو ثابت کرو کہ ان کے عرض بلدوں کا فرق تقریباً

مف بہ جم بہ جم فہ \ {جب ضہ - جب بہ جب فہ}

ہے۔ [Coll. Exam.]

مثال ۲۰ — ثابت کرو کہ اگر اول السمت میں سورج کا ارتفاع عہ ہو، اس کا طول بلد ل اور طریق الشمس کا میلان سہ تو مقام کا عرض بلد حسب ذیل ہوگا

جب' (جب سہ جب ل \ جب عہ)

مثال ۲۱ — عرض بلد فہ کس طرح ٹھیک طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے اگر معلومہ میل ضہ کے ایک جرم کا راسی فاصلہ اُس وقت مشاہدہ کیا جائے جبکہ وہ نصف النہار سے قریب ہو۔ فہ کی ایک تقریبی قیمت فہ، = ی + ضہ مان لی گئی ہے۔

اساسی ضابطہ جم ی = جب فہ جب ضہ + جم فہ جم ضہ جم س (۱۱۳)

= جم (فہ - ضہ) - ۲ جب² ½ س جم فہ جم ضہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{جب}\frac{1}{2}(\text{ی}+\text{ضہ}-\text{فہ})\,\text{جب}\frac{1}{2}(\text{ی}-\text{ضہ}+\text{فہ})=\text{جم ضہ جم فہ جب}^2\frac{1}{2}\text{س}$$

جس میں ساعتی زاویہ س، مقامی کوکبی وقت اور جرم کے صعود مستقیم سے معلوم ہوسکتا ہے۔ اگر ہم لا = ی + ضہ - فہ رکھیں تو

$$\text{جب}\frac{1}{2}\text{لا}=\frac{\text{جم ضہ جم فہ}}{\text{جب}(\text{فہ}-\text{ضہ}+\frac{1}{2}\text{لا})}\,\text{جب}^2\frac{1}{2}\text{س}$$

لیکن جرم چونکہ نصف النہار کے قریب ہے اس لیے لا چھوٹا ہے، اس لیے تقریبی طور پر حاصل ہوتا ہے (دفعہ ۳ مثال ۳)

$$\text{لا}=\frac{2\,\text{جم ضہ جم فہ}}{\text{جب}(\text{فہ}-\text{ضہ})}\,\text{جب}^2\frac{1}{2}\text{س}\,\frac{\text{جب}(\text{فہ}-\text{ضہ})}{\text{جب}(\text{فہ}-\text{ضہ}+\frac{1}{2}\text{لا})}\,(\text{قط}\frac{1}{2}\text{لا})^{\frac{1}{2}}$$

$$\text{یا ضا}=\frac{2\,\text{جم ضہ جم فہ}}{\text{جب}(\text{فہ}-\text{ضہ})}\,\text{جب}^2\frac{1}{2}\text{س}$$ رکھنے اور یہ دیکھنے سے کہ ضا، لا سے بہت قریب ہے ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$\text{لا}=\text{ضا}\,\frac{\text{جب}(\text{فہ}-\text{ضہ})}{\text{جب}(\text{فہ}-\text{ضہ}+\frac{1}{2}\text{ضا})}\,(\text{قط}\frac{1}{2}\text{ضا})^{\frac{1}{2}}$$

جس سے فہ = ی + ضہ - لا معلوم ہو جاتا ہے۔

مثال ۲۲ — اگر سورج کا سمتی نیم قطر ر ہو، اس کے اصلی طول بلد اور عرض بلد لہ، بہ ہوں، طریق الشمس کا میلان سہ ہو، لا وہ محدد ہو جو زمین کے مرکز سے اصلی اعتدال سرطانی تک کھینچے ہوئے خط پر ناپا گیا ہے، ما وہ محدد ہو جس کی اس خط پر پیمائش کی گئی ہے جو خط استواء کے مستوی میں لا پر عمود ہے اور سرطان کے پہلے نقطہ کی جانب ہے یعنی اس نقطہ کی جانب جس کا صعود مستقیم ۶ گھ ہے، اور بالآخر ے وہ محدد ہو جو خط استواء پر عمود ہے اور قطب شمالی کی جانب ہے تو ثابت کرو کہ (بحری جنتری ۱۹۰۶ء صفحہ ۶۱۸)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

لا = ر جم لہ ،
ما = ر جب لہ جم سہ ـ ۱۹۲۷۳ ر ب ،
مے = ر جب لہ جب سہ + ۴۴۷۵ ر ب

جہاں سورج کا اوسط فاصلہ طول کی اکائی ہے اور عددی سر اعشاریہ کے ساتویں مقام کی اکائیوں میں ہیں ۔

استحالہ کے عام ضابطوں کی رو سے

جب ضہ = جب ب جم سہ + جم ب جب سہ جب لہ ،
جم ضہ جم عہ = جم ب جم لہ ،
جم ضہ جب عہ = ـ جب ب جب سہ + جم سہ جم ب جب لہ

اس لیے لا = ر جم ب جم لہ
ما = ـ ر جب ب جب سہ + ر جم ب جم سہ جب لہ ،
مے = ر جب ب جم سہ + ر جم ب جب سہ جب لہ

سورج کی صورت میں ب بہت چھوٹا ہوتا ہے اور جب ب = ب جب ا ، (۱۱۴)
جب سہ = ۳۹۸۰ ر ، اور جم سہ = ۹۱۷۴ ر رکھنے سے ہمیں مطلوبہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے ۔ سال بھر کے ہر دن کے لیے لا ، ما ، مے کی جدولیں ایفیمرس میں دی ہوئی ہوتی ہیں ۔

مثال ۲۳ ـ یہ مان کر کہ کہکشاں ، ستاروں کا ایک بڑا دائرہ ہے جو خط استواء کو صعود مستقیم ۱۸ گ ۳۰ م میں قطع کرتا ہے اور اس کے ساتھ زاویہ ۶۵° (شمالی جانب پیمائش کردہ) بناتا ہے ، کہکشاں کے قطب کا صعود مستقیم اور میل معلوم کرو ۔

مثال ۲۴ ـ ایک سیارہ کا شمس مرکزی مدار طریق الشمس سے چھوٹے زاویہ خ پر مائل ہے ۔ ثابت کرو کہ اگر اس کا میل اعظم ہو تو یا تو اس کی عرض بلد میں حرکت صفر ہوتی ہے یا اس کا طول بلد تقریباً ۹۰° + خ ہم سہ جب عہ ہے جہاں عہ ، صعودی عقدہ کا طول بلد ہے ۔

چونکہ میل اعظم ہے اس لیے سیارہ س ، خط استواء کے ساتھ اس کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مدار کے نقطہ تقاطع ن سے ۹۰° پر ہونا چاہئے۔ طریق الشمس پر ن س کا ظل بھی تقریباً ۹۰° ہوگا۔ فرض کرو کہ ن سے طریق الشمس ۷ قہ پر عمود ن ت ہے جہاں ۷ اعتدال سرما ہے اور قہ صعودی عقدہ۔

چھوٹے مثلث ن ت ۷ میں مس ن ت = جب ۷ ت مس سہ

اور مثلث ن ت قہ میں مس ن ت = جب (عہ - ۷ ت) مس خ

اس لیے جب ۷ ت = مس خ جب (عہ - ۷ ت) مم سہ

اور اس لیے ۷ ت = خ مم سہ جب عہ تقریباً

اس لیے سیارہ کا طول بلد بالعموم ۹۰° + خ مم سہ جب عہ ہے۔



شکل (۳۷)

مثال ۲۵ ۔ ثابت کرو کہ قطب اسد اور چاند کے درمیان اصلی فاصلہ بوقت ۴ بجے شام گرینوچ اوسط وقت بتاریخ ۶ جنوری ۱۹۰۹ء ۱۴۱° ۵۹′ ۳۱″ ہے۔ یہ دیا گیا ہے کہ

	صعود مستقیم			میل		
چاند	گ ۱۲	۹	۵۶٫۹ ث	۲۴°	۱۵′	۴۰″ ش
ستارہ	۱۰	۳	۳۱٫۶	۱۲	۲۴	۴۵ ش

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۱۱۵) **مثال ۲۶** — ثابت کرو کہ ایک ستارہ کے لیے جو مشرق کے شمال کی طرف طلوع ہوتا ہے جس شرح سے السمت بدلتا ہے وہ شرح وہی رہتی ہے جبکہ وہ طلوع ہوتا ہے اور جبکہ وہ مشرقی سمت میں ہوتا ہے۔ نیز ثابت کرو کہ یہ شرح اقل ہوتی ہے جبکہ السمت مشرق کے شمال کی طرف

$$\text{جب}^{-1}\left(\text{مس لہ جب}\ \frac{\text{عہ}}{\text{۲ ہا جم عہ}}\right)$$

ہو جہاں ستارہ کا عرض بلد لہ اور ارتفاع عہ ہے جبکہ وہ مشرقی سمت میں ہوتا ہے۔

[Math. Trip. 1902]

مثال ۲۷ — ثابت کرو کہ کسی معلومہ گرینوچ وقت پر دو معلومہ ستاروں کے ارتفاعوں کے مشاہدات مشاہد کا طول بلد اور عرض بلد معلوم کرنے کے لیے کافی ہیں۔ بتاؤ کہ کس طرح ترسیمی طریقہ سے ان مشاہدات کی بنا پر مشاہد کا محل کرۂ زمین پر معلوم کیا جا سکتا ہے۔

اگر مشاہدے کے لیے منتخبہ ستارے نصف النہار کی مخالف سمتوں میں ہوں تو ثابت کرو کہ ہر ستارہ کے مشاہدہ کردہ ارتفاع میں چھوٹی خطا صہ کی وجہ سے عرض بلد اور طول بلد میں خطائیں علی الترتیب حسب ذیل ہوں گی:۔

صہ قط (عہ۱ + عہ۲) جم (عہ۱ − عہ۲) اور صہ قط فہ قط (عہ۱ + عہ۲) جب (عہ۱ − عہ۲)

جہاں فہ، محسوبہ عرض بلد ہے اور ۲ عہ۱، ۲ عہ۲ ستاروں کے السمت ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۱۱۶)

چھٹا باب

کرۂ ہوائی کا انعطاف

دفعہ		صفحہ
۳۹	مناظری انعطاف کے قوانین	۱۷۷
۴۰	ہیئتی انعطاف	۱۸۱
۴۱	ہوائی انعطاف کا عام نظریہ	۱۸۳
۴۲	انعطاف کی محصلہ تفرقی مساوات کا تکمل	۱۸۶
۴۳	کرۂ ہوائی کے انعطاف کے لیے کیسینی کا ضابطہ	۱۹۰
۴۴	کرۂ ہوائی کے انعطاف کے لیے دیگر ضابطے	۱۹۴
۴۵	کرۂ ہوائی کے دباؤ اور تپش کا اثر انعطاف پر	۱۹۸
۴۶	مشاہدہ سے کرۂ ہوائی کے انعطاف کی تعیین	۱۹۹
۴۷	انعطاف کا اثر ساعتی زاوئے اور میل پر	۲۰۳
۴۸	انعطاف کا اثر دو قریبی سماوی نقطوں کے درمیان ظاہری فاصلہ پر	۲۰۵
۴۹	انعطاف کا اثر ایک دوہرے تارے کے زاویہ محل کی پیمائش پر	۲۱۰

۳۹ ۔ مناظری انعطاف کے قوانین۔

اگر روشنی کی شعاع او (شکل ۳۸) ایک شفاف متجانس واسطہ ہ ھ میں سے

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

حرکت کرتی ہوئی و پر آکر ایک دوسرے متجانس واسطہ ک ک میں داخل ہو تو اس شعاع کی سمت میں اچانک تبدیلی واقع ہوتی ہے اور شعاع اس نئے واسطہ کو سمت و وَ میں حرکت کرتی ہوئی عبور کرتی ہے۔ یہ تبدیلی انعطاف کے طور پر مشہور ہے۔ شعاع ا و کو موقوعہ شعاع اور شعاع و وَ کو منعطف شعاع کہتے ہیں۔ موقوعہ شعاع اور منعطف شعاع دونوں ایک ہی مستوی میں واقع ہوتی ہیں اور یہ مستوی واسطوں کی سطح فاصل کے نقطہ و پر کے عمود میں سے گذرتا ہے

فرض کرو کہ ان دو واسطوں کی سطح فاصل کے نقطہ و پر عمود مرون ہے تو زاویہ ن و ا = سا کو وقوع کا زاویہ کہتے ہیں اور مہ و وَ = فہ کو انعطاف کا زاویہ کہتے ہیں۔ انعطاف کا بنیادی کلیہ ضابطہ

جب سا = مہ جب فہ

سے بیان ہوتا ہے جہاں مہ ایک خاص مستقل ہے جو ان دو واسطوں کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے جن میں سے شعاع گذرتی ہے۔ اگر موقوعہ شعاع کی سمت میں کسی تبدیلی کے باعث زاویہ سا بدل جائے تو اس کے ساتھ زاویہ فہ کو بھی اس طرح بدلنا چاہیئے کہ ان دو زاویوں کی جیوب کی نسبت وہی رہے۔ مہ کو پہلے واسطہ سے دوسرے واسطہ میں جانے کا انعطاف نما کہتے ہیں۔ (۱۱۷)



شکل (۳۸)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِس امر کو خوب ذہن نشین کر لینا چاہیئے کہ مہ حسب صراحت بالا اُن دو واسطوں کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے جن میں سے شعاع گزرتی ہے اور نیز نور کی نوعیت پر بھی منحصر ہوتا ہے۔ مثلاً نیلے رنگ کی روشنی کی شعاع کے لیے مہ مختلف ہوگا اور سرخ رنگ کی روشنی کی شعاع کے لیے مختلف اگرچہ واسطے دونوں صورتوں میں وہی ہوں۔ ہمیں صرف کرۂ ہوائی کے انعطاف پر غور کرنا ہے اور اِس صورت میں انتشار (جیسا کہ یہ مظہر کہلاتا ہے) اسقدر بڑا نہیں ہوتا کہ عملی علم ہئیت کے مقاصد کے لیے اِس پر توجہ کرنا ضروری ہو جائے۔ اِس لیے ہم مہ کی ایک اوسط قیمت لیتے ہیں جو کافی طور پر صحیح ہوگی اگرچیکہ نور کی وہ شعاعیں جن سے ہمیں واسطہ رہے گا ترکیبی نوعیت کی ہوں۔ زمین کی سطح پر کرۂ ہوائی کا انعطاف نما ۰ مئی پیش اور ۷۶۰ ممر دباؤ پر ۲۹۴ ۰۰۰ء لیا جاتا ہے۔

اگر شعاع کی سمت الٹ دیجائے یعنی اگر شعاع وَ سے ابتدا کر کے واسطہ ک ک میں سے ہوتی ہوئی و تک جائے اور وہاں سے واسطہ ھ ھ میں داخل ہو تو شعاع واسطہ ھ ھ کو ٹھیک اُسی راستہ وا پر سے گذرتی ہوئی عبور کرے گی۔ یہ اُس عام خاصیت کی صرف ایک مخصوص صورت ہے کہ وہ منحنی یا شکستہ خط جس کو کوئی کرن مختلف واسطوں میں سے انعطافوں کے ایک سلسلہ کے زیر اثر اور کسی وقوعوں پر اختیار کرتی ہے اُس وقت بھی اختیار کرے گی جبکہ نور کی اشاعت کی سمت الٹ دیجائے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ک ک کی نچلی سطح اوپر کی سطح کے متوازی ہو تو شعاع، واسطہ ھ ھ کی ایک دوسری تہہ کے اندر وَ پر داخل ہو کر سمت وَا اختیار کرے گی جو وقوع کی سمت ا و کے متوازی ہوگی۔ پس ہمیں معلوم ہوا کہ نور کی شعاع جب متوازی رخوں والی ایک متجانس تختی میں سے گذرتی ہے تو تختی سے باہر نکل کر پھر اپنی سمت اختیار کر لیتی ہے اگرچیکہ وہ بلا شبہ ذرا بازو ہٹ جائے گی۔ ہمیں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

چونکہ صرف شعاعوں کی سمتوں سے واسطہ ہے اِس لیے اِس کا بازو ہٹ جانا قابلِ توجہ نہیں ہے۔

فرض کرو کہ شعاع واسطہ ھ سے ھ۱ میں جاتی ہے تو انعطاف نما مہ۱ ہے شکل (۳۹) اور ھ سے ھ۲ میں جاتی ہے تو انعطاف نما مہ۲ ہے۔ یہ معلوم کرنا مقصود ہے کہ شعاع واسطہ ھ۱ سے ھ۲ میں جائے تو انعطاف نما کیا ہوگا۔



شکل (۳۹)

شعاع ھ سے ھ۱ اور ھ۲ کی متوازی تختیوں میں سے ہوتی ہوئی ھ پر اپنی اصلی سمت کے متوازی سمت میں خارج ہوتی ہے، اور اگر وقوع کے متواتر زاوئے سا، فہ، طہ ہوں تو پہلے وقوع اور آخری خروج سے حسب ذیل مساواتیں ملتی ہیں:۔

جب سا = مہ۱ جب فہ اور جب سا = مہ۲ جب طہ

اس لیے مہ۱ جب فہ = مہ۲ جب طہ

اس طرح حسب ذیل نتیجہ حاصل ہوتا ہے:۔

اگر ایک معیاری واسطہ سے دوسرے واسطہ میں جانے کا انعطاف نما مہ۱ ہو اور معیاری واسطہ سے ایک اور واسطہ ھ۲ میں جانے کا انعطاف نما مہ۲ ہو اور اگر ھ۱ سے ھ۲ میں راست گذرنے والی ایک شعاع کا وقوع کا

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

زاویہ فہ ہو اور زاویہ انعطاف طہ ہو تو مہ جب فہ = مہ جب طہ اور ھ سے ھ میں راست گذرنے والی ایک شعاع کے لیے انعطاف نما مہ / مہ ہے۔

۴۰ ۔ ہیئتی انعطاف ۔

کسی جرم فلکی سے نور کی شعاعیں جب بیرونی فضاء سے ہوتی ہوئی زمین کے کرۂ ہوائی میں سے گذرتی ہیں تو وہ ہیئتی انعطاف (Astronomical refraction) سے متاثر ہوتی ہیں۔ کرۂ ہوائی کے اوپر کے طبقات میں ہوا کی کثافت اس قدر کم ہوتی ہے کہ مجموعی انعطاف میں ان کی وجہ سے بہت کم اضافہ ہوتا ہے۔ وہ انعطاف جس سے ہیئت داں کو خاص طور پر واسطہ رہتا ہے زمین کی سطح کے اوپر صرف چند میل کے اندر وقوع پذیر ہوتا ہے۔ انعطاف کی باعث کسی ستارہ سے نکلی ہوئی نور کی شعاع کرۂ ہوائی میں سے ایک خط مستقیم میں نہیں گذرتی۔ یہ ایک منحنی پر چلتی ہے اور اس لیے جب اس کی شعاعیں مشاہد تک پہنچتی ہیں تو ستارہ اسے ایسی سمت میں دکھائی دیتا ہے جو اس کی اصلی سمت نہیں ہوتی۔



شکل (۴۰)

دور کے کسی ستارے سے ہماری جانب سمت س ا (شکل ۴۰) میں آنے والی نور کی شعاع سیدھی راہ پر چلتی ہے یہاں تک کہ وہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ا پر موثر کرۂ ہوائی میں داخل ہو اور پھر یہاں سے اس کی راہ سیدھی نہیں رہتی۔ ا سے مشاہد کے مقام و تک یہ شعاع کرۂ ہوائی کی ایسی تہوں میں سے گذرتی ہے جن کی کثافت مسلسل بڑھتی ہے اور اس لیے شعاع مقام و تک پہنچنے میں زیادہ اور زیادہ تر منحنی ہوتی جاتی ہے۔ مشاہد کو معلوم ہوتا ہے کہ شعاعیں ت سے آرہی ہیں جہاں وت، و پر منحنی کا مماس ہے۔ اگر و میں سے خط وک، اس کے متوازی کھینچا جائے تو اس خط سے وہ سمت معلوم ہوگی جس میں ستارہ نظر آتا اگر کوئی انعطافی خلل واقع نہ ہوتا۔ پس کسی جرم سماوی پر انعطاف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کا ظاہری مقام بقدر زاویہ ت وک کے مشاہد کے راس سر کی جانب اوپر حرکت کرتا ہے۔

انعطاف بڑے سے بڑا افق پر ہوتا ہے جہاں اس کی باعث اجرام فلکی تقریباً ۳۵′ اوپر اٹھے ہوئے نظر آتے ہیں۔

پس کسی جرم فلکی کے مشاہدہ کردہ محددوں میں بالعموم تصحیحات عمل میں لانی ہوں گی تاکہ ان تصحیحات کے بعد یہ معلوم ہو جائے کہ محدد کیا ہیں جبکہ انعطاف نہ ہو۔ اس لیے انعطاف کے اثرات کی تحقیق عملی علم ہیئت کا ایک اہم جزو ہے۔

ایک تقریبی جدول یہاں دیجاتی ہے جس سے یہ معلوم ہوگا کہ انعطاف ستاروں کے راسی فاصلوں کو کتنا گھٹاتا ہے۔ یہ فرض کرلیا گیا ہے کہ بارپیما کا ارتفاع ۳۰ انچ ہے اور تپش ۵۰° فارن ہائٹ ہے۔ دیکھو نیو کومب کی اسفریکل اسٹرانومی صفحہ ۴۳۳۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ظاہری راسی فاصلہ	انعطاف	ظاہری راسی فاصلہ	انعطاف	ظاہری راسی فاصلہ	انعطاف
۰°	۰″	۳۵°	۴۱″	۷۰°	۲′ ۳۹″
۵°	۵″	۴۰°	۴۹″	۷۵°	۳′ ۳۴″
۱۰°	۱۰″	۴۵°	۵۸″	۸۰°	۵′ ۱۹″
۱۵°	۱۶″	۵۰°	۱′ ۹″	۸۵°	۹′ ۵۱″
۲۰°	۲۱″	۵۵°	۱′ ۲۳″	۸۷°	۱۴′ ۲۳″
۲۵°	۲۷″	۶۰°	۱′ ۴۱″	۸۸°	۱۸′ ۱۶″
۳۰°	۳۴″	۶۵°	۲′ ۴″	۸۸° ۴۰′	۲۲′ ۲۳″

مثلاً ۵۰° کے راسی فاصلہ پر ہم دیکھتے ہیں کہ انعطاف ۱′ ۹″ ہے اور اسلیے صحیح راسی فاصلہ ۵۰° ۱′ ۹″ ہے۔ یہ امر مشاہدہ طلب ہے کہ کسی راسی فاصلہ کے لیے جو ۴۵° سے کم ہو انعطاف ۱′ کے برابر بھی نہیں ہے اور ۲۰° تک کے راسی فاصلوں کے لیے انعطاف عملاً ۱″ فی درجہ ہے۔

۴۱ — ہوائی انعطاف کا عام نظریہ —

ہم فرض کریں گے کہ زمین کروی ہے اور کرۂ ہوائی پتلی تہوں کے ایک سلسلہ سے ترکیب یافتہ ہے جو زمین کے ہم مرکز کروں سے محدود ہیں ہوا کا انعطاف نما ہر تہہ کے پورے جثہ میں مستقل ہونا چاہیئے لیکن ایک تہہ سے دوسری تہہ میں وہ متغیر ہو سکتا ہے۔

ایسی دو تہوں ا اور ب (شکل ۴۱) پر غور کرو۔ آزاد اثیر کے لحاظ سے بیرونی تہہ ا کا انعطاف نما مہ، اور تہہ ب کا انعطاف نما مہ ہے۔ ایک شعاع جو ا میں سے سمت پ ق میں گذرتی ہوئی ب کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ، سمت ق ر میں مڑ جاتی ہے

فرض کرو کہ زمین کا مرکز ج ہے اور

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



شکل (۴۱)

سا = ∠ س ق پ، فہ۱ = ∠ ق پ ج، فہ۲ = ∠ ر ق ج،

ج پ = ر۱، ج ق = ر۲

اب چونکہ ج ق، سطح فاصل پر عمود ہے اِس لیے انعطاف کے اصولوں (دفعہ ۳۹) کی رو سے

مہ جب سا = مہ جب فہ۲

لیکن مثلث پ ج ق سے

جب سا : جب فہ۱ = ر۱ : ر۲

پس سا کو ساقط کرنے سے حاصل ہوتا ہے

ر۱ مہ جب فہ۱ = ر۲ مہ جب فہ۲

یہ کسی دو متصل تہوں کے لیے درست ہوگا اور اس لیے ہمیں حسب ذیل عام مسئلہ حاصل ہوتا ہے۔

فرض کرو کہ کرۂ ہوائی پتلی کروی متجانس تہوں کی ایک تعداد سے ترکیب

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

یافتہ سمجھا گیا ہے اور یہ تہیں زمین کے ہم مرکز ہیں اور ایک تہہ سے دوسری تہہ میں کثافت متغیر ہوتی ہے۔ جب کوئی شعاع متواتر تہوں کو عبور کرتی ہے تو انعطاف کے زاویہ کی جیب، تہہ کا نصف قطر اور اس کا انعطاف نما ان تینوں کا حاصل ضرب مستقل رہتا ہے۔

ہم اس مسئلہ کو حسب ذیل ضابطہ کی شکل میں بیان کر سکتے ہیں:۔

رمہ جب فہ = ا مہ جب ی ..... (۱)

جہاں ظاہری راسی فاصلہ ی ہے، زمین کا نصف قطر ا ہے اور سب سے نچلی تہہ کا انعطاف نما مہ ہے۔



شکل (۴۲)

اگر ہم یہ فرض کریں کہ تہیں لا انتہا پتلی ہیں تو شعاع کا راستہ ایک شکستہ خط ہونے کی بجائے ایک منحنی ہوگا۔ فرض کرو کہ یہ منحنی لا ت و (شکل ۴۲) ہے جبکہ شعاع ان متواتر تہوں میں سے گذرتی ہے اور زمین پر و پر پہنچتی ہے (۱۲۲) اس منحنی کے نقطہ ت پر مماس ت ق پ کھینچو جہاں ت وہ نقطہ ہے جس پر ایک شعاع ایک تہہ میں داخل ہوتی ہے جس کا انعطاف نما مہ ہے اور نصف قطر ر۔ یہ مماس شعاع کے ایک چھوٹے جزو کے ساتھ منطبق ہوتا ہے اور اس لیے زاویہ ج ت ق = فہ یعنے انعطاف کا زاویہ۔ جب شعاع کرۂ ہوائی کے طبقات میں اول داخل ہوتی ہے تو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

منحنی کا مماس ستارے کی اصلی سمت پر منطبق ہونا چاہیئے ۔ برخلاف اس کے وہ پر اس منحنی کا مماس وہ سمت ظاہر کرتا ہے جس میں شعاع مشاہد کی آنکھ میں داخل ہوتی ہے ۔ ان دو مماسوں کا درمیانی زاویہ شعاع کی سمت میں مجموعی تبدیلی کا اظہار کرتا ہے ۔ یہ وہ مقدار ہے جس کی تعیین ہم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اسی کو ہم بالعموم انعطاف کہتے ہیں ۔

اگر یہ انعطاف غہ ہو تو دو متصلہ مماسوں کا درمیانی زاویہ فرغہ ہے جو = فرطہ ۔ فرفہ اگر طہ = ∠ ا ج ت اور فہ = ∠ ج ت پ ۔ علم ہندسہ کی رو سے ہم دیکھتے ہیں کہ فرطہ = ۔ مس فہ فرر\ر ، اس لیے

فرغہ = ۔ مس فہ فرر\ر ۔ فرفہ

اب ہم اس مساوات کو مساوات (۱) کے ذریعہ مستحیل کر سکتے ہیں ۔ مساوات (۱) لکھی جا سکتی ہے

لوک ر + لوک مہ + لوک جب فہ = مستقل

اسے تفرق کرنے سے حاصل ہوتا ہے

فرر\ر + فرمہ\مہ + مم فہ فرفہ = ۰ ..... (۲)

اس لیے فرغہ = مس فہ فرمہ\مہ ..... (۳)

(۱) کی مدد سے مس فہ کو ساقط کیا جائے تو حاصل ہوتا ہے

$$\text{فرغہ} = \frac{1}{\text{مہ}} \frac{\text{ا مہ جب ی}}{\text{مہ (ر}^2 \text{ مہ}^2 - \text{ا}^2 \text{ مہ}^2 \text{ جب}^2 \text{ ی)}^{\frac{1}{2}}} \text{ فرمہ}$$

اس طرح ہمیں انعطاف کے لیے تفرقی مساوات مل جاتی ہے ۔

۴۲ ۔ انعطاف کی محصلہ تفرقی مساوات کا تکمل ۔

انعطاف کو صحیح طور پر معلوم کرنے کے لیے اس مساوات کو حدود مہ = مہ اور مہ = ا کے درمیان تکمل کرنا ہوگا جہاں مہ = ا وہ قیمت ہے جو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کرۂ ہوائی کی اوپر کی تہہ پر مہ کی ہے۔ اِس منزل پر انعطاف کے نظریہ میں جو مشکل ہے وہ خود پیش ہوتی ہے[1]۔ وہ جملہ جسے تکمل کرنا ہے دو متغیر ر اور مہ رکھتا ہے جن میں تعلق پیدا کرنا ضروری ہے۔ اگر اس تعلق کا قانون معلوم ہوتا تو ہم ر کو مہ کی رقوم میں بیان کر سکتے اور اس طرح مسئلہ صرف یہ رہ جاتا کہ مہ کے کسی خاص تفاعل کا تکمل کیا جائے۔ لیکن ہمیں اُس قانون کے متعلق ٹھیک معلومات حاصل نہیں ہیں جس کی بموجب انعطاف نما، زمین کی سطح کے اوپر ارتفاع کے ساتھ متغیر ہوتا ہے۔ تاہم یہ معلوم کرنا دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس مسئلہ کا ایک تقریبی حل حاصل کرنا ممکن ہے جو اکثر و بیشتر مقاصد کے لیے اُس قانون کے علم کے بغیر بالکل کافی ہے جس کے بموجب کرۂ ہوائی کی کثافت، زمین کی سطح کے اوپر ارتفاع کے ساتھ بدلتی ہے۔

(۱۲۳)

ہم مان لیتے ہیں کہ ر۱ = ۱ + س جہاں س ایک چھوٹی مقدار ہے کیونکہ کرۂ ہوائی کے بلند ترین حصہ کا ارتفاع بھی بمقابلہ زمین کے نصف قطر کے چھوٹا ہے۔ ہم ر۱ کی بجائے اس کی یہ قیمت فرغہ کے جملہ میں درج کریں گے اور س کی ایک سے اعلیٰ ترقوتوں کو نظر انداز کرینگے۔ اسطرح

$$\text{غہ} = \int \frac{\text{مہ جب ی فرمہ}}{\text{مہ}(\text{مہ}^2 - \text{مہ}^2 \text{جب}^2 \text{ی} + 2\text{س مہ})^{\frac{1}{2}}}$$

$$= \int \frac{\text{مہ جب ی فرمہ}}{\text{مہ}(\text{مہ}^2 - \text{مہ}^2 \text{جب}^2 \text{ی})^{\frac{1}{2}}} \left(1 + \frac{2\text{س مہ}^2}{\text{مہ}^2 - \text{مہ}^2 \text{جب}^2 \text{ی}}\right)^{-\frac{1}{2}}$$

[1] اِس مساوات کے تکمل کی عام بحث اس قدر دقیق ہے کہ اس کا اندراج یہاں نامناسب ہے۔ اِس کا مطالعہ پروفیسر نیو کومب کی (Comp. of sph. Astro.) اور پروفیسر کیمبل کی (Practical Astro) میں کیا جا سکتا ہے۔ بیسل کی دقیق اور جامع تحقیقات کا ذکر برنو کی (Sph. Astro.) میں ملیگا۔ میں پروفیسر ای۔ ٹی۔ وہٹیکر کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اُس نفیس تقریبی طریقہ کی طرف میری توجہ منعطف کی جو یہاں درج ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$= \int_{\text{مہ}} \frac{\text{مہ جب ی فرمہ}}{\text{مہ}(\text{مہ}^2 - \text{مہ}^2 \text{جب}^2 \text{ی})^{\frac{1}{2}}} - \int_{\text{مہ}} \frac{\text{س مہ مہ جب ی فرمہ}}{(\text{مہ}^2 - \text{مہ}^2 \text{جب}^2 \text{ی})^{\frac{3}{2}}}$$

پس انعطاف دو تکملوں سے بیان ہوتا ہے جن میں سے پہلا جو اہم ترین حصہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ انعطاف کیا ہوگا اگر س = ۰ یعنے اگر زمین کی سطح مستوی ہوتی۔ یہ صریحاً ایک مشہور ابتدائی تکملہ ہے اور اس کی قیمت ہے

$$\text{جب}^{-1} (\text{مہ جب ی}) - \text{ی}$$

اگر ہم چھوٹی مقدار (مہ - ۱) کو لا سے تعبیر کریں تو یہ تکملہ لکھا جا سکتا ہے

$$\text{جب}^{-1} \{(1 + \text{لا}) \text{جب ی}\} - \text{ی}$$

اور اگر اسے میکلارن کے مسئلہ سے لا کی قوتوں میں پھیلایا جائے تو اس کو محسوب کرنے میں آسانی ہوگی اگر ہم لا کی دو سے اعلیٰ تر قوتوں کو نظر انداز کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے تکملہ کی تقریبی قیمت

$$(\text{مہ} - 1) \text{مس ی} + \frac{1}{2} (\text{مہ} - 1)^2 \text{مس}^3 \text{ی}$$ ہے۔

دوسرے تکملہ کی قیمت معلوم کرنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ س، متکمل میں ایک جزو ضربی کے طور پر شریک ہوتا ہے اور اس لیے مہ = مہ = ۱ رکھنے سے کوئی قابل قدر خطا وقوع پذیر نہ ہوگی کیونکہ رتبہ س (مہ - ۱) کی مقداریں اس قدر چھوٹی ہیں کہ نظر انداز ہو سکتی ہیں۔ پس دوسرا تکملہ ذیل کی سادہ شکل اختیار کرتا ہے (۱۲۴)

$$- \int_{\text{مہ}} \frac{\text{جب ی}}{\text{جم}^3 \text{ی}} \text{س فرمہ}$$

فرض کرو کہ کرۂ ہوائی کے اس خول کی کثافت ث ہے جس کا انعطاف نما مہ ہے۔ تب گلاڈسٹون اور ڈیل کے کلیہ کی رو سے مہ اور ث شکل

$$\text{مہ} - 1 = \text{م ث}$$

کی ایک مساوات سے مربوط ہوں گے جہاں م ایک مستقل مقدار ہے۔ اسلیے

$$\text{فرمہ} = \text{م} \times \text{فرث}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اگر زمین کی سطح پر ہوا کی کثافت ث۔ ہو تو یہ تکملہ

$$-م \frac{جب ی}{جم^{۳} ی} \int_{ث}^{ث_{۰}} س\, فرث$$

ہو جاتا ہے تکمیل بالحصص سے یہ تکملہ

$$-م \frac{جب ی}{جم^{۳} ی} [س]_{ث}^{ث_{۰}} فرس$$

ہو جاتا ہے کیونکہ وہ رقمیں جو تکملہ کے مشاثر نہیں ہوتیں معدوم ہوتی ہیں۔ نیز ہم رکھتے ہیں س = س۔ جبکہ ث = ث۔، اور س = ۰ جبکہ ث = ث۔ اس جملہ کا تکملہ ایک قابل یاد داشت اہمیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ اس سے ہوا کی وہ کل کمیت تعبیر ہوتی ہے جو سطح زمین کے ایک اکائی رقبہ کے اوپر انتصاباً واقع ہے اور اس لیے کرہ ہوائی کے دباؤ کے متناسب ہے یعنی بارپیما کے ارتفاع کے متناسب۔ اس لیے اس اصلی قانون کی جس کی بموجب کرہ ہوائی کی کثافت ارتفاع کے ساتھ متغیر ہوتی ہے اب اس سوال میں ضرورت نہیں رہتی۔

اس طرح انعطاف کے نظری جملہ نے ایک بہت ہی سادہ شکل اختیار کرلی۔ یہ دو تکملوں کے درمیان فرق ہے جن میں سے پہلا معلوم کیا جا چکا ہے اور دوسرا

$$مس ی + مس^{۳} ی$$

کے متناسب ہونا چاہئے۔ اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ کل انعطاف شکل ا مس ی + ب مس^{۳} ی کا ہونا چاہئے جہاں ی ظاہری راسی فاصلہ ہے اور ا، ب مستقل مقداریں ہیں۔ ان مستقلوں کی قیمتیں مشاہدے سے متعین کرنی ہوں گی جیسا کہ دفعہ ۴۶ میں ظاہر کیا جا چکا ہے۔

ر اور مہ کے درمیان تعلق کی نسبت ہم مختلف مفروضات بھی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مان سکتے ہیں اور اِن کی بموجب محسوبہ نتیجوں کا مقابلہ اُن نتیجوں کے ساتھ کر سکتے ہیں جو راست مُشاہدے سے حاصل ہوئے ہوں۔ یہ امر قابلِ (۱۲۵) غور ہے کہ ر اور مہ کے درمیان متعدد مختلف رشتے ایسے ہیں کہ ہر ایک سے انعطاف کا ایک نظریہ ملتا ہے اور اِس کی بموجب محسوبہ نتیجے مشاہدے سے حاصل کئے ہوئے نتیجوں کے ساتھ کافی طور پر مطابق ہوتے ہیں۔

۴۳۔ کرۂ ہوائی کے انعطاف کے لیے کیسینی کا ضابطہ

کیسینی کے مفروضہ سے جس میں کرۂ ہوائی کو متجانس فرض کیا جاتا ہے انعطاف کے لیے ایک جملہ حاصل کیا جا سکتا ہے جو عملاً اُس جملہ کے مماثل ہے جو ابھی ہم نے معلوم کیا ہے۔ بلاشبہ یہ مفروضہ غیر صحیح ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اگر زمین کی سطح منحنی ہونے کی بجائے مستوی ہوتی تو کرۂ ہوائی کی متواتر تہیں متوازی رُخ والی ہوتیں اور اِس لیے سب سے نچلی تہہ کے انعطاف تما سے ہی کُل انعطاف کی تعیین ہو جاتی (دفعہ ۳۹)۔ پس صرف زمین کا انحناء ہی ہے جو کیسینی کے نظریہ سے حاصل ہونے والے ضابطہ کو بالکل درست ہونے میں حارج ہے۔

یہ باور کرنے کے عمدہ وجوہ موجود ہیں کہ بیس میل کے ارتفاع پر کرۂ ہوائی کی کثافت، زمین کی سطح پر اس کی کثافت کے تیسویں حصہ سے بھی کم ہے۔ اس لیے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ تقریباً سارا انعطاف زمین کی سطح کے اوپر بیس میل کے اندر پیدا ہوتا ہے۔

فرض کرو کہ مُشاہد کا مقام و (شکل ۴۳) ہے اور و ھ ایک شعاع ہے جو و پر افقی سمت میں پہنچتی ہے، ایسی کسی شعاع پر بلاشبہ کسی دوسری شعاع کی بہ نسبت انعطاف کا زیادہ اثر ہوگا۔

فرض کرو کہ زمین کا نصف قطر ا ہے اور کرۂ ہوائی کے اُس خول کا نصف قطر ا + ل ہے جس پر شعاع نقطہ ھ پر آکر پڑتی ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



شکل (۴۳)

اگر و اور ھ پر خولوں کے مماسوں کا درمیانی زاویہ ط ہو اور اگر ھ و کو ایک خط مستقیم تسلیم کیا جائے تو

$$\text{جب}^2 \text{ط} = 1 - \text{ا}^2 \backslash (\text{ا} + \text{ل})^2$$

$$= 2\text{ل} \backslash \text{ا} = 0.040 \backslash 0.040$$

$$= 1 \backslash 100$$

اس لیے ط تقریباً ۶° ہے۔

اس طرح مختلف کثافتوں کی ہوا کی موثر تہیں جن میں سے شعاعوں کو گذرنا ہوگا اس قدر تقریباً متوازی ہیں کہ ان میں سے کسی کو بھی ٹھیک طور پر متوازی بنانے کے لیے ۶° سے بڑے زاویہ میں سے گھمانا نہ پڑے گا۔ اس لیے ہم حقیقت سے زیادہ دور نہ ہوں گے اگر یہ مان لیں کہ کرۂ ہوائی افقی تہوں پر مشتمل ہے۔ ایسی صورت میں کرۂ ہوائی کے غیر متجانس ہونے سے کل انعطاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔



شکل (۴۴)

راسی فاصلہ کو انعطاف کے ساتھ مربوط کرنے والا ضابطہ مفروضہ متجانس کرۂ ہوائی کی صورت میں کیسینی نے حاصل کیا ہے جو حسب ذیل ہے۔

ہم مان لینگے کہ کرۂ ہوائی کو اُس فضاء میں مکثف کر دیا گیا ہے جو نصف قطر ج س اور ج ط کے دو کروی خولوں کے درمیان ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کرۂ ہوائی کی کثافت کو یکساں اور اس کے انعطاف نما کو مہ فرض کیا جاتا ہے۔

شعاع ل ا، کرۂ ہوائی کی سطح کے نقطہ ا پر پڑتی ہے جس پر اس سطح کا عماد ج ا ھ ہے اور یہ شعاع زمین کی سطح کے نقطہ س پر مشاہد تک پہنچتی ہے، پس زاویہ ل ا ھ = سا وقوع کا زاویہ ہے اور زاویہ س ا ج = فہ انعطاف کا زاویہ ہے۔

شعاع سمت ا س میں مشاہد تک پہنچتی ہے اور اس لیے زاویہ ا س ط = ی جرم کا ظاہری راسی فاصلہ ہے۔ اگر حسب سابق ا سے زمین کا نصف قطر تعبیر ہو اور کرۂ ہوائی س ط کی موٹائی ل سے ظاہر کی جائے تو مثلث س ج ا سے

(۱ + ل \ ا) جب فہ = جب ی،

اور نیز جب سا = مہ جب فہ

اس لیے جب سا = مہ (۱ - ل \ ا) جب ی، بڑی حد تک

کیونکہ $\frac{ل}{ا}$ ایک چھوٹی مقدار ہے جو $\frac{۱}{۸۰۰}$ سے کم محسوب ہوئی ہے۔

اگر کل انعطاف غہ ہو یعنی موقوعہ شعاع اپنی اصلی سمت سے بقدر زاویہ غہ کے مڑ چکی ہو تو سا = فہ + غہ اور یہ فرض کر کے کہ غہ کو قوس کے ثانیوں میں بیان کیا گیا ہے ہمیں حاصل ہوتا ہے

غہ جب ا″ = (جب سا - جب فہ) قط فہ

اب جب سا، جب فہ، جم فہ کی بجائے علی الترتیب جملے

مہ (۱ - ل \ ا) جب ی، (۱ - ل \ ا) جب ی، $\sqrt{۱ - (۱ - ل \backslash ا)^۲ \text{ جب}^۲ \text{ ی}}$

درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{غہ} = (\text{مہ} - ۱) \text{ قم } ا'' \frac{(۱ - ل \backslash ا) \text{ جب ی}}{\{۱ - (۱ - ل \backslash ا)^۲ \text{ جب}^۲ \text{ ی}\}^{\frac{۱}{۲}}} \quad (۱۲۷)$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$= (مہ - ۱) قم آ \{ مس ی - (مس ی + مس^۳ ی) ل \ ۱ \}$

$= ا مس ی + ب مس^۳ ی \ldots\ldots\ldots\ldots (۱)$

جہاں $ا = (مہ - ۱)(۱ - ل \ ۱) قم آ$

$ب = -(مہ - ۱) ل \ ۱ قم آ$

یہ ضابطہ جو اِس دفعہ اور پچھلے دفعہ کے مختلف اعمال سے حاصل کیا گیا ہے عملی طور پر قابلِ استعمال ہو گا اگر ہم ا اور ب کی عددی قیمتیں حاصل کر لیں۔ یہ عددی قیمتیں کم از کم دو مخصوص صورتوں میں (دیکھو دفعہ ۴۶) انعطاف کا راست مشاہدہ کر کے حاصل کی جاتی ہیں چنانچہ ہم یہ مان لیں گے کہ اِس طرح ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تپش ۵۰° فارن ہائیٹ اور دباؤ ۳۰ انچ پر انعطاف، ظاہری راسی فاصلوں ۵۴° اور ۴۷° پر علی الترتیب ۸۰٫۰۶″ اور ۲۰۰٫۴۶″ ہیں۔

اس طرح ضابطہ (۱) سے ا اور ب معلوم کرنے کے لیے حسب ذیل دو مساواتیں ملیں گی

$۸۰٫۰۶″ = ا (مس ۵۴°) + ب (مس ۵۴°)^۳$ ،

$۲۰۰٫۴۶″ = ا (مس ۴۷°) + ب (مس ۴۷°)^۳$

اِن مساواتوں کو حل کرنے سے اوسط دباؤ ۳۰ انچ اور تپش ۵۰° ف پر انعطاف کے لیے حسب ذیل عام جملہ حاصل ہوتا ہے

$غہ = ۵۸٫۲۹۴″ مس ی - ۰٫۰۶۶۸۲″ مس^۳ ی \ldots\ldots (۲)$

اس طرح ب \ ا صرف ۱ \ ۸۷۴۳ ہے اور اس لیے ہم دوسری رقم کو نظر انداز کر سکتے ہیں سوائے اُس صورت کے جبکہ مس^۳ ی بہت بڑا ہو یعنے جبکہ جرم افق کے قریب ہو۔

اگر راسی فاصلہ ۷۰° سے متجاوز نہ ہو تو اکثر مقاصد کے لیے جبکہ انتہائی تپشیں شامل نہ ہوں انعطاف کو کافی صحت کے ساتھ اِس سادہ جملہ

ک مس ی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

سے محسوب کیا جا سکتا ہے۔ یہاں صرف پہلی رقم استعمال کی گئی ہے اور دوسری رقم جس میں مس۳ ی شامل ہے نظر انداز کر دی گئی ہے، اس لیے ک کو ۵۸٫۲۹۴ً لینے کی بجائے ۵۸٫۲ً لینا قدرے زیادہ صحیح ہے۔ اِس مقدار ک کو انعطاف کا سر کہتے ہیں۔

مثال ۱ — متجانس کرۂ ہوائی کی موٹائی کیا ہونی چاہئے کہ جس سے انعطاف کے لیے ایسا جملہ ملے جو مشاہدے کے مطابق ہو۔

ب \ ا = ل \ ا

(۱۲۸) اس لیے ل \ ا = ۱۰٫۰۶۶۸ \ ۵۸٫۳ = ۱ \ ۸۷۳

اس لیے ا = ۳۹۵۷ میل لینے سے ل = ۴٫۵ میل۔

مثال ۲ — بتاؤ کہ دباؤ ۳۰ انچ اور تپش ۵۰° فارن ہائٹ پر کرۂ ہوائی کا انعطاف نما کیسینی کے نظریہ کی بموجب ۱٫۰۰۰۲۸۳ ہوگا۔

مثال ۳ — ضابطہ (۲) سے بتاؤ کہ راسی فاصلہ ۶۱° ۴۸ پر انعطاف اَ ۳۸٫۳ً ہے (دباؤ د = ۳۰ً اور تپش ت = ۵۰° فارن ہائٹ)۔

مثال ۴ — بتاؤ کہ اگر وہ مقداریں جو ثانیہ کے پانچویں حصہ سے کم ہوں نظر انداز کر دی جائیں تو انعطاف کے جملہ کی دوسری رقم ترک کیجا سکتی ہے جب کبھی راسی فاصلہ ۵۵° سے متجاوز نہ ہو۔

مثال ۵ — اگر ہم انعطاف کو معمولی شکل ک مس ی میں جہاں ی ظاہری راسی فاصلہ ہے بیان کرنے کی بجائے شکل کَ مس یَ میں بیان کریں جہاں یَ حقیقی راسی فاصلہ ہے تو ثابت کرو کہ اگر ک اور کَ دونوں قوس کے ثانیوں میں بیان کئے گئے ہوں تو

کَ = ک (۱ − ک قطا ی جب اً)

۴۴ — کرۂ ہوائی کے انعطاف کے لیے دیگر ضابطے۔

یہ ظاہر ہے کہ ہوا کی کثافت گھٹتی جاتی ہے جیسے زمین سے اُس کا فاصلہ بڑھتا ہے۔ پس کرۂ ہوائی کا انعطاف نما ۱٫۰۰۰۲۹۴ سے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جو زمین کی سطح پر اس کی قیمت ہے قیمت اتک گھٹے گا جو انعطافی کرۂ ہوائی کے اوپر کے حدود پر اس کی قیمت ہے۔

دفعہ ۱۴۱ کے مطابق فرض کرو کہ سب سے نچلی کرۂ ہوائی کی تہہ کا نصف قطر ا ہے جس کے لیے مہ = مہ اور غہ اس تہہ کا نصف قطر ہے جبکہ مہ گھٹکر ایک ہو گیا ہے۔ سمپسن (Simpson.) نے یہ مان لیا کہ ر مہ$^{ن+۱}$ = رَ جہاں ن ایک مقدار ہے جو فی الحال غیر معلوم ہے۔

مفروضہ مساوات سے ر = رَ حاصل ہوتا ہے جبکہ مہ = ا اس کا مساوات کی ترکیب میں اولاً خیال رکھا گیا تھا۔ جیسے ر بڑھتا ہے مہ گھٹنا چاہیے اور یہ اس صورت میں ہو گا جبکہ (ن + ۱) مثبت ہو۔

ہم دفعہ ۱۴۱ میں دیکھ چکے ہیں کہ مہ ر جب فہ = مستقل۔ کرۂ ہوائی کے اوپر کے اور نیچے کے حدود کے لیے اس حاصل ضرب کی جو قیمتیں ملتی ہیں ان کو مساوی رکھنے سے

مہ ا جب ی = رَ جب یَ

جہاں یَ، بالاترین تہہ پر وقوع کا زاویہ ہے اور ی، زیر ترین تہہ پر وقوع کا زاویہ۔ رَ کی بجائے مساوات ر مہ$^{ن+۱}$ = رَ سے حاصل شدہ قیمت رکھی جائے تو

مہ ا جب ی = ا مہ$^{ن+۱}$ جب یَ

اس لیے جب ی = مہ^{ن} جب یَ

یا یَ = جب$^{-۱}$ $\frac{\text{جب ی}}{\text{مہ}^{ن}}$

اب ر مہ$^{ن+۱}$ = رَ کا لوکارتمی تفرقی لینے سے (۱۲۹)

(ن + ۱) $\frac{\text{د ر}}{\text{ر}}$ + $\frac{\text{د ر}}{\text{ر مہ}}$ = ۰

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِس لیے دفعہ ۱۴۱ کی مساوات (۲) سے

$$\frac{\text{ن}}{\text{مہ}} = \text{مم فہ} \frac{\text{فرفہ}}{\text{فرمہ}}$$

اور دفعہ ۱۴۱ کی مساوات (۳) سے

$$\frac{\text{فرغہ}}{\text{فرفہ}} = \frac{۱}{\text{ن}}$$

انعطاف معلوم کرنے کے لیے ہمیں اِس جملہ کو فہ کی اُن قیمتوں کے درمیان تکمل کرنا ہوگا جو کرۂ ہوائی کے حدود پر لی گئی ہوں۔ زمین کی سطح پر انعطاف کا زاویہ ی ہے اور کرۂ ہوائی کی اوپر کی حد پر انعطاف کا زاویہ

$$\text{جب}^{-۱} \frac{\text{جب ی}}{\text{مہ ن}}$$

ہے۔ اِس لیے انعطاف کے لیے سمپسن کا حسب ذیل ضابطہ حاصل ہوتا ہے

$$\text{غہ} = \frac{۱}{\text{ن}} \left\{ \text{ی} - \text{جب}^{-۱} \left(\frac{\text{جب ی}}{\text{مہ ن}} \right) \right\}$$

مثال ۱ — اگر مہ ن = ۱ + س جہاں س ایک چھوٹی مقدار ہو جس کی دو سے اعلیٰ ترقوتیں نظر انداز کی جا سکتی ہیں تو ثابت کرو کہ سمپسن کے ضابطہ سے انعطاف کے لیے حسب ذیل تقریبی جملہ حاصل ہوتا ہے

$$\text{غہ} = \left(\frac{\text{سہ}}{\text{ن}} - \frac{\text{سہ}^{۲}}{\text{ن}^{۲}} \right) \text{مس ی} - \frac{\text{سہ}^{۲}}{\text{ن}^{۲}} \text{مس}^{۳} \text{ی}$$

مثال ۲ — یہ مان کر کہ مُشاہدہ سے انعطاف کا کُلیہ (دفعہ ۱۴۲)

$$\text{غہ} = ۵۸'' ۲۹۴ \text{ مس ی} - ۰۶۶ ۸۲'' \text{ مس}^{۳} \text{ی}$$

حاصل ہوتا ہے ثابت کرو کہ سمپسن کے ضابطہ سے زمین کی سطح پر ہوا کے انعطاف نما مہ کی قیمت ۱۰۰۰۲۸ حاصل ہوتی ہے اور نیز یہ کہ ن = ۸ اور

$$\text{مہ}^{۹} = ۱ر۱ر$$

مثال ۳ — ثابت کرو کہ اگر سمپسن کا ضابطہ صحیح ہوتا تو کرۂ ہوائی کی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

بلندی جہاں تک کہ وہ انعطاف کے لیے موثر ہے تقریباً دس میل ہوتی۔
براڈلے (Bradley) نے ایک آسان ضابطہ سمپسن کے محصلۂ بالا ضابطے سے اخذ کیا ہے جو حسب ذیل ہے:۔ سمپسن کا ضابطہ ہے

$$\text{غہ} = \frac{1}{\text{ن}} \left(\text{ی} - \text{جب}^{-1} \frac{\text{جب ی}}{\text{مہ}^{\text{ن}}} \right)$$

اِسے لکھا جا سکتا ہے $\text{جب}(\text{ی} - \text{ن غہ}) = \text{جب ی} \setminus \text{مہ}^{\text{ن}}$

اس لیے $$\frac{\text{جب ی} - \text{جب}(\text{ی} - \text{ن غہ})}{\text{جب ی} + \text{جب}(\text{ی} - \text{ن غہ})} = \frac{\text{مہ}^{\text{ن}} - 1}{\text{مہ}^{\text{ن}} + 1}$$

یا چونکہ انعطاف ایک چھوٹی مقدار ہے اس لیے (۱۳۰)

$$\text{غہ} = \frac{2}{\text{ن}} \frac{\text{مہ}^{\text{ن}} - 1}{\text{مہ}^{\text{ن}} + 1} \text{ مس}(\text{ی} - \tfrac{1}{2} \text{ن غہ})$$

اگر ہم مثال ۲ صفحہ ۱۹۶ سے مہ اور ن کی دی ہوئی قیمتیں لیکر اسمیں درج کریں تو تقریبی ضابطہ

$$\text{غہ} = 59'' \text{ مس}(\text{ی} - 4 \text{ غہ})$$

حاصل ہوتا ہے۔
ہم اِس ضابطہ کی تصحیح اس طرح کر سکتے ہیں کہ وہ معیاری تپش اور دباؤ پر دو معلومہ انعطافوں کے لیے ٹھیک ہو جائے، مثلاً اگر ہم لیں

$$\text{ی} = 50^\circ, \quad \text{غہ} = 69.36''$$

اور $$\text{ی} = 75^\circ, \quad \text{غہ} = 210.14''$$

(دیکھو گرینوچ کی جدولیں) تو براڈلے کا ضابطہ شکل

$$\text{غہ} = 58.361'' \text{ مس}(\text{ی} - 0.9 \text{ غہ})$$

میں حاصل ہوتا ہے۔ اِس ضابطہ سے 80° کے راسی فاصلہ تک سب انعطاف تقریبی طور پر معلوم کیے جا سکتے ہیں۔
براڈلے کا ضابطہ افق کے قریب مشاہدات کے لیے موزوں ہے کیونکہ جس وقت ی کی قیمت 90° کے قریب آتی ہے تو مس(ی - 0.9 غہ)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

لا انتہا بڑا نہیں ہو جاتا۔

مثال ۱ — بتاؤ کہ انعطاف کے لیے براڈلے اور کیسینی کے ضابطے

غہ = ۳۶۱ ، ۵۸″ مس (ی − ۰۹ ، ۴ غہ)

اور غہ = ۲۹۴ ، ۵۸″ مس ی − ۰۶۶۸۲ ، ۰″ مس ۳ ی

عملاً مماثل ہیں بشرطیکہ راسی فاصلہ بہت بڑا نہ ہو۔

مثال ۲ — اِس مفروض کی بناء پر کہ کرۂ ہوائی کے انعطاف نما کی (ن + ۱) ویں قوت، زمین کے مرکز سے فاصلہ کے بالعکس بدلتی ہے ہیئتی انعطاف کے لیے براڈلے کا تقریبی ضابطہ

غہ = ا مس (ی − $\frac{۱}{۲}$ ن غہ)

ثابت کرو۔

مثال ۳ — اگر کرۂ ہوائی میں کسی نقطہ پر انعطاف نما زمین کے مرکز سے فاصلہ کے مربع کے بالعکس بدلے اور زمین کی سطح پر مہ ہو اور کرۂ ہوائی کی حد پر اکائی ہو تو ثابت کرو کہ انعطاف کے لیے متناظر تصحیح

$$\text{جب}\left(\text{ی} + \frac{۱}{۲}\text{غہ}\right) = \sqrt{\text{مہ}}\ \text{جب ی}$$

سے حاصل ہوتی ہے۔ (Math. Trip. 1906)

۴۵ — کرۂ ہوائی کے دباؤ اور اسکی تپش کا اثر انعطاف پر۔

انعطاف کے ضابطہ (۲) میں جو دفعہ ۴۳ میں حاصل کیا جا چکا ہے، ہم نے مان لیا تھا کہ بارپیما کا ارتفاع ۳۰ انچ اور بیرونی ہوا کی تپش ۵۰° فارن ہائٹ ہے۔ اب ہمیں وہ ضابطہ معلوم کرنا ہے جو دباؤ اور تپش کی دیگر دی ہوئی قیمتوں پر استعمال کرنا ہوگا۔

(۱۳۱) ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ زمین کی سطح پر انعطاف ہوا کی کثافت کے متناسب ہے، اِس لیے اگر دباؤ د اور تپش ت پر انعطاف غہ ہو اور معیاری دباؤ ۳۰ انچ اور تپش ۵۰° پر انعطاف غہ ہو تو گیسوں کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

خواص سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\text{غہ}}{\text{غہ}_{\cdot}} = \frac{\text{د}}{\text{د}_{\cdot}} \frac{۵۰ + ۴۶۰}{۳۰} = \frac{۴۶۰ + \text{ت}_{\cdot}}{۴۶۰ + \text{ت}}$$

غہ کی وہ قیمت درج کرنے سے جو دفعہ ۴۲ میں معلوم ہو چکی ہے دباؤ د اور تپش ت پر ظاہری راسی فاصلہ ی کے لیے کرۂ ہوائی کے انعطاف کا تقریبی ضابطہ حاصل ہوتا ہے

$$\text{غہ} = \frac{\text{د}}{۴۶۰ + \text{ت}} (۵۸٫۲۹۴ \text{ مس ی} - ۰٫۰۶۶۸۲ \text{ مس}^{۳} \text{ی})$$

گرنیوچ آبزرویشنس (Gre. Observations) بابتہ ۱۸۹۸ء کے ضمیمہ میں مسٹر پی۔ ایچ کاویل (Cowell) نے انعطاف کی اُن جدولوں کو مرتب کیا ہے جو گرنیوچ کی رصدگاہ میں استعمال کی جاتی ہیں۔ اِن جدولوں میں صفر درجہ سے ۸۸° ۴۰' تک راسی فاصلہ کے ہر منٹ کے لیے اوسط انعطافات ۳۰ انچ دباؤ اور ۵۰° فارن ہائٹ تپش کیلئے درج ہیں۔ وہ تصحیحات جو تپش اور دباؤ میں تغیرات واقع ہونے کی وجہ سے عمل میں لانی ہونگی دوسری جدولوں میں دی جاتی ہیں۔

۴۶ ۔ مُشاہدہ سے کرۂ ہوائی کے انعطاف کی تعیین۔

انعطاف کے جملہ ا مس ی + ب مس^{۳} ی کے سُروں ا اور ب کو نصف النہاری راسی فاصلوں کا مُشاہدہ کر کے مختلف طریقوں پر متعین کیا جا سکتا ہے اِن میں سے تین طریقے ہم یہاں بیان کریں گے۔

پہلا اور دوسرا طریقہ ایک ہی رصدگاہ میں استعمال کیا جا سکتا ہے بشرطیکہ رصدگاہ کا عرض بلد نہ تو بہت بڑا ہو نہ بہت چھوٹا۔ تیسرے طریقہ میں دو رصدگاہوں کی شرکتِ عمل ضروری ہے جن میں سے ایک شمالی نصف کرۂ زمین میں اور دوسری جنوبی نصف کرۂ زمین میں واقع ہو۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

پہلا طریقہ ۔ ایک ایسے ستارہ کا انتخاب کیا جاتا ہے جو بالائی اور زیرین دونوں تکبدوں کے وقت افق کے اوپر ہو۔ اگر بالائی اور زیرین تکبدوں پر ظاہری راسی فاصلے علی الترتیب ی، یَ ہوں اور یہ فاصلے راس کے شمال کی جانب مثبت ہوں تو اصلی راسی فاصلے

ی + ا مس ی + ب مس² ی

اور یَ + ا مس یَ + ب مس² یَ

ہوں گے ۔ اِن دو راسی فاصلوں کا اوسط وہی ہے جو راس سے شمالی قطب کا فاصلہ ہے یعنی عرض التمام ۔ پس ہمیں مساوات حاصل ہوتی ہے (۱۳۲)

$$\frac{1}{2}\{(ی + یَ) + ا(مس ی + مس یَ) + ب(مس² ی + مس² یَ)\} = ۹۰° - فہ$$

ی اور یَ کی مشاہدہ کردہ قیمتیں درج کرنے سے تین مقداروں ا، ب اور فہ میں ایک خطی مساوات حاصل ہوتی ہے ۔

دوسرے ستاروں کا اسی طرح مشاہدہ کیا جاتا ہے اور ہر ستارے سے انہی تین مجہول مقداروں ا، ب اور فہ میں ایک خطی مساوات حاصل ہوتی ہے ۔ ایسی تین مساواتیں، ا، ب اور فہ کو متعین کرنیکے لیے کافی ہیں ۔ بریں ہم نتیجہ زیادہ تر صحیح ہوگا اگر ہم بہت سے ستاروں کا مشاہدہ کریں اور پھر محصلہ مساواتوں پر اقل ترین مربعوں کا طریقہ استعمال کریں جو بعد میں بیان کیا جائے گا ۔

ایک سادہ مثال کے طور پر ہم ایک ایسی صورت لیں گے جس میں عرض بلد معلوم ہو اور جس میں چونکہ کوئی راسی فاصلہ بہت بڑا نہیں ہے اِس لیے ہم یہ مان سکیں گے کہ انعطاف ایک ہی رقم ک مس ی سے بیان ہوتا ہے ۔

ڈنسنک (Dunsink.) میں جو شمالی عرض بلد ۵۳° ۲۳′ ۱۳″ پر واقع ہے ستارہ عہ قیفاؤس (a Cephei) کا مشاہدہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

بالائی تکبد پر ظاہری راسی فاصلہ ۸° ۴۸′ ۳۷″ ہے اور ۱۲ گھنٹوں کے بعد زیرین تکبد پر اس کا ظاہری راسی فاصلہ ۶۴° ۲۲′ ۴۷″ ہے۔

اِس لیے اصلی راسی فاصلے

۸° ۴۸′ ۳۷″ + ک مس (۸° ۴۸′ ۳۷″)،

۶۴° ۲۲′ ۴۷″ + ک مس (۶۴° ۲۲′ ۴۷″)

ہوں گے اِن کا مجموعہ عرض التمام (۳۶° ۳۶′ ۴۷″) کا دُگنا ہونا چاہیے، اِس لئے

۷۳° ۱۱′ ۲۴″ + ک (۰٫۱۵۵ + ۲٫۰۸۵) = ۷۳° ۱۳′ ۳۴″

اس لیے ک = ۵۸٫۰″

دوسرا طریقہ ۔ انقلابوں پر سورج کے راسی فاصلوں کا مشاہدہ کرنے سے بھی انعطاف کے مستقل معلوم کئے جا سکتے ہیں۔

فرض کرو کہ انقلابوں پر سورج کے ظاہری نصف النہاری راسی فاصلے ی۱، ی۲ ہیں۔ فرض کرو کہ ان کے جواب میں انعطاف غہ۱ اور غہ۲ ہیں۔ اِس لیے اصلی راسی فاصلے ی۱ + غہ۱ اور ی۲ + غہ۲ ہیں۔ یہ مان لو کہ سورج کے عرض بلد کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے یا دوسرے الفاظ میں سورج کا مرکزی الواقعی طریق الشمس میں ہے جو ہمیشہ بڑی حد تک درست ہے تو اِن راسی فاصلوں کا اوسط وہ قوس ہے جو راس سے خط استوا تک کھینچی گئی ہے یعنے عرض بلد۔ اس لیے

۲ فہ = ی۱ + ی۲ + غہ۱ + غہ۲

اگر عرض بلد معلوم ہو اور اگر ہم یہ مان لیں کہ (۱۳۳)

غہ۱ = ک مس ی۱ اور غہ۲ = ک مس ی۲

تو ک کے لیے ایک مساوات حاصل ہوتی ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

تیسرا طریقہ ۔ اس میں ایک ہی ستارہ س کے راسی فاصلے س ر۱ اور س ر۲ دو مختلف رصدگاہوں سے مشاہدہ کئے جاتے ہیں، فرض کرو کہ ان میں سے ایک رصدگاہ شمالی عرض بلد فہ۱ پر واقع ہے اور دوسری جنوبی عرض بلد فہ۲ پر (دیکھو شکل ۴۵) ۔

اگر شمالی اور جنوبی قطب سماوی ق اور قَ ہوں تو

$$\text{س ر}_1 = \text{س ق} - \text{ر}_1\text{ق} = \text{فہ}_1 - \text{ضہ}\,,$$

$$\text{س ر}_2 = \text{س قَ} - \text{ر}_2\text{قَ} = \text{فہ}_2 + \text{ضہ}$$

اگر مشاہدہ کردہ راسی فاصلے ی۱ اور ی۲ ہوں اور اگر ہم انعطافوں کو ک مس ی۱ اور ک مس ی۲ مان لیں تو

$$\text{س ر}_1 = \text{ی}_1 + \text{ک مس ی}_1$$

$$\text{س ر}_2 = \text{ی}_2 + \text{ک مس ی}_2$$

پس

$$\text{ی}_1 + \text{ک مس ی}_1 + \text{ی}_2 + \text{ک مس ی}_2 = \text{فہ}_1 + \text{فہ}_2$$



شکل (۴۵)

اس مساوات سے ک معلوم کیا جا سکتا ہے ۔

ہم مثال کے طور پر ستارہ مُراۃ المسلسلہ (بہ) (β Andromedae) لیں گے ۔ اس ستارہ کو گرینوچ پر جس کا عرض بلد ۵۱° ۲۸′ ۳۸″ شمال ہے بوقت تکبد مشاہدہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا جنوبی ظاہری راسی فاصلہ ۱۶° ۲۰′ ۳″ تھا ۔ اس ستارہ کو راس امید کی رصدگاہ پر بھی جس کا عرض بلد

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

۳۳° ۵۶′ ۴″ ج ہے بوقت تکبد مشاہدہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ اس کا شمالی ظاہری راسی فاصلہ ۶۹° ۰′ ۵۰″ تھا۔ اس لیے ہمیں حسب ذیل مساوات حاصل ہوتی ہے

۱۶° ۲۰′ ۳″ + ک مس (۱۶° ۲۰′) + ۶۹° ۰′ ۵۰″ + ک مس (۶۹° ۰′ ۲″)
= ۸۵° ۲۴′ ۴۲″

جس سے ک = ۸٫۳ ۵″

۴۷ ۔ انعطاف کا اثر ساعتی زاوئے اور میل پر۔

کسی ستارے کے ساعتی زاوئے اور میل پر انعطاف کا اثر معلوم کرنیکے لیے دفعہ ۳۵ کے تفرقی ضابطے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ انعطاف کا اثر یہ ہوتا ہے کہ ستارہ اپنی اصلی مقام سے راس کی طرف ذرا اوپر اٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اگر مشاہدہ کردہ راسی فاصلہ ی ہو تو اصلی راسی فاصلہ ی + مف ی ہوگا جہاں مف ی = ک مس ی۔ ہم مان لیتے ہیں (۱۳۴)
کہ عرض بلد معلوم ہے، اس لیے مف فہ = ۰۔ اور چونکہ السمت انعطاف سے نہیں بدلتا اس لیے مف ا = ۰۔

اب ستارہ کے میل پر انعطاف کا اثر معلوم کرنے کے لیے ہم وہ ضابطہ لکھ لیتے ہیں جو مف ا، مف فہ، مف ی، مف ضہ کے درمیان ہے (دیکھو دفعہ ۳۵ (۱)) یعنے

مف ضہ + جم عا مف ی۔ جم س مف فہ۔ جب س جم فہ مف ا = ۰۔

اس مساوات میں رکھو مف ا = ۰، مف فہ = ۰، مف ی = ک مس ی تو

مف ضہ = ۔ ک مس ی جم عا

یعنے اگر ضہ مشاہدہ کردہ میل ہو تو ضہ ۔ ک مس ی جم عا اصلی میل ہے۔

ساعتی زاویہ پر انعطاف کا اثر معلوم کرنے کے لیے دفعہ ۳۵ کا ضابطہ (۲)

مف ی + جم ا مف فہ + جم عا مف ضہ + جم فہ جب ا مف س = ۰۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

لکھ لو اور وہی اندراجات عمل میں لاؤ تو

مف س = ک جب عا مس ی قط ضہ

اختلاف منظری زاویہ پر انعطاف کا اثر معلوم کرنے کے لیے ہم دفعہ ۳۵ کا ضابطہ (۶)

مف عا - جم ی مف ا + جب ضہ مف س - جب ا جب ی مف فہ =۰

استعمال کرتے ہیں جس سے حاصل ہوتا ہے

مف عا = - ک جب عا مس ضہ مس ی

محصلہ بالا نتیجوں کو دوسری طرح حسب ذیل طریقہ پر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ شکل (۴۶) میں ش قطب شمالی، ر راس، پ ستارہ کا اصلی مقام پَ ستارہ کا ظاہری مقام بوجہ انعطاف اور پ پَ = ک مس ر ا پ = ک مس ی۔ نیز پ ق، پ ش پر عمود ہے اور اگر زاویہ پ ش پَ چھوٹا ہو جیسا کہ بالعموم ہوتا ہے بشرطیکہ پ قطب کے نزدیک نہ ہو تو قطبی فاصلہ میں تبدیلی حسب ذیل ہے

پ ق = پ پَ مس عا

= ک مس ی جم عا



شکل (۴۶)

مشاہدہ کردہ میل ۹۰° - ش ق ہے لیکن اصلی میل ۹۰° - ش پ ہے۔ اس لیے مشاہدہ کردہ میل پر مف ضہ کی تصحیح عمل میں لانی چاہئے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۱۳۵) تاکہ اصلی میل حاصل ہو اور مف ضہ حسب ذیل مساوات سے حاصل ہوتا ہے

مف ضہ = ۔ ک مس ی جم عا

نیز

مف س = پ ش ق = ک مس ی جب عا قم پ ش

= ک مس ی جب عا قط ضہ

نیز چونکہ مف عا مف ضہ انعطاف سے نہیں بدلتا اس لیے ہمیں حاصل ہونا چاہیے

جم عا جم ضہ مف عا = جب عا جب ضہ مف ضہ

اس میں مف ضہ کی بجائے اس کی قیمت درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

مف عا = ۔ ک جب عا مس ضہ مس ی

۴۸ ۔ انعطاف کا اثر دو قریبی سماوی نقطوں کے درمیان ظاہری فاصلہ پر

ہم اول یہ بتائیں گے کہ اگر انعطاف کو ک مس ی لیا جائے تو دو قریبی ستاروں کے درمیان ظاہری فاصلہ ف میں جسے قوس کے ثانیوں میں لیا گیا ہو حسب ذیل تصحیح جمع کرنی ہوگی جو قوس کے ثانیوں میں ہے:

ک ف (۱ + جم² ط مس² ی) جب آ

جہاں صدر تارے کا راسی فاصلہ ی ہے اور ط وہ زاویہ ہے جو ان دو ستاروں کو ملانے والی قوس اور اس قوس کے درمیان ہے جو صدر تارے سے راس تک کھینچی گئی ہو۔

فرض کرو کہ ر راس ہے،

ر ا = لا، ر ب = ما،

ا ب = ف، زاویہ

ا ر ب = ا اور زاویہ

ر ا ب = ط ۔ انعطاف کا



شکل (۴۷)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اثر یہ ہوگا کہ قوس ا ب راس کی طرف اوپر کو ا َ ب َ تک ہٹی ہوئی ہوگی جہاں

ا ا َ = ک مس لا

اور ب ب َ = ک مس ما

اِس لئے

جم ف = جم لا جم ما + جب لا جب ما جم ا

ا کو مستقل سمجھ کر تفرق کرنے اور

مف لا = - ک مس لا

مف ما = - ک مس ما

رکھنے سے حاصل ہوتا ہے

- جب ف × مف ف = ک جب لا جم ما مس لا + ک جم لا جب ما مس ما

- ک جم ا جم لا جب ما مس لا - ک جم ا جب لا جم ما مس ما

= ک جب ۲ (لا - ما) قط لا قط ما + ۴ ک جب ۲ ½ ا جب لا جب ما

اب چونکہ یہ دونوں رقمیں چھوٹی ہیں جملوں قط لا قط ما اور جب لا جب ما میں لا = ما = ی (کسی ایک ستارہ کا راسی فاصلہ) رکھ سکتے ہیں - نیز چونکہ ا، ف چھوٹے ہیں ہم رکھ سکتے ہیں

جب ف = ف، جب ۲ (لا - ما) = ف ۲ جم ۲ طہ

اور ۴ جب ۲ ½ ا = ا ۲ = ف ۲ جب ۲ طہ قم ۲ ی (۱۳۶)

اس لیے ف میں سے جو مقدار انعطاف کی وجہ سے تفریق کرنی ہوگی وہ یہ ہے

ک ف (۱ + جم ۲ طہ مس ۲ ی)

یا اگر ک، ف، مف ف قوس کے ثانیوں میں بیان کئے گئے ہوں تو

ک ف (۱ + جم ۲ طہ مس ۲ ی) جب آ

سے ثانیوں کی وہ تعداد حاصل ہوگی جس قدر فاصلہ ف انعطاف کی وجہ سے گھٹ چکا ہے - اِس لیے یہ وہ تصحیح ہے جو دو قریبی ستاروں کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

درمیان پیمائش شدہ فاصلہ پر عمل میں لانی ہوگی تاکہ انعطاف کے اثر کو رفع کیا جائے۔

اِس کے بعد اب یہ ثابت کرنا ہے کہ زاویہ طہ جو اِن دو ستاروں کو ملانے والے خط اور انتصابی کے درمیان ہے انعطاف کی باعث ک جب طہ جم طہ مس۲ ی کی حد تک بڑھ جاتا ہے۔

مساوات

ف جب طہ = جب ا جب ما

کا لوکارتمی تفرقی لینے سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\text{مف ف}}{\text{ف}} + \text{مم طہ مف طہ} = \text{مم ما مف ما}$$

جو اندراج سے ہو جاتا ہے

$$-\text{ک}\,(1 + \text{جم}^2\,\text{طہ مس}^2\,\text{ی}) + \text{مم طہ مف طہ} = -\text{ک}$$

اس لیے مف طہ = ک جب طہ جم طہ مس۲ ی

اور یہ وہ مقدار ہے جسے ظاہری زاویہ ب ا ر میں سے تفریق کرنا ہوگا تاکہ اصلی زاویہ ب ا ر حاصل ہو۔

چاند یا سورج کی دائری قرص کی شکل میں انعطاف کی باعث جو بگاڑ واقع ہوتا ہے اُسے حسب طریقہ ذیل معلوم کیا جا سکتا ہے:۔

فرض کرو کہ سورج کا مرکز س (شکل ۴۸) ہے، اس کا نصف قطر ا، اِس کے گھیرے پر کوئی نقطہ پ، اور راس ر ہے۔ فرض کرو کہ ر س = ی۔ فرض کرو کہ انعطاف کا سرک ہے جس کی وجہ سے



شکل (۴۸)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

پ میں پَ تک ہٹاؤ واقع ہوتا ہے اور فرض کرو کہ پ ق اور پَ قَ، ر س پر عمود ہیں۔ دفعہ گذشتہ کی رو سے ہم دیکھتے ہیں کہ پ ق انعطاف کی باعث پَ قَ تک ہٹ جاتا ہے۔ اگر ہم س کو مبدا قرار دیں اور س ر کو لا کا محور اور اس طرح پَ کے محدد لا اور ما ہوں تو

$$\text{ما} = \text{پَ قَ} = (\text{ا} - \text{ک})\ \text{پ ق} = \text{ا}\ (\text{ا} - \text{ک})\ \text{جب طہ}$$

نیز
$$\text{لا} = \text{س قَ} = \text{ا جم طہ} + \text{ق قَ}$$
$$= \text{ا جم طہ} + \text{ک مس (ی} - \text{ا جم طہ)}$$
$$= \text{ا جم طہ} + \text{ک (مس ی} - \text{ا جم طہ قط}^2\ \text{ی)}$$

اِس لیے طہ کو ساقط کرنے سے سورج کی منعطف شکل کی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$\frac{(\text{لا} - \text{ک مس ی})^2}{(\text{ا} - \text{ا ک قط}^2\ \text{ی})^2} + \frac{\text{ما}^2}{\text{ا}^2\ (\text{ا} - \text{ک})^2} = 1 \qquad (۱۳۷)$$

اِس کا محور اعظم ا (ا - ک) ہے اور محور اصغر ا (ا - ک قط^2 ی)۔ اِن محوروں میں نسبت ا - ک مس^2 ی ہے۔ بلا شبہ یہاں ک نیم قطری زاویوں میں ہے۔

ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چھوٹی افقی قوس انعطاف کی وجہ سے نسبت ا - ک : ا میں گھٹ جاتی ہے اور کوئی چھوٹی انتصابی قوس جو ایک مقدہ راسی فاصلہ پر ہو نسبت ا - ک قط^2 ی : ا میں گھٹ جاتی ہے۔

مثال ا۔ اگر دو قریبی ستاروں کے درمیان میل کا فرق ف ہو اور اگر ان میں سے ایک ستارہ کا راسی فاصلہ ی اور اختلاف منظری زاویہ عا ہو تو انعطاف کا اثر یہ ہوگا کہ میل کا فرق بقدر

$$\text{ک ف (ا} + \text{مس}^2\ \text{ی جم}^2\ \text{عا) جب ا}''$$

کے گھٹ جائیگا۔ یہ مان لیا گیا ہے کہ انعطاف راسی فاصلہ کے مماس کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

متناسب ہے اور انعطاف کا سمرک ہے۔

پس اِن دو ستاروں کو ملانے والی قوس کا ظل اِن میں سے ایک ستارہ میں سے گذرنے والے ساعتی دائرہ پر ف ہے اور یہ ساعتی دائرہ راسی فاصلہ کے ساتھ زاویہ عا بناتا ہے۔

مثال ۲ — عرض بلد ۵۳° ۲۳′ ۱۳″ ش میں موقوعہ ایک رصد گاہ کی دوربین کو ۳۸° ۹′ شمالی میل کے توازی پر کے ایک نقطہ کی طرف لگایا گیا ہے اور گھنٹوں کے ساعتی زاویہ پر ثابت کیا گیا ہے۔ دو ستارے یکے بعد دیگرے میدانِ نظر میں سے گذرتے ہیں اور اِن کے میل کا ظاہری فرق ۶۸٫۰۲″ ہے۔ ثابت کرو کہ انعطاف کا اثر رفع کرنے کے لیے اِس فرق کو بقدر ۰٫۰۹″ کے بڑھانا ہوگا۔

(اِن میں سے ایک ستارہ دجاجہ ۶۱ (61 cygni) ہے اور دوسرا ستارہ مقابلہ کرنے کے اُن ستاروں میں سے ایک ہے جو رصد گاہ ڈنسنک (Dunsink) میں دجاجہ ۶۱ کا اختلاف منظر میل کے فرقوں کے طریقہ سے معلوم کرنے میں استعمال کئے گئے تھے۔)

مثال ۳ — متعدد ستارے اپنے غیر منعطف محلوں میں ایک چھوٹے منحنی پر واقع ہیں جس کی قطبی مساوات غہ = ف (طہ) ہے جہاں غہ ایک بڑے دائرہ پر وہ فاصلہ ہے جو ایک نقطہ و سے جس کو مبداء قرار دیا گیا ہے منحنی پر کے ایک نقطہ پ تک ہے اور طہ وہ زاویہ ہے جو و پ اور و س کے درمیان ہے جہاں س مشاہد کا راس ہے۔ ثابت کرو کہ انعطاف کا اثر ملحوظ رکھ کر منحنی کی قطبی مساوات حسب ذیل مساواتوں سے غہ اور طہ کو ساقط کرنے سے حاصل ہوگی:۔

$$\text{غہ} = \text{ف}(\text{طہ})$$

$$\text{غہ}' = \text{غہ} - \text{ک}\,\text{غہ}\,(1 + \text{مس}^2\,\text{ی جم}^2\,\text{طہ})$$

$$\text{طہ}' = \text{طہ} + \text{ک جب طہ جم طہ مس}^2\,\text{ی}$$

جہاں غہ' وہ سمتی نیم قطر ہے جو نقطوں و اور پ کو ملاتا ہے جو علی الترتیب

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

و اور پ کے منعطف محل ہیں، اور طہ وہ زاویہ ہے جو وَپ، وَس کے ساتھ بناتا ہے۔

مثال ۴ ۔ سورج کا زاوئی قطر معلوم کرنا مقصود ہے۔ دو پیمائش کردہ قطروں کا حسابی اوسط جو ایک دوسرے پر علی القوائم ہیں ف ہے۔ انعطاف کا سرک ہے جو نیم قطری زاویوں میں بیان کیا گیا ہے اور سورج کے مرکز کا راسی فاصلہ ی ہے۔ ثابت کرو کہ اصلی قطر ف (۱ + ک + ½ ک مس² ی) ہے خواہ وہ زوایائے محل کچھ ہی ہوں جن میں یہ دو قطر جو ایک دوسرے پر علی القوائم ہیں ناپے گئے تھے۔ (یہ سوال ایک نتیجہ پر مبنی ہے جو مشاہدات گرینوچ "Gr. Observations" کے مقدمہ میں درج ہے)

قطع ناقص کے مرکز سے نقطہ طہ کا فاصلہ ا (۱ - ک - ک جم² طہ مس² ی) ہے۔ اس لیے طہ اور طہ + ۹۰° پر یعنے ایک دوسرے پر علی القوائم نیم قطروں کا حسابی اوسط ا (۱ - ک - ½ ک مس² ی) = ½ ف ہے اور (۱۳۸)

اس لیے ۲ ا = ف (۱ + ک + ½ ک مس² ی)

۴۹ ۔ انعطاف کا اثر ایک دوہرے تارے کے زاویہ محل کی پیمائش پر

فرض کرو کہ اس زوج کا صدر تارہ اور ثانوی تارہ علی الترتیب ا، ب ہیں جن سے یہ دوہرا تارہ بنتا ہے اور فرض کرو کہ ق شمالی قطب ہے۔

کرۂ سماوی پر ایک دائرہ کا تصور کرو جس کا مرکز ا ہے اور جس کی درجہ بندی ایسی ہوئی ہے کہ مشاہد شطب ہے اور اق (< ۱۸۰°) اس دائرہ کو صفر درجہ پر قطع کرتا ہے۔ وہ نقطہ جس میں اب، اس درجہ دار دائرہ سے ملتا ہے تارہ ا کے لحاظ سے ب کا زاویہ محل کہلاتا ہے۔ زاویہ محل کی پیمائش کے طریقہ کی مزید توضیح حسب ذیل کیجا سکتی ہے۔

فرض کرو کہ دوہرا تارہ نصف النہار پر یا اس کے قریب ہے اور وہ اپنے بالائی تکمیلہ پر ہے اور ثانوی تارہ صدر تارہ کے مشرقی جانب ہے۔ تب زاویہ محل تقریباً ۹۰° ہے۔ لیکن اگر ثانوی تارہ مغربی جانب ہوتا جبکہ صدر تارہ نصف النہار پر ہو تو اس کا زاویہ محل

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

۲۷۰° ہوتا کیونکہ ہر صورت میں پیمائش کی سمت اُس قوس سے جو قطب تک کھینچی گئی ہے وہی ہے۔ ہیئت داں اسے بالعموم سمت ش-پ-ج-ا[1] (N.F.S.P.) کے نام سے جانتے ہیں کیونکہ یہ پیمائش شمالی نقطہ سے شروع ہو کر آسمان کے اُس حصہ کی جانب سے گزرتی ہے جو یومی حرکت کے لحاظ سے پیچھے ہے اور پھر جنوب کے گرد ہوتے ہوئے شمال کی طرف آسمان کے اس حصہ میں سے واپس ہوتی ہے جو آگے ہے۔

اگر ق قطب، ر راس، اور دوہرے تارہ ا ب کا صد تارہ ا ہو (شکل ۴۹) تو زاویہ محل حسب تعریف مندرجۂ بالا زاویہ ق ا ب ہے۔ انعطاف زاویہ محل کو زاویہ ق ا ب میں بدل دیتا ہے۔ اِس طرح انعطاف زاویہ محل کو دو طریقوں سے بدلتا ہے اولاً اختلاف منظری زاویہ ق ا ر (= عا) کو تبدیل کرتا ہے اور ثانیاً زاویہ ب ا ر کو۔ یہ دونوں زاوئے انعطاف کی باعث بدل جاتے ہیں اور مُشاہدہ کردہ زاویہ محل پر جو تصحیح عمل میں لانی ہوگی وہ اُس صورت میں جو شکل (۴۹) میں ظاہر کی گئی ہے منفی ہونی چاہئے۔ ہم اصلی زاویہ محل کو م سے تعبیر کریں گے۔



شکل (۴۹)

پس زاویہ ب ا ر = م - عا، اور اس لیے (دفعہ ۴۸)

زاویہ ب ا ر = م - عا + ک جب (م - عا) جم (م - عا) مس² ی،

زاویہ ق ا ر = عا + ک مس ی مس ضہ جب عا

پس اگر انعطاف کی باعث زاویہ محل م ع ہو تو (۱۳۹)

م ع = م + ک مس ی مس ضہ جب عا + ک جب (م - عا) جم (م - عا) مس² ی

[1] شمال پیچھے جنوب آگے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اگر اُسی ابتدائی ستارے (صدر تارے) کے حوالے سے کسی دوسرے ستارے کے لیے متناظر ارقام مَ ع اور م ہوں تو

مَ ع = مَ + ک مس ی مس ضہ جب عا + ک جب (مَ - عا) جم (مَ - عا) مس² ی

تفریق کرنے سے یہ آسانی حاصل ہوتا ہے

مَ - م = مَ ع - م ع - ک مس² ی جب (مَ - م) جم (۲ عا - م - مَ)

ستارہ ا یومی حرکت کی باعث جس سمت میں حرکت کرتا ہے اُس کا اصلی زاویہ محل مَ ۲۷۰° ہے اِس لیے اگر یومی حرکت کی باعث ا کی حرکت کے لیے مشاہدہ کردہ زاویہ محل مَ ع ہو تو

م = م ع + ۲۷۰° - مَ ع + ک مس² ی جم م جب (۲ عا - م)

خلاصہ - گذشتہ دفعہ اور اس دفعہ سے کسی دو ہرے تارے کے مشاہدہ کردہ فاصلہ اور زاویہ محل کی اُس تصحیح کے لیے جو انعطاف کی باعث عمل میں لانی ہوگی حسب ذیل نتیجہ برآمد ہوتا ہے[1] -

فرض کرو کہ دو ستاروں کا فاصلہ جس کو قوس کے ثانیوں میں بیان کیا گیا ہو، ف ہے ی راسی فاصلہ، م زاویہ محل، عا اختلاف منظری زاویہ، اور ک انعطاف کا سر قوس کے ثانیوں میں ہے تو اصلی فاصلہ حاصل کرنے کے لیے جو تصحیح ظاہری فاصلہ میں جمع کرنی ہوگی وہ

ک ف {۱ + مس² ی جم² (م - عا)} جب ۱"

[1] اِن تصحیحات کے اطلاق میں آسانی پیدا کرنیکے لیے جدولیں تیار کیگئی ہیں، اِن کے لیے دیکھو

Monthly Notices of the Royal Astro. Soc. vol. xli. p. 445

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہے۔ اور اصلی زاویہ محل حاصل کرنے کے لیے جو تصحیح پیمائش کردہ زاویہ محل میں جمع کرنی ہوگی وہ

ک مس^{۲} ی جم م جب (۲ عا۔ م)

ہے۔

مثال: ستارہ سلیاق (عہ) (a Lyræ) کا میل ۳۸° ۴۰′ ہے اور متصلہ ستارے کا زاویہ محل ۱۵۰° ۰′ ۵۸″ ہے۔ وہ تصحیح معلوم کرو جو انعطاف کی باعث اس زاویہ محل پر عائد کرنی ہوگی جبکہ ساعتی زاویہ ۷ گھنٹے مغرب ہو، عرض بلد ۵۳° ۲۳′ ۱۳″ ہو اور انعطاف کا سر ۲ ؛ ۵۸″ ہو۔

اولاً راسی فاصلہ ۶۷° ۳۶′ اور اختلاف منظری زاویہ ۳۸° ۳۲′ کا محسوب کر لینا ضروری ہے۔ پھر ضابطہ سے تصحیح ۶ ؛ ۴۴″ حاصل ہوتی ہے جو مشاہدہ کردہ زاویہ محل میں جمع کرنی ہوگی تاکہ اُسے انعطاف کے اثر سے پاک کرے

انعطاف پر متفرق سوالات (۱۴۰)

مثال ۱ — ثابت کرو کہ انعطاف کسی جرم کے راسی فاصلہ کی جیب کو نسبت (۱ — ک) : ۱ میں گھٹاتا ہے جہاں ک انعطاف کا سر ہے۔

مثال ۲ — ستارہ عقاب (عہ) (a Aquilæ) کا شمالی میل ۸° ۳۷′ ۳۹″ ہے۔ ثابت کرو کہ گرینوچ (عرض بلد ۵۱° ۲۸′ ۳۸″ ش) پر بوقت تکمید اس کا ظاہری راسی فاصلہ ۴۲° ۵۰′ ۵۰″ ہے اور راس امید (عرض بلد ۳۳° ۵۶′ ۴۰″ ج) پر ۴۲° ۳۲′ ۵۰″ ہے۔

مثال ۳ — اگر افقی انعطاف ۳۵′ ہو تو ثابت کرو کہ سورج کے طلوع یا غروب پر جبکہ اس کا میل ضہ ہو سورج کے مرکز کے ساعتی زاویے س کے لیے ضابطہ حسب ذیل ہے

$$\text{جم}^{۲}\frac{۱}{۲}\text{س} = \text{قط فہ قط ضہ جم}(۴۵° + ۵؛۱۷′ - \tfrac{۱}{۲}\text{فہ} - \tfrac{۱}{۲}\text{ضہ}) \times$$

$$\text{جب}(۴۵° - ۵؛۱۷′ - \tfrac{۱}{۲}\text{فہ} - \tfrac{۱}{۲}\text{ضہ})$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۴ — اگر یہ مان لیا جائے کہ چاند بوقت طلوع اختلاف منظر کی باعث ۵۹′ نیچے دب جاتا ہے اور انعطاف کی باعث ۳۵′ مرتفع ہوتا ہے تو ثابت کرو کہ اگر ساعتی زاویہ س ہو اور میل ضہ ہو تو گرینوچ پر

جم ½ س = [۰٫۰۵۶ ۲] قط ضہ جم (۱۹° ۷′ ۳″ - ½ ضہ) جب (۱۹° ۷′ ۲۷″ - ½ ضہ)

مثال ۵ — گرینوچ (عرض بلد ۵۱° ۲۸′ ۳۸″) میں بتاریخ ۸ فروری ۱۸۹۴ء سورج کا میل بوقت طلوع ۱۴° ۳۹′ ج تھا۔ اس کا ظاہری ساعتی زاویہ معلوم کرو۔ یہ مان لیا جائے کہ افقی انعطاف ۳۵′ ہے۔

مثال ۶ — ایک ستارے کے ظاہری راستہ کا ظل افق کے مستوی پر ایک قطع ناقص ہے جس کا خروج المرکز جم فہ ہے جہاں فہ عرض بلد ہے۔ یہ ستارہ قطب سے دُور نہیں ہے۔ ثابت کرو کہ اگر اس ستارہ کا راسی فاصلہ بہت بڑا نہ ہو تو وہی صورت انعطاف کی باعث بدلے ہوئے ظاہری راستے کے لیے ہو گی۔ [Coll. Exam.]

مثال ۷ — ستارہ دجاجہ (عہ) (a Cygni) کا شمالی میل ۴۴° ۵۷′ ۱۷″ ہے (سنہ ۱۹۰۹ء)۔ ثابت کرو کہ عرض بلد ۵۳° ۲۳′ ۱۳″ پر بالائی و زیرین تکبدوں کے وقت اس کے ظاہری راسی فاصلے علی الترتیب ۸° ۲۵′ ۴۹″ اور ۸۱° ۳۳′ ۱۸″ ہیں، یہ مان لیا گیا ہے کہ انعطاف

۰٫۰۶۶ ۸۲ - مس ی = ۵۸″ ۲۹۴ مس ی

لیا جا سکتا ہے جہاں ی = ظاہری راسی فاصلہ۔

مثال ۸ — ثابت کرو کہ اگر کسی خاص آن پر ایک ستارہ کا میل انعطاف سے غیر متاثر ہو تو یہ ستارہ قطب اور راس کے درمیان تکبد کرتا ہے اور اس کا السمت زیر بحث آن پر اعظم ہے۔ [Math. Trip 1]

ستارہ قطب کے گرد جو چھوٹا دائرہ مرتسم کرتا ہے اُس کو مس کرتا ہوا ایک بڑا دائرہ راس سے کھینچا جائے تو اس سے وہ نقطہ حاصل ہوتا ہے جہاں ستارہ کا

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

راسی فاصلہ اس کے قطبی فاصلہ پر علی القوائم ہوگا - یہ ظاہر ہے کہ ستارہ جس وقت نقطہ تماس پر واقع ہو تو اس کا السمت بڑے سے بڑا ہوگا اور اس سے بڑا السمت اُسے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا -

(۱۴۱) **مثال ۹** - ثابت کرو کہ راسی فاصلہ کے اُن حدود کے اندر جنمیں انعطاف کو ک مس ی (یعنے ک × راسی فاصلہ کا مماس) لیا جا سکتا ہے کسی ستارہ کا ظاہری مقام ایک کوکبی یوم میں ایک مخروطی تراش مرتسم کرتا ہے جو قطع ناقص یا قطع زائد ہوگی بموجب اس کے کہ جب^{۲} فہ ≶ جم^{۲} ضہ جہاں ضہ ستارہ کا میل ہے اور فہ مقام کا عرض بلد -

اُس بڑے دائرہ کو جو ستارہ کے اصلی مقام سے قطب تک کھینچا گیا ہو لا کا محور لینے سے منعطف مقام کے مستوی محدد

لا = ک مس ی جم عا ، ما = ک مس ی جب عا

حاصل ہوتے ہیں جہاں ی اور عا علی الترتیب راسی فاصلہ اور اختلاف منظری زاویہ ہیں - کروی مثلث سے

جب ی جب عا = جم فہ جب ت ، جب ی جم عا = جم ضہ جب فہ - جب ضہ جم فہ جم ت

جم ی = جب ضہ جب فہ + جم ضہ جم فہ جم ت ،

$$\text{لا} = \frac{\text{ک جم ضہ جب فہ - ک جب ضہ جم فہ جم ت}}{\text{جب ضہ جب فہ + جم ضہ جم فہ جم ت}} \quad \text{ما} = \frac{\text{ک جم فہ جب ت}}{\text{جب ضہ جب فہ + جم ضہ جم فہ جم ت}}$$

اِن سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{جب ت} = \text{مس فہ} \frac{\text{ما}}{\text{لا جم ضہ + ک جب ضہ}} ،$$

$$\text{جم ت} = \text{مس فہ} \frac{\text{ک جم ضہ - لا جب ضہ}}{\text{لا جم ضہ + ک جب ضہ}}$$

اس لیے ت کو ساقط کرنے سے

ما^{۲} + (ک جم ضہ - لا جب ضہ)^{۲} = مم^{۲} فہ (لا جم ضہ + ک جب ضہ)^{۲}

جسے لکھا جا سکتا ہے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

لا۲ (جب۲ فہ - جم۲ ضہ) + ما۲ جب۲ فہ - لاک جب ۲ ضہ + ک۲ (جب۲ فہ - جب۲ ضہ) = ۰
اور یہ ایک قطع ناقص ہے یا قطع زائد بموجب اس کے کہ جب۲ فہ - جم۲ ضہ مثبت ہو یا منفی۔

مثال ۱۰ — یہ تسلیم کرکے کہ انعطاف ایک چھوٹی مقدار ہے اور راسی فاصلہ کے متناسب ہے ثابت کرو کہ اگر ایک ہی ستارہ کو مختلف مقامات سے جو ایک ہی نصف النہار پر واقع ہیں ایک ساتھ مشاہدہ کیا جائے تو اس کے ظاہری مقامات ایک بڑے دائرہ کی قوس پر واقع ہوتے ہیں۔

[Coll. Exam.]

یہ سوال حسب ذیل ہندسی مسئلہ سے جو آسانی سے ربعی مثلثوں کے قاعدوں سے ثابت ہوتا ہے (دیکھو صفحہ ۸) فوراً حل ہو جاتا ہے۔ اگر او ایک ربع ہو اور و میں سے گذرنے والا ایک متغیر بڑا دائرہ دو ثابت بڑے دائروں کو جو ا میں سے گذرتے ہیں علی الترتیب پ اور ق میں قطع کرے تو مس و پ = مس و ق مستقل ہے۔

مثال ۱۱ — اگر ایک ستارہ کا میل ضہ ہو تو ثابت کرو کہ اگر افقی انعطاف ع ہو تو ستارہ کے طلوع کا وقت ایک مقام پر جس کا عرض بلد فہ ہے تقریباً

$$\frac{ع}{۱۵ \text{ا} \text{جم}^{۲} \text{ضہ} - \text{جب}^{۲} \text{فہ}} \text{ ثانیوں}$$

سے کے تبدیل ہوتا ہے۔

حسب معمول ترقیم سے

جم ی = جب فہ جب ضہ + جم فہ جم ضہ جم ت

تفرق کرنے سے (۱۴۲)

مف ی = جم فہ جم ضہ جب ت مف ت

لیکن ستارہ چونکہ افق پر ہے اس لیے جب ی = ۱ اور

۰ = جم ی = جب فہ جب ضہ + جم فہ جم ضہ جم ت ،

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جم فہ جم ضہ جب ت = (جم^{۲} فہ جم^{۲} ضہ - جم^{۲} فہ جم^{۲} ضہ جم^{۲} ت)$^{\frac{۱}{۲}}$

= (جم^{۲} فہ جم^{۲} ضہ - جب^{۲} فہ جب^{۲} ضہ)$^{\frac{۱}{۲}}$

= (جم^{۲} ضہ - جب^{۲} فہ)$^{\frac{۱}{۲}}$

اس لیے مف ی = (جم^{۲} ضہ - جب^{۲} فہ)$^{\frac{۱}{۲}}$ مف ت

اگر مف ی قوس کے ثانیوں میں بیان کیا گیا ہو اور مف ت وقت کے ن ثانیے ہوں تو ہم رکھتے ہیں مف ی = غ اور مف ت = ۱۵ ن جن کے ن کے لیے مطلوبہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۱۲ — یہ تسلیم کرکے کہ ایک ستارہ کے راسی فاصلہ ی میں انعطاف کی باعث تغیر ک مس ی ہے جہاں ک چھوٹا ہے ثابت کرو کہ عرض بلد فہ میں ایک حائط قطبی ستارہ کے ساعتی زاویہ میں پیدا شدہ تبدیلی بڑی سے بڑی ہوگی جبکہ زاویہ ق مس مش ایک قائمہ زاویہ ہو جہاں ق قطب، مس ستارہ، اور مش افق کا شمالی نقطہ ہے۔ نیز ثابت کرو کہ اس تبدیلی کی اعظم قیمت

$$\frac{\text{ک مس فہ قط ضہ}}{\text{قط ی}_{۲}}$$

ہے جہاں ی$_{۱}$ اور ی$_{۲}$ ستارے کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے راسی فاصلے ہیں۔

ساعتی زاویے س میں انعطاف کی باعث تبدیلی ک قط ضہ جم فہ × جب س قط ی ہے اور اگر جب س قط ی اعظم ہو تو نقطہ مس، مش سے ۹۰° ہے جہاں مس، س ق کو ق سے اتنا خارج کرکے حاصل کیا گیا ہے کہ س مس = ۹۰°۔

مثال ۱۳ — یہ تسلیم کرکے کہ کسی جرم س کا انعطاف = ک مس ر س ثابت کرو کہ س، ر اور مش، ق، ف میں انعطاف کے اجزائے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

تحلیلی جن کو علی الترتیب وقت کے ثانیوں اور قوس کے ثانیوں میں بیان کیا گیا ہو تقریباً

$$\frac{ک}{۱۵} \frac{\text{مس ر ل}}{\text{جب ف جم (ف - ق ل)}} \text{ اور ک مس (ف ق ل)}$$

ہیں جہاں ف جرم کا شمال قطبی فاصلہ ہے، ق قطب، اور ر ل ایک بڑے دائرہ کی قوس ہے جو ر سے ق س پر عمود کھینچی گئی ہے۔

مثال ۱۴ — فرض کرو کہ مشاہد کا عرض بلد فہ، ایک ستارہ کا میل ضہ، اس کا مغربی ساعتی زاویہ س، اور انعطاف کا سر ۵۸″٫۴ ہے۔ ثابت کرو کہ انعطاف کی وجہ سے ساعتی زاویہ کی تبدیلی کی ظاہری شرح میں

$$۲۴٫۵ \text{ ث} \frac{\text{جب م جم م (مس ضہ + مم فہ قط س)}}{\text{قم}^۲ \text{ (ضہ + م)}} \text{ فی یوم}$$

کی کمی ہوتی ہے جہاں مس م = مم فہ جم س۔

نیز ثابت کرو کہ میل میں انعطاف کی شرح تبدیلی (۱۴۳)

$$+ ۱۵٫۳'' \frac{\text{مم فہ جب س}}{\text{قم}^۲ \text{ (ضہ + م)}} \text{ جم}^۲ \text{ م فی گھنٹہ}$$

ہے۔

انعطاف ستارہ کو اس کی طرف اُس کے اصلی مقام مس سے ظاہری مقام سَ تک اُٹھاتا ہے۔ فرض کرو کہ اصلی ساعتی زاویہ س ہے اور ظاہری ساعتی زاویہ سَ ہے۔ قوس ر ل = ۹۰ - ن کو ق س پر عمود کھینچو (شکل ۵۰)

$$(\text{س} - \text{سَ}) \text{ جم ضہ} = \text{ک مس ی جب ر س ل}$$

$$= \text{ک جم ن قط ی}$$

$$= \frac{\text{ک جم فہ جب س}}{\text{جب فہ جب ضہ + جم فہ جم ضہ جم س}}$$

ت کے لحاظ سے تفرق کرنے پر

$$\left(\frac{\text{فرس}}{\text{فرت}} - \frac{\text{فرسَ}}{\text{فرت}}\right) \text{ جم ضہ}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$= \text{ک جم فہ } \frac{\text{جم س (جیب فہ جیب ضہ + جم فہ جم ضہ جم س) + جم فہ جم ضہ جیب}^2 \text{س}}{(\text{جیب فہ جیب ضہ + جم فہ جم ضہ جم س})^2} \quad \frac{\text{فرس}}{\text{فرت}}$$

$$= \text{ک جم فہ } \frac{\text{جم فہ جم ضہ + جیب فہ جیب ضہ جم س}}{\text{جم}^2 \text{ی}} = \frac{\text{فرس}}{\text{فرت}}$$

$$= \text{ک جم فہ } \frac{\text{جیب فہ جم ضہ جم س (مس ضہ + مم فہ قط س)}}{\text{جیب}^2 (\text{ضہ + م}) \text{ جیب}^2 \text{ن}} \quad \frac{\text{فرس}}{\text{فرت}}$$

$$= \text{ک } \frac{\text{جیب فہ جم فہ جم ضہ جم س جم}^2 \text{م (مس ضہ + مم فہ قط س)}}{\text{جیب}^2 (\text{ضہ + م}) \text{ جیب}^2 \text{فہ}} \quad \frac{\text{فرس}}{\text{فرت}}$$

$$= \text{ک جم ضہ جیب م جم م } \frac{\text{مس ضہ + مم فہ قط س}}{\text{جیب}^2 (\text{ضہ + م})} \quad \frac{\text{فرس}}{\text{فرت}}$$



شکل (۵۰)

(۱۴۴) ایک کوکبی یوم میں ثانیوں کی تعداد ۸۶۴۰۰ ہوتی ہے۔ فرض کرو کہ ۸۶۴۰۰ + ع ثانیوں کی وہ تعداد ہے جو ایک مکمل گردش کے لیے مطلوب ہے اگر ستارہ کا ظاہری ساعتی زاویہ پورے دن اسی شرح سے بڑھنا جاری رکھے جو زیر بحث لمحہ پر تھی۔ پس

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$\frac{\text{فرس}}{\text{فرت}} = \frac{۲۲}{۸۶۴۰۰} \text{ ، } \frac{\text{فرس}}{\text{فرت}} = \frac{۲۲}{۸۶۴۰۰ + ع}$$

اور اس لیے

$$\left(\frac{۲۲}{۸۶۴۰۰} - \frac{۲۲}{۸۶۴۰۰ + ع}\right) = \text{ک جب م جم م} \frac{\text{مس ضہ + مم فہ قط س}}{\text{جب}^۲ (\text{ضہ + م})} \frac{۲۲}{۸۶۴۰۰}$$

چونکہ ع بہت چھوٹا ہے اس لیے ک = ۲۰۶۲۶۵\۵۸ء۴ رکھنے سے

ع = ۵ء۲۴ث جب م جم م (مس ضہ + مم فہ قط س) قم^۲ (ضہ + م)

جس میں مس م = مم فہ جم س

کسی استوائی ستارہ کے لیے

ضہ = ۰ اور ع = ۵ء۲۴ث مم م مم فہ قط س

= ۵ء۲۴ث قط^۲ س

اس طرح کوئی استوائی ستارہ خواہ وہ نصف النہار کے کسی جانب اسکے قریب ہی کیوں نہ ہو انعطاف سے اس طور پر متاثر ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی کوکبی گھڑی کے ساتھ وقت میں برابر رہتا ہے جو فی یوم ۵ء۲۴ث کی شرح سے سست رہے۔

اگر میل میں انعطاف لا ہو جیسے ثانیوں میں بیان کیا گیا ہو تو

لا = ک مس ی جم ر س ل

= ک مس (۹۰° - ضہ - م) = ک مم (ضہ + م)

اس لیے تفرق کرنے اور مف لا، مف م، اور مف س سب کو قوس کے ثانیوں میں بیان کیا ہوا سمجھنے سے

مف لا = - ک قم^۲ (ضہ + م) مف م جب ۱″

لیکن مس م = مم فہ جم س

قط^۲ م مف م = - مم فہ جب س مف س

اس لیے قط^۲ م مف لا = ک قم^۲ (ضہ + م) مم فہ جب س مف س جب ۱″

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اگر شش، قوس کے ثانیوں میں بیان کردہ وہ شرح فی ساعت ہو جس سے میل بدل رہا ہے تو مف لا \ مف س = شش \ ۱۵ × ۶۰ × ۶۰ -
اِن اندراجات کو عمل میں لانے سے اور ک اور جب آ کی قیمتیں داخل کرنے سے مطلوبہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے یعنی

شش = ۳٫۵ آ م فہ جب س قم^{۲} (ضہ + م) جم^{۲} م

یہ نتیجے سماوی عکاسی (فوٹوگرافی) کے فن میں عملی اہمیت رکھتے ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ساتواں باب

کپلر اور نیوٹن کے کلئے اور انکا استعمال

دفعہ		صفحہ
۵۰	۔ وہ کلئے جن کی بموجب سیارے سورج کے گرد حرکت کرتے ہیں اور جو ان کے موجد کپلر کے نام سے موسوم ہیں	۲۲۲
۵۱	۔ سورج کی ظاہری حرکت	۲۳۴
۵۲	۔ ناقصی حرکت محسوب کرنا	۲۳۵
۵۳	۔ ناقصی حرکت کے وہ ضابطے جو تربیعوں کے ذریعہ بیان کئے گئے ہیں	۲۵۱

۵۰ ۔ کپلر اور نیوٹن کے کلئے ۔

وہ کلئے جن کی بموجب سیارے سورج کے گرد حرکت کرتے ہیں اور جو ان کے موجد کپلر کے نام سے موسوم ہیں حسب ذیل ہیں ۔



شکل (۵۱)

(۱) ہر سیارہ کا مدار سورج کے گرد ایک قطع ناقص ہے جسکے

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ایک ماسکہ پر سورج کا مرکز واقع ہے۔

فرض کرو کہ س (شکل ۵۱) سورج کا مرکز ہے تو کسی سیارہ کا مدار ا ب پ ق ایک قطع ناقص ہے جس کا ایک ماسکہ س ہے سیارہ کی رفتار مستقل نہیں ہوتی اور وہ کلیہ جس کی بموجب اس کی چال بدلتی ہے کیپلر کے دوسرے کلیہ سے ملتا ہے۔

(۲) وہ سمتی نیم قطر جو سورج کے مرکز سے سیارہ تک کھینچا جائے مساوی وقتوں میں مساوی رقبے عبور کرتا ہے۔

مثلاً قطع ناقص پر کوئی دو نقطے ا، ب لو اور نیز دیگر دو نقطے پ، ق تو اگر رقبہ ا س ب = رقبہ پ س ق تو سیارہ جتنے وقت میں ا ب کو مرتسم کرے گا اتنے ہی وقت میں پ ق کو مرتسم کرے گا۔ اس سے یہ مستنبط ہوتا ہے کہ شکل بالا میں تعبیر شدہ نقطوں کے لحاظ سے سیارہ کی رفتار پ ق مرتسم کرتے وقت اس رفتار سے بڑی ہوتی ہے جو اس کی ا ب مرتسم کرتے وقت ہے۔

کیپلر کے پہلے دو کلیوں میں صرف ایک واحد سیارہ کی حرکت سے تعلق ہوتا ہے۔ کیپلر کے تیسرے کلیہ سے دو مختلف سیاروں کی حرکتوں کے درمیان ایک مشہور رشتہ حاصل ہوتا ہے۔ کسی سیارے کے اوسط فاصلہ کی تعریف ہم یہ کریں گے کہ وہ، سیارہ کے مدار کا نیم محور اعظم ہے اور اس کی مدت دوران یا دوری مدت کی تعریف اس وقفہ سے کیجائیگی جس میں سیارہ اپنے مدار کے پورے محیط کو طے کرلیتا ہے۔ اب کیپلر کا تیسرا کلیہ اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے:۔

(۳) دو سیاروں کی دوری مدتوں کے مربع وہی نسبت رکھتے ہیں جو سورج سے انکے اوسط فاصلوں کے مکعبوں کے درمیان ہوتی ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۔ زمین اور زہرہ کی دوری مدتیں علی الترتیب ۳۶۵٫۳ دن اور ۲۲۴٫۷ دن ہیں اور ان دوری مدتوں کے مربعوں میں نسبت

$$(۳۶۵٫۳)^۲ \setminus (۲۲۴٫۷)^۲ = ۲٫۶۴۳$$

ہے سورج سے ان کے اوسط فاصلے ۱ اور ۰٫۷۲۳۳ ہیں پس چونکہ $۱ \setminus (۰٫۷۲۳۳)^۳ = ۲٫۶۴۳$ اس لیے ان دو سیاروں کے لیے کیپلر کے تیسرے قانون کی تصدیق ہو گئی۔

کیپلر کے یہ تین کلئے جو اوپر بیان ہوئے ہیں بالکل سیاروں کی حرکتوں کے مشاہدات سے کیپلر نے اخذ کئے تھے اور ان کے اخذ کرنے میں ان قوتوں کا کہیں ذکر نہیں ہے جن کے تحت یہ حرکتیں جاری ہیں پونصدی سے زیادہ عرصہ تک یہ کلئے بغیر شرح کے محض واقعات کے طور پر قائم رہے۔ اسکے بعد نیوٹن نے ثابت کیا کہ یہ کلئے اس عالمگیر قانون تجاذب کے لازمی نتیجے ہیں جو کائنات کے ہر مادی ذرہ کی حرکت پر جاری نظر آتا ہے۔

حرکت کے وہ تین کلئے جس پر علم حرکت کی عمارت تعمیر ہوئی ہے اور جو بالعموم نیوٹن کے کلیوں کے طور پر معروف ہیں حسب طریقہ ذیل بیان کئے جا سکتے ہیں :۔

کلیہ ۱ ۔ ہر جسم اپنی سکون کی حالت میں یا ایک خط مستقیم میں اپنی یکساں حرکت کی حالت میں رہتا ہے تا آنکہ وہ عاملہ قوتوں سے اپنی حالت بدلنے پر مجبور ہو جائے۔

کلیہ ۲ ۔ حرکت کی تبدیلی قوت عاملہ کے متناسب ہوتی ہے اور اس خط مستقیم کی سمت میں واقع ہوتی ہے جس میں یہ قوت عمل کرتی ہے۔

کلیہ ۳ ۔ ہر عمل کے جواب میں اس کے مساوی اور مخالف

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ایک تعامل ہوتا ہے، یا کسی دو جسموں کے باہمی عمل مساوی اور مخالف سمتوں میں ہوتے ہیں۔

حرکت کی تبدیلی سے نیوٹن کی مُراد معیار حرکت کی شرح تبدیلی

(۱۴۷) ہے یعنے متحرک جسم کی کمیت اور اس کی رفتار کی شرح تبدیلی کا حاصل ضرب جسے دوسرے لفظوں میں کمیت اور اسراع کے حاصل ضرب کے طور پر بیان کیا جا سکتا ہے۔ کلیہ ۲ کی بناء پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حرکت کی تبدیلی (مثلاً کسی سیارہ کی صورت میں) قوت عاملہ کے متناسب ہوتی ہے اور اس خط مستقیم کی سمت میں واقع ہوتی ہے جس میں قوت عمل کرتی ہے۔

کپلر کے پہلے اور دوسرے کلیوں سے نیوٹن نے یہ ثابت کیا کہ ہر سیارہ ایک ایسی قوت کے زیر اثر حرکت کرتا ہے جس کی سمت ہمیشہ سورج کی طرف ہوتی ہے اور جو سورج سے فاصلہ کے مُربع کے بالعکس بدلتی ہے۔ کپلر کے تیسرے کلیہ سے نیوٹن نے ایک سیارہ کے اسراع کا مقابلہ دوسرے سیارہ کے اسراع کے ساتھ کیا اور اس سے وہ اُس عالمگیر تجاذب کے قانون پر پہنچا جس کے ساتھ اس کا نام وابستہ ہے اور جو یہ ہے کہ مادہ کا ہر ذرہ ہر دوسرے ذرہ کو ایک ایسی قوت سے کشش کرتا ہے جو انکی کمیتوں کے حاصل ضرب کے بالراست اور ان کے درمیانی فاصلہ کے مربع کے بالعکس متناسب ہوتی ہے۔

ہم اول یہ ثابت کرینگے کہ اگر وہ سمتی نیم قطر جو ایک ثابت نقطہ سے ایک متحرک ذرہ تک کھینچا گیا ہو مساوی وقتوں میں مساوی رقبے عبور کرے تو ذرہ پر عمل کرنے والی قوت کی سمت ہمیشہ اس ثابت نقطہ کی طرف ہونی چاہیئے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اگر سمتی نیم قطر س پ، ر ہو اور طہ وہ زاویہ جو یہ سمتی نیم قطر کسی ثابت سمت س و کے ساتھ بناتا ہے تو س پ پر اور اس کے علی القوائم



شکل (۵۲)

رفتاریں علی الترتیب

$$\frac{\text{ف ر}}{\text{ف ت}} \text{ اور } \frac{\text{ر ف طہ}}{\text{ف ت}}$$

ہیں —

صغیر وقت مف ت کے بعد متصلہ سمتی نیم قطر پر اور اس کے علی القوائم رفتاریں

$$\frac{\text{ف ر}}{\text{ف ت}} + \text{مف ت} \frac{\text{ف}^{۲}\text{ر}}{\text{ف ت}^{۲}}, \quad \frac{\text{ر ف طہ}}{\text{ف ت}} + \text{مف ت} \frac{\text{ف ر}}{\text{ف ت}} \left(\text{ر} \frac{\text{ف طہ}}{\text{ف ت}}\right)$$

ہونگی — اِن رفتاروں کو ابتدائی سمتی نیم قطر کی سمت میں تحلیل کرنے سے (جس کے ساتھ متصلہ سمتی نیم قطر زاویہ مف ت × فرطہ / فرت بناتا ہے) حاصل ہوتا ہے (۱۴۸)

$$\frac{\text{ف ر}}{\text{ف ت}} + \text{مف ت} \frac{\text{ف}^{۲}\text{ر}}{\text{ف ت}^{۲}} - \text{مف ت} \frac{\text{ر ف طہ}}{\text{ف ت}} \frac{\text{ف طہ}}{\text{ف ت}}$$

اِس لیے اگر س کی طرف اسراع — ف ہو تو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$-ف = \frac{ف ر^{۲}}{فرت^{۲}} - ر\left(\frac{فرطہ}{فرت}\right)^{۲}$$

اسی طرح رفتاروں کو ابتدائی سمتی نیم قطر کے عمود وار تحلیل کرنے سے اس سمت میں جزو تحلیلی حاصل ہوتا ہے

$$ر\frac{فرطہ}{فرت} + مف ت \frac{فر}{فرت}\left(ر\frac{فرطہ}{فرت}\right) + مف ت \frac{فرر}{فرت}\frac{فرطہ}{فرت}$$

اس لیے ابتدائی سمتی نیم قطر کے عمود وار اسراع کے لیے جملہ حاصل ہوتا ہے

$$\frac{۱}{ر}\frac{فر}{فرت}\left(ر^{۲}\frac{فرطہ}{فرت}\right)$$

سمتی نیم قطر وقت مف ت میں جتنا رقبہ عبور کرتا ہے اس کا دُگنا $ر^{۲}$ فرطہ ہے اور اگر یہ دو مقداریں مستقل نسبت رکھتی ہوں جیسا کہ کیپلر کے دوسرے کلیئہ کی بموجب ایک سیارہ کی حرکت کی صورت میں درست ہے تو

$$ر^{۲}\frac{فرطہ}{فرت} = م ، \text{مستقل}$$

اور اس لیے $$\frac{۱}{ر}\frac{فر}{فرت}\left(ر^{۲}\frac{فرطہ}{فرت}\right) = ۰$$

پس سمتی نیم قطر کے علی القوائم نہ کوئی اسراع ہے، نہ کوئی حرکت کی تبدیلی، اور اس لیے نیوٹن کے دوسرے کلیہ کی بموجب کوئی قوت بھی نہیں ہے۔ اس لیے پوری قوت، س کی طرف ہے۔ اسی طرح کیپلر کا دوسرا کلیہ اس امر کو ثابت کرتا ہے کہ سیارے ایک ایسی قوت کے زیر عمل حرکت کرتے ہیں جس کی سمت ہمیشہ سورج کے مرکز کی طرف رہتی ہے

ثانیاً یہ ثابت کرتا ہے کہ اگر کوئی جسم ایک قوت کے تحت ایک مخروطی تراش میں حرکت کرے اور اس قوت کی سمت ہمیشہ اس مخروطی تراش کے ایک ماسکہ کی طرف ہو اور اگر یہ جسم اس طور پر حرکت کرے کہ وہ سمتی نیم قطر جو اس ماسکہ سے جسم تک کھینچا گیا ہو مساوی وقتوں میں مساوی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

رقبے عبور کرے تو قوت اِس ماسکی سمتی نیم قطر کے مربع کے بالعکس متناسب ہونی چاہیئے۔

اِس ماسکہ کے حوالے سے مخروطی کی مساوات ہے

$$ر = \frac{ل}{(1 + زجم طہ)}$$

(۱۴۹) جہاں ل نیم وتر خاص ہے، ز خروج المرکز، اور طہ وہ زاویہ جو سمتی نیم قطر (ر) اُس خط کے ساتھ بناتا ہے جو حضیض کو ماسکہ سے ملاتا ہے (دفعہ ۵۲)۔

اس طرح ہمیں حسب ذیل تین مساواتیں ملتی ہیں

$$ر = \frac{ل}{(1 + زجم طہ)}، \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (۱)$$

$$\frac{ف^۲ ر}{فرت^۲} - ر\left(\frac{فرطہ}{فرت}\right)^۲ = -ف، \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (۲)$$

اور

$$ر^۲ \frac{فرطہ}{فرت} = م، \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (۳)$$

اِن مساواتوں سے ف یعنے سورج کی طرف اسراع معلوم کیا جا سکتا ہے چنانچہ (۱) کو تفرق کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ

$$\frac{ف ر}{فرت} = \frac{ل \, زجب طہ}{(1 + زجم طہ)^۲} \frac{فرطہ}{فرت} = \frac{زجب طہ}{ل} ر^۲ \frac{فرطہ}{فرت} = \frac{م}{ل} زجب طہ$$

اور

$$\frac{ف^۲ ر}{فرت^۲} = \frac{م}{ل} زجم طہ \frac{فرطہ}{فرت} = \frac{م^۲}{ل ر^۲} زجم طہ$$

نیز

$$ر\left(\frac{فرطہ}{فرت}\right)^۲ = \frac{م^۲}{ر^۲}$$

اور اِس لیے

$$\frac{ف^۲ ر}{فرت^۲} - ر\left(\frac{فرطہ}{فرت}\right)^۲$$

$$= \frac{م^۲}{ر^۲}\left\{\frac{زجم طہ}{ل} - \frac{۱}{ر}\right\}$$

$$= \frac{م^۲}{ر^۲}\left\{\frac{زجم طہ}{ل} - \frac{1 + زجم طہ}{ل}\right\} = -\frac{م^۲}{ل ر^۲}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اسراع اور اِس لیے قوت مدار کے ہر نقطہ پر ماسکہ سے فاصلہ کے مربع کے بالعکس بدلتی ہے۔ یہ نتیجہ درست ہے خواہ زکی قیمت کچھ ہی ہو، مدار ایک قطع ناقص ہو یا ایک قطع زائد یا ایک قطع مکافی۔

اگر ہم اسراع کو مہ \ ر^{۲} سے تعبیر کریں جہاں مہ، اکائی فاصلہ پر سورج کی کشش کی وجہ سے اسراع ہے تو مندرجۂ بالا ضابطوں سے حاصل ہوتا ہے

م^{۲} = مہ ل ، ..... (۴)

اب ہم کپلر کے تیسرے کلیہ سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مستقل مہ سب سیاروں کے لیے ایک ہی ہے۔ کیونکہ م، وقت کی اکائی میں مرتسمہ رقبہ کا دُگنا ہے اور اِس لیے اگر مدت دوران د ہو تو کپلر کے دوسرے کلیہ سے ہمیں حاصل ہونا چاہیے

م = ۲ π ا ب \ د

لیکن ل = ب^{۲} \ ا ۔ اِس لیے (۴) کے ذریعہ

۴ π^{۲} ا^{۳} \ د^{۲} = مہ

لیکن کپلر کے تیسرے کلیہ کی بموجب ا^{۳} \ د^{۲} سب سیاروں کے لیے (۱۵۰)
وہی ہے اور اس لیے مہ، پورے نظام شمسی میں مستقل ہے۔

اگر کسی سیارے کے مرکز سے طریق الشمس پر عمود کھینچا جائے تو سورج کے مرکز اور ♈ میں سے گذرنے والے ایک خط کو اِس عمود سے ملنے کے لیے طریق الشمس کے مستوی میں مثبت سمت میں جس قدر زاویہ میں سے گھمانا پڑتا ہے اُس کو سیارہ کا **شمس مرکزی طول بلد** کہتے ہیں۔ سورج کے ارض مرکزی طول بلد میں اگر ۱۸۰° جمع کئے جائیں تو زمین کا شمس مرکزی طول بلد حاصل ہوتا ہے۔

دو سیاروں کی **اقترانی مدت** سے مراد اُن دو متصلہ موقعوں کے درمیان اوسط وقفہ ہے جن پر یہ سیارے اقتران میں ہوتے ہیں یعنے ایک ہی شمس مرکزی طول بلد رکھتے ہیں۔ اگر وہ ایک ہی مستوی میں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

دائری مداروں پر یکساں رفتار سے حرکت کریں اور اگران کے دور علی الترتیب د، د ہوں اور وقت ت پر ان کے شمس مرکزی طول بلد ل، ل ہوں تو

$$ل = ٢ π ت \backslash د + لَ ،$$

$$ل = ٢ π ت \backslash د + لَ$$

جہاں لَ اور لَ، وقت ت = ۰ پر طول بلد کو تعبیر کرتے ہیں۔

فرض کرو کہ اقترانی مدت لا ہے اور ت وہ وقت ہے جبکہ ل-ل = ۰

تو ت + لا وہ وقت ہوگا جبکہ یہ سیارے پھر اقتران میں ہوں گے اور اُس وقت ل - ل = ٢ π (اگر د > د)۔ پس مساواتیں حاصل ہوتی ہیں

$$۰ = ٢ π ت \backslash د - ٢ π ت \backslash د + لَ - لَ ،$$

$$٢ π = ٢ π (ت + لا) \backslash د - ٢ π ت \backslash د + لَ - لَ ،$$

اِس لیے تفریق کرنے سے

$$لا = د د \backslash (د - د)$$

اگران میں سے ایک سیارہ زمین ہو، سال وقت کی اکائی، زمین کا اوسط فاصلہ طول کی اکائی، اور ا دوسرے سیارہ کا اوسط فاصلہ سورج سے تو کپلر کے تیسرے کلیئہ سے کسی بیرونی[1] سیارے کے لیے حاصل ہوتا ہے

$$لا = ا^{\frac{٣}{٢}} \backslash (ا^{\frac{٣}{٢}} - ١)$$

اور کسی اندرونی[1] سیارے کے لیے

$$لا = ا^{\frac{٣}{٢}} \backslash (١ - ا^{\frac{٣}{٢}})$$

مثال ۱۔ یہ فرض کرکے کہ زمین کا اوسط فاصلہ سورج سے ۹۲٫۹ (اکائی ..... ۱ میل) ہے اور زمین کے مدار کا خروج المرکز ۰۱۶۸٫ ہے اُس مربع کا

[1] بیرونی سیارہ سے مُراد وہ سیارہ ہے جسکا مدار زمین کے مدار کے باہر ہے اور اندرونی سیارہ سے مراد وہ سیارہ جسکا مدار زمین کے مدار کے اندر واقع ہے۔ مترجم

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ضلع معلوم کرو جس کا رقبہ اُس رقبہ کے مساوی ہو جو زمین کا سمتی نیم قطر روزانہ عبور کرتا ہے۔

نوٹ :۔ ایک سال ہمیشہ ۳۶۵٫۲۵ اوسط شمسی ایام کا لیا جا سکتا ہے جب تک کہ اس کے خلاف نہ کہا گیا ہو۔

(۱۵۱) **مثال ۲** ۔ اگر حضیض اور اوج پر ایک سیارہ کی رفتاریں علی الترتیب $و_۱$، $و_۲$ ہوں اور اگر اسکے مدار کا خروج المرکز ز ہو تو ثابت کرو کہ

$$(۱ - ز) و_۱ = (۱ + ز) و_۲$$

مثال ۳ ۔ ثابت کرو کہ کسی آن ایک سیارہ کی رفتار دو اجزائے ترکیبی میں تحلیل کی جا سکتی ہے ایک م ا ں جو سمتی نیم قطر پر عمود ہو اور دوسرے زم ا ں جو مدار کے محور اعظم پر عمود ہو۔

مثال ۴ ۔ کپلر کے دوسرے اور تیسرے کلیوں سے ثابت کرو کہ نظام شمسی کے کوئی دو سیارے ایک دئے ہوئے وقت میں جو رقبے عبور کرتے ہیں اِن کی نسبت اِن کے وتر خاص کے جذر المربعوں کی نسبت کے مساوی ہوتی ہے۔

مثال ۵ ۔ مشتری کا اوسط فاصلہ سورج سے ۵٫۲۰۳ ہے جبکہ طول کی اکائی سورج سے زمین کا اوسط فاصلہ ہو۔ مشتری کی مدت دوران ۱۱٫۸۶۲ سال اور عطارد کی مدت دوران ۰٫۲۴۰۸ سال ہے۔ ثابت کرو کہ سورج سے عطارد کا فاصلہ ۰٫۳۸۷ ہے۔

مثال ۶ ۔ مریخ کے مدار کا خروج المرکز ۰٫۰۹۳۳ ہے اور سورج سے اِس کا اوسط فاصلہ سورج سے زمین کے فاصلہ کا ۱٫۵۲۳۷ گنا ہے۔ یہ مان کر کہ زمین کا فاصلہ سورج سے ۹۲۹۰۰۰۰۰ میل ہے اور اِس کے مدار کا خروج المرکز نظر انداز کیا جا سکتا ہے زمین سے مریخ کے بڑے سے بڑے اور کم سے کم ممکن فاصلوں کی تعئین کرو۔

مثال ۷ ۔ اگر ایک سیارہ کی مدت دوران د ہو اور اِس کے نیم محور اعظم کا طول ا تو ثابت کرو کہ نیم محور اعظم میں ایک چھوٹی تبدیلی مف ا کی وجہ سے مدت دوران میں تبدیلی ۳ د مف ا / ۲ ا پیدا ہو گی۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۸ — ثابت کرو کہ کسی سیارہ کی حرکت میں جو ایک ناقصی مدار پر سورج کے گرد حسب قانون قدرت حرکت کرتا ہے غیر مقبوضہ ماسکہ کے گرد زاوئی رفتار ایسے بدلتی ہے جیسے سمتی نیم قطر اور مماس کے درمیانی زاویہ کی جیب کا مربع۔

فرض کرو کہ قطع ناقص کی ایک چھوٹی قوس فرس ہے جو سورج سے رفاصلہ پر اور غیر مقبوضہ ماسکہ سے رَ فاصلہ پر ہے۔ فرض کرو کہ فرس پر کے مماس پر ماسکوں سے عمود ع، ع ہیں۔ فرض کرو کہ طہ وہ زاویہ ہے جو ایک ماسکی نیم قطر مماس کے ساتھ بناتا ہے۔

کپلر کے دوسرے کلیئے سے فوراً یہ مستنبط ہوتا ہے کہ ع، سیارہ کی خطی رفتار کے بالعکس متناسب ہے اور اس لیے فرس مرتسم کرنے کا وقت ایسے بدلتا ہے جیسے ع فرس۔ وہ زاویہ جو غیر مقبوضہ ماسکہ کے گرد مرتسم ہوتا ہے فرس جب طہ / رَ۲ ہے اور اس لئے اس غیر مقبوضہ ماسکہ کے گرد زاوئی رفتار

∴ فرس جب طہ / رَع فرس = جب طہ / رَ ع = جب طہ / ع ع

لیکن قطع ناقص کی خاصیت کی رو سے ع ع مستقل ہوتا ہے، اس لیے مسئلہ ثابت ہو چکا

مثال ۹ — ایک سیارہ سورج کے گرد ایک ناقصی مدار پر حرکت کرتا ہے اور سورج ایک ماسکہ پر ہے۔ اگر مدار کے خروج المرکز کا مربع نظر انداز کیا جا سکے تو ثابت کرو کہ سیارہ کی زاوئی رفتار دوسرے ماسکہ کے گرد یکساں ہو گی۔

مثال ۱۰ — تختہ ذیل کی مدد سے جو بحری جنتری بابتہ ۱۸۹۰ء سے اخذ کیا گیا ہے ثابت کرو کہ زمین کے مدار کا خروج المرکز تقریباً ۰۱۶۸ ہے۔ (۱۵۲)

	سورج کا طول بلد	
یکم جنوری	۲۸۱° ۵′ ۳۰٫۶″	
۲ ؍ ؍	۲۸۲° ۶′ ۳۹٫۷″	
یکم جولائی	۹۹° ۳۲′ ۱۹٫۱″	
۲ ؍ ؍	۱۰۰° ۲۹′ ۲۹٫۶″	[Coll. Exam.]

مثال ۱۱ — اگر ایک صغیر سیارہ کے مدار کو طریق الشمس کے مستوی میں ایک دائرہ تسلیم کیا جائے تو ثابت کرو کہ سیارہ اور سورج کے طول بلد کے فرق کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

دو مشاہدات معہ گذرے ہوئے وقت کے علم کے نصف قطر متعین کرنے کے لیے کافی ہیں۔ نیز ثابت کرو کہ ایسے تین مشاہدات مدار کی تعئین کریں گے اگر اُسے قطع مکافی مان لیا جائے۔

طول بلد کے فرق کے ایک واحد مشاہدہ سے یہ معلوم ہوگا کہ سیارہ ایک معلوم خط مستقیم پر واقع ہونا چاہیے یعنی اُس خط پر جو زمین کے مرکز میں سے طریق الشمس کے اُس نقطہ تک کھینچا گیا ہو جو سورج سے مشاہدہ کردہ فاصلہ پر واقع ہے۔ جب ایسے دو خطوط مستقیم معلوم ہو جائیں تو ایک دائرہ جس کا مرکز سورج پر ہو ان میں سے ہر خط کو دو نقطوں میں قطع کرے گا۔ اگر ایک خط مستقیم پر کا ایک نقطہ تقاطع اور دوسرے خط مستقیم پر کا ایک نقطہ تقاطع سورج پر وہ زاویہ بنائیں جس سے اُس نصف قطر کیلئے وقت کا مشاہدہ کردہ وقفہ حاصل ہو جائے تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پس آزمائش سے اس طریقہ پر نصف قطر کی تعئین ہو گی۔ نصف قطر کی مساوات بھی معلوم کیجا سکتی ہے لیکن یہ بھی صرف آزمائش سے حل کی جا سکتی ہے۔

مثال ۱۲ — ثابت کرو کہ ایک مدت اقتران میں کوئی سفلی سیارہ نصف النہار کو اتنے ہی مرتبہ عبور کرتا ہے جتنی مرتبہ سورج لیکن کوئی علوی سیارہ ایک مرتبہ زائد عبور کرے گا۔

مثال ۱۳ — مشتری کے چوتھے قمر کا مداری دَور

	دن	گھنٹے	منٹ	ثانیئے
	۱۶	۱۸	۵	۶٫۹
=	۱۶٫۷۵۳۵۵۲	دن		

ہے اور پانچویں قمر کا دور ۱۱ گھنٹے ۵۷ منٹ ۲۲٫۶ ثانیئے = ۰٫۴۹۸۲۳۶ دن ہے کپلر کے تیسرے کلیئہ کی مدد سے مشتری سے ان دو قمروں کے اوسط فاصلوں کی نسبت معلوم کرو۔

مثال ۱۴ — یہ مان کر کے مریخ کے قمر دیموس (Deimos.) اور فوبوس (Phobos.) دائری مداروں میں گردش کرتے ہیں اور یہ کہ ۲۳ ستمبر ۱۹۰۹ء کے تقابل (Opposition.) پر مریخ کے مرکز سے دیموس کا بڑے سے بڑا مشاہدہ کردہ فاصلہ ۲۳٫۱ تھا کپلر کے تیسرے کلیئہ سے ثابت کرو کہ فوبوس کا بڑے سے بڑا ظاہری

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

فاصلہ ۲۳۴۲ء ہے جبکہ یہ دیا گیا ہو کہ فوبوس کی مدت دوران ۷ گھنٹے ۳۹ منٹ ۱۳ء۸۵ ثانیئے ہے اور دیموس کی ۳۰ گھنٹے ۱۷ منٹ ۵۴ء۸۶ ثانیئے۔

۵۱ ۔ سورج کی ظاہری حرکت ۔

سورج کے گرد زمین کی گردش سے سورج کے ظاہری مقام اور اس کی ظاہری جسامت دونوں میں تبدیلیاں ہوتی ہیں جبکہ سورج کو زمین سے دیکھا جاتا ہے۔ اب ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ مظہر جس سے ہمیں اس باب میں واسطہ ہے بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیا جا سکتا ہے اگر زمین فی الواقعی ساکن ہوتی اور سورج زمین کے گرد ایک ایسے مدار پر حرکت کرتا جو کپلر کے کلیوں کے مطابق ہوتا اور شکل اور ناپ میں سورج کے گرد زمین کے مدار کے مماثل ہوتا۔ (۱۵۳)

فرض کرو کہ س (شکل ۵۳) سورج ہے اور ز۱ اور ز۲ زمین کے دو محل ہیں ۔ ز۱ سے سورج سمت ز۱ س میں نظر آتا ہے اور اس کا فاصلہ ز۱ س ہے۔

شکل ۵۴ میں ز سے ز۱ س۱، ز۱ س کے متوازی اور مساوی کھینچو۔ اسی طرح فرض کرو کہ ز۲ س۲، ز۲ س کے مساوی اور متوازی ہے اگر اسے نقطوں ز۳، س۳، وغیرہ کے دوسرے زوجوں کے لیے دہرایا جائے تو وہ قطع ناقص جو س۱، س۲، .... سے مرتسم ہوگا شکل اور ناپ میں بالکل اس قطع ناقص کے مماثل ہوگا جو ز۱، ز۲، وغیرہ سے مرتسم ہوتا ہے۔ ثانی الذکر قطع ناقص سورج کے گرد زمین کا حقیقی راستہ ہے اور اول الذکر وہ راستہ ہے جسے سورج زمین کے گرد مرتسم کرتا نظر آتا ہے۔ ہر آن سورج کی ظاہری سمت اور اس کا فاصلہ وہی ہوتے ہیں خواہ ہم یہ سمجھیں کہ زمین ثابت سورج کے گرد گھوم رہی ہے (شکل ۵۳) یا یہ سمجھیں کہ سورج ثابت زمین کے گرد گھوم رہا ہے (شکل ۵۴)۔

اگر سورج کا نصف قطر ا ہو اور زمین سے سورج کے مرکز کا فاصلہ ر ہو (یہاں ہم سورج کے مرکز کو ایک نقطہ تصور کرینگے) تو سورج کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ظاہری نیم قطر ا کی زاویئی قیمت جبکہ زمین سے دیکھا جائے جب آ ا ر ہے۔



شکل (۵۳)



شکل (۵۴)

یہ زاویہ چونکہ چھوٹا ہے اس لیے ہم اس کی قیمت قوس کے ثانیوں میں کافی تقریب کے طور پر ا = ا ر جب آ لے سکتے ہیں۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ر، ا کے بالعکس بدلتا ہے، اس لیے اگر سال کی دو مختلف تاریخوں پر ا کو مشاہدہ سے معلوم کیا جائے تو سورج کے اضافی فاصلے ان تاریخوں پر فوراً حاصل ہوتے ہیں۔

مثال ۔ بتاریخ ۳ر جنوری ۱۹۰۹ء سورج کا زاویئی نیم قطر ۱۶ آ ۵۸، ۱۷ ہے، اس وقت سورج زمین سے کم سے کم فاصلہ پر ہے۔ بتاریخ ۴ر جولائی ۱۹۰۹ء سورج کا زاویئی نیم قطر ۱۵ آ ۳۷، ۵۴ ہے، اوس وقت سورج زمین سے زیادہ سے زیادہ فاصلہ پر ہے۔ ان مفروضات سے ثابت کرو کہ زمین کے مدار کا خروج المرکز ۰،۰۱۶۷ ہے۔

۵۲ ۔ ناقصی حرکت محسوب کرنا۔ (۱۵۴)

فرض کرو کہ ف زمین کا مرکز ہے اور و پ وَ قطع ناقص ہے جس کا ماسکہ ف ہے اور جس میں سورج اپنی سالانہ گردش کی تکمیل کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس ناقص کا محور اعظم و وَ ہے اور اس کا مرکز ج ہے۔ اور اس کا نصف قطر ج و = ½ و وَ = ا۔ خط ق پ ھ، و وَ پر

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



شکل (۵۵)

عمود ہے اور ف پ = ر۔
فرض کرو کہ زاویہ وف پ = د
اور زاویہ وج ق = ء۔
اس لیے مبداء ف اور محور
ف و کے لحاظ سے پ
کے قطبی محدد د، ر ہیں۔ زاویوں
د اور ء کو علی الترتیب اصلی
بے قاعدگی (True anomaly)
اور خروج المرکزی بے قاعدگی
(Eccentric anomaly)
کہتے ہیں۔

نقطے و اور وَ جو قطع ناقص کے محور اعظم کے سرے ہیں مدار کے اوجین کہلاتے ہیں۔ اوج و جو زمین سے قریب ترین ہے قریب ارضی (Perigee.) کہلاتا ہے اور اوج وَ جو زمین سے بعید ترین ہے بعید ارضی (Apogee.) کہلاتا ہے۔ وقت اس لمحہ سے ناپا جاتا ہے جو (Epoch.) کے طور پر مشہور ہے جبکہ سورج قریب ارضی و میں سے گذرتا ہے۔ اگر سورج کے گرد زمین کی حقیقی حرکت زیر بحث ہوتی تو نقطوں و اور وَ کو علی الترتیب حضیض اور اوج کہتے۔ نیز یہ قابل یاد داشت ہے کہ ج ف = ز ج و = زا۔

اب ہمیں یہ دکھانا ہے کہ سورج کے قطبی محدد کس طرح معلوم کئے جاتے ہیں جبکہ وقت دیا گیا ہو۔ ت کی رقوم میں ر اور د کی محدود قیمتیں حاصل کرنا ممکن نہیں ہے لیکن خروج المرکزی بے قاعدگی ء کی مدد سے سلسلوں میں بھلے حاصل کئے جا سکتے ہیں جن سے ر اور د کی قیمتیں کسی مطلوبہ تقرب تک محسوب کی جا سکتی ہیں۔

کیپلر کے دوسرے کلیئے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ت وہ وقت ہو جسمیں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

سورج و سے پ تک حرکت کرتا ہے اور اگر مدار کی مدت دوران ت ہو تو

ت : ت :: رقبہ وف پ : ناقص کا رقبہ

اگر ہم ن سے اوسط حرکت کو تعبیر کریں یعنی اگر ن اُس زاویہ کی اوسط قیمت کا دائری ناپ ہو جو اکائی وقت میں سمتی نیم قطر سے عبور ہوتا ہے تو ن = ۲ π / ت (۱۵۵)
اور چونکہ ناقص کا رقبہ π ا ب ہے اِس لیے

ن ت = ۲ × رقبہ وف پ / ا ب

زاویہ ن ت بہت اہمیت رکھتا ہے، اسے ہم اوسط بے قاعدگی (Mean anomaly) کہیں گے اور اس کو ط سے تعبیر کریں گے۔

قطع ناقص کے خواص سے پ ھ / ق ھ = ب / ا، اس لیے

رقبہ و ھ پ

= ب × وھ ق / ا = ب (وج ق - ھ ج ق) / ا

= ½ ا ب (ع - جب ع جم ع)

نیز رقبہ ف ھ پ

= ب × ق ھ × ف ھ / ۲ ا = ½ ا ب (جب ع جم ع - ز جب ع)

اِس لیے وف پ = وھ پ + ف ھ پ = ½ ا ب (ع - ز جب ع)

اور آخر الامر ط = ع - ز جب ع ، ..... (۱)

پس ط، ع کی رقوم میں بیان ہو چکا اور اب ہم د کو ع کی رقوم میں اِس طرح بیان کر سکتے ہیں :-

قطع ناقص سے ہم دیکھتے ہیں کہ

ر جم د = ا جم ع - ا ز ،

ر جب د = ب جب ع

اِس لیے مربع لینے اور جمع کرنے سے

ر = ا (۱ - ز جم ع) ، ..... (۲)

۲ ر جب² ½ د = ر (۱ - جم د) = ا (۱ - ز جم ع - جم ع + ز)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$= ر (۱+ز)(۱-\text{جم}\, ع)$$

$$۲ر\, \text{جم}^{۲} \tfrac{۱}{۲} و = ر(۱+\text{جم}\, و) = ر(۱-ز\,\text{جم}\, ع + \text{جم}\, ع - ز)$$

$$= ر(۱-ز)(۱+\text{جم}\, ع)$$

اور بالآخر

$$\text{مس}\, \tfrac{۱}{۲} و = \sqrt{\frac{ز+۱}{ز-۱}}\, \text{مس}\, \tfrac{۱}{۲} ع \,، \quad \ldots\ldots\ldots (۳)$$

***[لگرانج کے مسئلہ کا اطلاق** ۔ اگر ہم (۱) اور (۳) سے ع کو ساقط کر سکیں تو ط اور و کے درمیان ایک رشتہ ملجاتا ہے لیکن یہ مساواتیں ماورائی نوعیت کی ہیں اور اس لیے محدود رقموں میں ایسا اسقاط ناممکن ہے ۔ تاہم لگرانج کے مسئلہ کی مدد سے ہم و کو ط کی رقوم میں ز کی صعودی قوتوں کے ایک سلسلہ کے ذریعہ بیان کر سکتے ہیں ۔ اس سلسلہ سے ط اور ز کی دی ہوئی قیمتوں کے لیے ہم و کو کسی مطلوبہ درجہ صحت تک محسوب کر سکیں گے ۔

لگرانج کا مسئلہ یہ ہے :۔ اگر یہ دیا گیا ہو کہ

$$ی = لا + ما\, فہ (ی) \,، \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (۱)$$

جس میں لا اور ما تبوع متغیر ہیں اور اگر فا (ی) ، ی کا کوئی تفاعل ہو تو (۱۵۶)

$$فا(ی) = فا(لا) + ما\, فہ(لا)\, فَا(لا) + \frac{ما^{۲}}{۲\times۱} \frac{فر}{فر لا} [\{فہ(لا)\}^{۲} فَا(لا)]$$

$$+ \ldots\ldots + \frac{ما^{ن}}{۱\times۲\times\ldots ن} \frac{فر^{ن-۱}}{فر لا^{ن-۱}} [\{فہ(لا)\}^{ن} فَا(لا)] + \ldots (۱)$$

جس میں فَا(لا) حسب معمول $\frac{فر}{فر لا} \{فا(لا)\}$ کو تعبیر کرتا ہے ۔

اس کا اطلاق زیر بحث صورت پر کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم ی کی بجائے ع ، لا کی بجائے ط ، ما کی بجائے ز لکھیں اور اگر فہ (ع) = جب ع

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

رکھیں تو مساوات (۱) مساوات (۱) کے مماثل ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازیں اگر ہم (۳) کو شکل و = فا (ع) میں لکھیں تو مساوات (۱) سے حاصل ہوتا ہے

$$و = فا(ع) = فا(ط) + ز جب ط فا'(ط) + \frac{ز^۲}{۲|} \frac{فر}{فرط} \{جب^۲ ط فا''(ط)\}$$

$$+ \frac{ز^۳}{۳|} \frac{فر^۲}{فرط^۲} \{جب^۳ ط فا'''(ط)\} + ... (ب)$$

لیکن مساوات (۳) سے اُس مشہور مثلثی پھیلاؤ کے ذریعہ جو صفحہ ۲۴۵ میں ثابت کیا گیا ہے حاصل ہوتا ہے

$$و = فا(ع) = ع + ۲\{ج جب ع + \frac{۱}{۲} ج^۲ جب ۲ع + \frac{۱}{۳} ج^۳ جب ۳ع + ...\}$$

جہاں $ج = \{۱ - \sqrt{(۱ - ز^۲)}\} \div ز$ ۔ اس لیے

$$فا(ط) = ط + ۲\{ج جب ط + \frac{۱}{۲} ج^۲ جب ۲ط + \frac{۱}{۳} ج^۳ جب ۳ط + ...\}$$

اور اس لیے

$$فا'(ط) = ۱ \times ۲\{ج جم ط + ج^۲ جم ۲ط + ج^۳ جم ۳ط + ...\}$$

پس مساوات (ب) کی بائیں جانب کی سب رقمیں محسوب کیجا سکتی ہیں اور اس طرح و صحت کے کسی مطلوبہ درجہ تک حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھو ضابطہ (۷) صفحہ ۲۴۷]

کپلر کا مسئلہ ۔ مساوات (۱) کے حل کرنے کو یعنی ع کے متعین کرنے کو جبکہ ط دیا گیا ہو کپلر کا مسئلہ کہتے ہیں۔

فرض کرو کہ ع کی ایک تقریبی قیمت ع۱ ہے جو تخمین سے یا کسی اور ذریعہ سے حاصل ہوئی ہے اور فرض کرو کہ

$$ع_۱ - ز جب ع_۱ = ط_۱$$

اگر ع کی اصلی قیمت ع۱ + مف ع۱ ہو تو (۱) میں اندراج کرنے سے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

تقریبی طور پر حاصل ہوتا ہے

$$\text{مف ع} = \frac{\text{ط} - \text{ط}_0}{\text{ا} - \text{ز جم ع}_0} \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (۴)$$

(۱۵۶) کاگنولی نے یہ ثابت کیا ہے کہ تقرب کے اس طریقہ میں زیادہ صحت حاصل کی جا سکتی ہے اگر ضابطہ (۴) کی بجائے ضابطہ

$$\text{مف ع} = \frac{\text{ط} - \text{ط}_0}{\text{ا} - \text{ز جم}\{\text{ع}_0 + \frac{1}{2}(\text{ط} - \text{ط}_0)\}}$$

استعمال کیا جائے۔

جیسا کہ آڈمس (Adams)[1] نے بیان کیا ہے یہ دونوں طریقے دراصل نیوٹن کے مجوزہ ہیں۔

کپلر کے مسئلہ کو ترسیمی طریقوں کی مدد سے حل کرنیکے لیے متعدد عمل استعمال کئے جا چکے ہیں۔ ان میں سے ایک ترسیمی حل یہاں درج کیا جاتا ہے جس کے لیے میں ڈاکٹر رامبو (Dr. Rambaut)[2] کا ممنون ہوں۔



شکل (۵۶)

تین ہم مرکز دائرے (شکل ۵۶) کھینچو جنکے نصف قطر علی الترتیب

ج ب = ب،

ج ف = ا ز اور

ج م = ا ہوں۔

ان دائروں کو علی الترتیب صغیر دائرہ، ماسکی دائرہ، اور کبیر دائرہ کے

[1] "Collected works" Vol. 1. p. 291

[2] "Monthly Notices" R. A. S. vol. LXVI p. 518. کے ساتھ مقابلہ کرو۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

نام سے موسوم کیا جائے گا۔ کبیر دائرہ کے کسی نقطہ ا سے ابتدا کر کے اس کا دریچہ ا ت شر کھینچو۔ فرض کرو کہ ج ا وہ سمت ہے جہاں سے اوسط بے قاعدگی ط (= زاویہ ا ج م) کی پیمائش کی جاتی ہے۔ اب ط کے جواب میں ر، ع، و کی قیمتیں معلوم کی جا سکتی ہیں۔

فرض کرو کہ ج م ماسکی دائرہ کو ف پر قطع کرتا ہے۔ ف پر دریچہ کا عماد کبیر دائرہ کا مماس ہے۔ فرض کرو کہ اس کا نقطہ تماس ع ہے تو ج ع جو صغیر دائرہ کو ق پر قطع کرتا ہے ف ت کے متوازی ہے۔ دریچہ کی لازمی خاصیت کی رو سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قوس ا ع = ع ت، (۱۵۸) لیکن

ع ت = ج ف جب ف ج ع = ا ز جب ف ج ع

اسلیے ا ز جب ف ج ع = ا (زاویہ ف ج ع - زاویہ ا ج ف)

جو سادہ شکل

ط = ع - ز جب ع

اختیار کرتا ہے اگر ہم زاویہ ف ج ع = ع رکھیں۔

اگر ع سے ج ف پر عمود ع ر اور ق سے ع ر پر عمود ق و کھینچے جائیں تو

ف و جم م ف و = ج ع جم ع - ج ف = ا جم ع - ا ز،

ف و جب م ف و = ج ق جب ع = ب جم ع

پس جب مذکورۂ بالا تین دائرے اور دریچہ ا ت شر کھینچ لئے جائیں تو کپلر کے مسئلہ کے حل کو اختصاراً اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے:۔

کبیر دائرہ پر ایک نقطہ م ایسا لو کہ زاویہ ا ج م = ط۔ نقطہ ف سے جو ج م اور ماسکی دائرہ کا نقطہ تقاطع ہے دریچہ کا مماس ف ت کھینچو اور ج میں سے ج ق ع، ف ت کے متوازی کھینچو جو کبیر اور صغیر دائروں کو علی الترتیب ع اور ق پر قطع کرے۔

تب زاویہ ا ج م = ط، زاویہ م ف و = و،

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

زاویہ م ج ع = ء ، ف و = ر

اور مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔

[باؤشینگر (Bauschinger)[1] کی جدولیں اور اسی قسم کی دوسری جدولیں ء معلوم کرنے کے سوال کو حل کرنے میں بڑی مدد دیتی ہیں جبکہ ط اور ز دئے گئے ہوں۔ ہم اِن کے استعمال کی توضیح حسب ذیل سوال سے کرتے ہیں۔

ہیلی کے دُمدار تارے (Comet) کے مدار کے لئے حسب ذیل مفروضہ عناصر دئے گئے ہیں:۔

خروج المرکز ز = ۰٫۹۶۱۷۳۳

حضیض سے گذرنے کا وقت = ۲۴ر مئی سنہ ۱۹۱۰ء

دَورِ د = ۷۶٫۰۸۵ سال

اس تارے کی خروج المرکزی اور اصلی بے قاعدگیاں بتاریخ ۲۴ر مئی سنہ ۱۹۰۰ء معلوم کرو۔

اوسط حرکت = ۳۶۰° ⁄ د اور چونکہ حضیض پر پہنچنے کے لیے ابھی دس سال باقی ہیں اس لیے

$$ط = \frac{۶۰'' \times ۶۰ \times ۳۶۰ \times ۱۰}{۷۶٫۰۸۵} = ۱۷۰''۳۳۵٫۸$$

$$= ۴۷° ۱۸' ۵۵٫۸''$$

(۱۵۹) دوہرے داخلہ کی باؤشینگر کی جدولیں دلیلوں ط = ۴۷٫۳° اور ز = ۰٫۹۶۱ کے لیے دیکھنے سے خروج المرکزی بے قاعدگی کی تقریبی قیمت

ع = ۱۰۱٫۳°

حاصل ہوتی ہے۔

[1] دیکھو باؤشینگر کی "Astronomical Tables" جس کو Engelmann, Leipzig نے شائع کیا ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

پھر ضابطہ (۴) سے ہم مف ع کو حسب طریقہ ذیل محسوب کرتے ہیں:-

ل جب ع = ۹٫۹۹۱۴۹۸۴	ل جم ع = ۹٫۲۹۲۱۴ (ن)
ل ز = ۹٫۹۸۳۰۵۴۷	ل ز = ۹٫۹۸۳۰۵
لوک قم آ = ۵٫۳۱۴۴۲۵۱	ل زجم ع = ۹٫۲۷۵۱۹ (ن)
لوک زجب ع = ۵٫۲۸۸۹۷۸۲	∴ ۱- زجم ع = ۱٫۱۸۸۴
زجب ع = ۱۹۴۵۲۶٫۲ آ	لوک (ط - ظ) = ۲٫۲۶۰۰۷
= ۵۴° ۲′ ۶٫۲″	لوک (۱- زجم ع) = ۰٫۰۷۴۹۶
ع = ۱۰۱° ۱۸′ ۰٫۰″	لوک مف ع = ۲٫۱۸۵۱۱
ظ = ۴۷° ۱۵′ ۵۳٫۸″	مف ع = ۱۵۳٫۱۵ آ
ط = ۴۷° ۱۸′ ۵۵٫۸″	= ۲° ۲′ ۳۳٫۱۵″
	ع = ۱۰۱° ۱۸′ ۰٫۰۰″
∴ ط - ظ = ۱۸۲٫۰ آ	∴ ع = ۱۰۱° ۲۰′ ۳۳٫۱۵″

یہ قیمت ع کی اصلی قیمت سے بہت زیادہ قریب ہونی چاہئے۔ اس کی تصدیق کے لیے ہم دوسرے تقرب کا عمل کرتے ہیں۔

ل جب ع	= ۹٫۹۹۱۴۳۳۸
ل ز	= ۹٫۹۸۳۰۵۴۷
لوک قم آ	= ۵٫۳۱۴۴۲۵۱
لوک زجب ع	= ۵٫۲۸۸۹۱۳۶
زجب ع	= ۱۹۴۴۹۷٫۳۱ آ
	= ۵۴° ۱′ ۳۷٫۳۱″
ع	= ۱۰۱° ۲۰′ ۳۳٫۱۵″
ظ	= ۴۷° ۱۸′ ۵۵٫۸۴″
ط	= ۴۷° ۱۸′ ۵۵٫۸۰″

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$\therefore \quad ط - ط_{1} = -۰٫۰۴''$$

یہ خفیف فرق بالکل قابل نظر انداز ہے لیکن اگر اس کا لحاظ کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ۱- زجم ع$_{1}$ اور ۱- زجم ع ہیں جسے محسوب کیا جا چکا ہے قابل قدر فرق نہیں ہوگا اور ہمیں حاصل ہوگا

$$\text{مف ع}_{1} = \frac{ط - ط_{1}}{۱ - \text{زجم ع}_{1}} = \frac{ط - ط_{1}}{۱ - \text{زجم ع}} = \frac{-۰٫۰۴''}{۱٫۲} = -۰٫۰۳''$$

اور اس لیے بالآخر $ع = ۱۰۱^{\circ}\ ۲۰'\ ۱۲٫۳۳''$

خروج المرکزی بے قاعدگی ع = ۱۰۱° ۲۰' ۱۲٫۳۳'' معلوم کر لینے کے بعد ہم اسے مساوات (۳) میں و معلوم کرنے کے لیے درج کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مساوات (۳) کو شکل

$$\text{مس } \tfrac{1}{2} \text{و} = \text{مس } (\tfrac{1}{2}\pi + \tfrac{1}{2} \text{فہ}) \text{ مس } \tfrac{1}{2} ع$$

میں لکھ لینا سہولت کا باعث ہے جہاں جب فہ = ز -

(۱۶۰) اگرچہ باؤشینگر کی جدولیں مطلوبہ قیمت کو ایک اچھے تقرب تک فوراً حاصل کر لینے کے لیے مفید ہیں تاہم وہ ناگزیر نہیں ہیں۔ ترسیمی طریقوں میں سے کسی ایک سے ع کی تعئین اس کی اصلی قیمت سے تین یا چار درجوں کے اندر فوراً ہو جائے گی۔ پھر ہم چار مقامی لوکارتموں کی مدد سے ایک قیمت اتنی صحت کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں جتنی جدولوں سے حاصل کرنا ممکن ہے۔ مثلاً اگر ہم نے ترسیمی عمل سے ع = ۱۰۵° حاصل کیا ہے تو اسکے بعد طریقہ ذیل انجام پا سکتا ہے:-

ل جب ع = ۹٫۹۸۴۹	ل جم ع = ۹٫۴۱۳۰ (ن)
لوک ز قم آ = ۵٫۲۹۷۵	ل ز = ۹٫۹۸۳۱
لوک زجب ع = ۵٫۲۸۲۴	ل زجم ع = ۹٫۳۹۶۱ (ن)
زجب ع = ۱۹۱۶۰۰''	۱- زجم ع = ۱٫۲۴۹
= ۱۳٫۳۵۳'	

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ع = ۱۰۵ ؍ ۰ ؍ ۰	لوک (ط - ظ) = ۰ ؍ ۶۴۹۳ (ن)
ظ = ۵۱ ؍ ۴۶ ؍ ۷	لوک (۱ - ز جم ع) = ۰ ؍ ۰۹۶۶
ط = ۴۷ ؍ ۱۸ ؍ ۹	لوک مف ع = ۷ ؍ ۵۵۲۷ - (ن)
ط - ظ = - ۴ ؍ ۸ ؍ ۲۷	مف ع = - ۳ ؍ ۶ °
= - ۴ ؍ ۴۶ °	ع = ۱۰۵ ؍ ۰
	ع = ۱۰۱ ؍ ۴

اکثر صورتوں میں جو مسئلے پیش ہوتے ہیں ان میں خروج المرکز بہت چھوٹا ہوتا ہے، مثلاً سورج کے گرد زمین کی حرکت میں خروج المرکز ۱ ؍ ۵۹ ؍ ۷ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ ایسی صورتوں میں سب سے بہتر یہ ہے کہ سورج کی اصلی بے قاعدگی و کے لیے ط کی رقوم میں ایک تقریبی جملہ ایک سلسلہ کی شکل میں حاصل کیا جائے، اس سلسلہ کو اکثر مقاصد کے لئے ز ۳ سے آگے لیجانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔]

ز کی بجائے جب فہ لکھنے سے دفعہ ۵۲ مساوات (۳) سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{مس } \tfrac{1}{2} \text{و} = \text{مس } \tfrac{1}{2} \text{ع} \, (1 + \text{مس } \tfrac{1}{2} \text{فہ}) \sqrt{(1 - \text{مس } \tfrac{1}{2} \text{فہ})}$$

اس لیے اگر نیپیری لوکارتموں کی اساس مو ہو تو

$$(\text{مو}^{\text{خ و}^{2}} - \text{مو}^{-\text{خ و}^{2}}) \sqrt{(\text{مو}^{\text{خ و}^{2}} + \text{مو}^{-\text{خ و}^{2}})}$$

$$= (1 + \text{مس } \tfrac{1}{2} \text{فہ})(\text{مو}^{\text{خ ع}^{2}} - \text{مو}^{-\text{خ ع}^{2}}) \sqrt{(1 - \text{مس } \tfrac{1}{2} \text{فہ})(\text{مو}^{\text{خ ع}^{2}} + \text{مو}^{-\text{خ ع}^{2}})}$$

یا $\text{مو}^{\text{خ و}} = \text{مو}^{\text{خ ع}} (1 - \text{مو}^{-\text{خ ع}} \text{مس } \tfrac{1}{2} \text{فہ}) \sqrt{(1 - \text{مو}^{-\text{خ ع}} \text{مس } \tfrac{1}{2} \text{فہ})}$

اور طرفین کے لوکارتم لینے سے

$$\text{و} = \text{ع} + 2 (\text{مس } \tfrac{1}{2} \text{فہ جب ع} + \tfrac{1}{2} \text{مس}^{2} \tfrac{1}{2} \text{فہ جب ۲ ع} + \dots)$$

اس ضابطہ کو خروج المرکز ز کی رقوم میں بیان کرنے کے لیے حاصل ہوتا ہے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$\text{مس}\frac{1}{2}\text{فہ} = (1-\sqrt{1-ز^2})\big/ز = \frac{1}{2}ز + \frac{1}{8}ز^3 + \dots$$

اور اندراج سے

$$و = ۶ + (ز + \frac{1}{4}ز^3)\text{جب}۶ + \frac{1}{4}ز^2\text{جب}۲۶ + \frac{1}{12}ز^3\text{جب}۳۶ \dots (۵)$$

(۱۶۱) اب اِس ضابطہ اور

$$ط = ۶ - ز\text{جب}۶$$

سے ۶ کو ساقط کرنا باقی ہے۔

پہلے تقریب کے طور پر رکھو

$$۶ = ط + ز\text{جب}ط$$

اگر $ز^2$ کے آگے کی رقمیں نظر انداز کی جائیں تو

$$۶ = ط + ز\text{جب}(ط + ز\text{جب}ط)$$
$$= ط + ز\text{جب}ط + \frac{1}{2}ز^2\text{جب}۲ط$$

اور اس سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{جب}۶ = (1-\frac{1}{2}ز^2)\text{جب}ط + \frac{1}{2}ز\text{جب}۲ط + \frac{3}{8}ز^2\text{جب}۳ط$$

اِسے مساوات

$$۶ = ط + ز\text{جب}۶$$

میں درج کرنے سے

$$۶ = ط + (ز - \frac{1}{8}ز^3)\text{جب}ط + \frac{1}{2}ز^2\text{جب}۲ط + \frac{3}{8}ز^3\text{جب}۳ط$$

$$\dots\dots (۶)$$

نیز ز کی پہلی قوت تک

$$\text{جب}۲۶ = \text{جب}۲ط + ز(\text{جب}۳ط - \text{جب}ط)$$

اِن قیمتوں کو مساوات (۴) میں داخل کریں تو حاصل ہوتا ہے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$و = ط + (۲ ز - \frac{۱}{۴} ز^{۳}) جب ط + \frac{۵}{۴} ز^{۲} جب ۲ط + \frac{۱۳}{۱۲} ز^{۳} جب ۳ط$$

..... (۷)

یہ مساوات علم ہیئت میں ایک اساسی مساوات ہے۔ اس سے کسی سیارہ کی اصلی بے قاعدگی اس کی اوسط بے قاعدگی کی رقوم میں حاصل ہوتی ہے۔ یہاں اسے خروج المرکز کی تیسری قوت تک محسوب کیا گیا ہے لیکن موجودہ مقاصد کے لیے تیسری قوت بالعموم بہت چھوٹی ہوتی ہے اور اس لیے ناقابل توجہ، پس ضابطہ

$$و = ط + ۲ ز جب ط + \frac{۵}{۴} ز^{۲} جب ۲ط$$

کو یہاں کافی صحیح ضابطہ سمجھا جائے گا۔

اصلی بے قاعدگی اور اوسط بے قاعدگی کے فرق یعنی و - ط کو مرکز کی مساوات کہتے ہیں اور اسے

$$۲ ز جب ط + \frac{۵}{۴} ز^{۲} جب ۲ط$$

سے تعبیر کرتے ہیں۔

اوسط بے قاعدگی کو اصلی بے قاعدگی کی رقوم میں بیان کرنا

۔ وہ صغیر رقبہ جو سمتی نیم قطر سے عبور ہوتا ہے جبکہ سیارہ کی اصلی بے قاعدگی بقدر فرو کے بڑھتی ہے $\frac{۱}{۲} ز^{۲}$ فرو ہے۔ اگر اس رقبہ کو مرتسم کرنے میں وقت فرت صرف ہو اور اگر سیارہ کی مدت دوران ت ہو تو کپلر کے دوسرے کلیہ سے

$\frac{۱}{۲} ز^{۲}$ فرو : π ا ب :: فرت : ت

اگر وقت فرت میں اوسط بے قاعدگی میں اضافہ فرط ہو تو (۱۶۲)

فرط : ۲π :: فرت : ت

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اس لیے $\frac{\text{فرط}}{\text{فرو}} = \frac{\text{ر}^2}{\text{ار ب}}$ ، ..... (۸)

اس مساوات کو حسب ذیل طریقہ پر بھی لکھا جا سکتا ہے

$$\frac{\text{فرط}}{\text{فرو}} = \frac{(\text{ا} - \text{ز}^2)^{\frac{3}{2}}}{(\text{ا} + \text{ز جم و})^2}$$

اسلیے $\text{ط} = (\text{ا}-\text{ز}^2)^{\frac{3}{2}} \int (\text{ا} - 2\,\text{ز جم و} + 3\,\text{ز}^2 \text{جم}^2 \text{و} - 4\,\text{ز}^3 \text{جم}^3 \text{و})$ فرو

اور تکمل سے

$\text{ط} = \text{و} - 2\,\text{ز جب و} + \frac{3}{4}\,\text{ز}^2 \text{جب ۲ و} - \frac{1}{3}\,\text{ز}^3 \text{جب ۳ و}$ .... (۹)

جس میں ز کی تین سے اعلیٰ ترقومیں نظر انداز کی گئی ہیں ۔

[* **عام پھیلاؤ** ۔ یہ سلسلہ حسب طریقہ ذیل حاصل کیا جا سکتا ہے ۔

(۸) سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\text{فرط}}{\text{فرو}} = \text{جم}^2 \text{فہ} \frac{\text{فر}}{\text{فرفہ}} \left(\frac{\text{جب فہ}}{\text{ا + جب فہ جم و}}\right) \text{جہاں ز} = \text{جب فہ}$$

اگر ہم لا = و خود رکھیں تو اس کی تصدیق کرنا آسان ہے کہ

$$\frac{\text{جب فہ}}{\text{ا + جب فہ جم و}} = \text{مس فہ} \left\{ \frac{1}{\text{ا + مس } \frac{1}{2} \text{فہ} \times \text{لا}} - \frac{\text{مس } \frac{1}{2} \text{فہ} \times \text{لا}^1}{\text{ا + مس } \frac{1}{2} \text{فہ} \times \text{لا}^1} \right\}$$

$$= \text{مس فہ} \left\{ \text{ا} + 2 \sum (-1)^{\text{ک}} \text{جم ک و} \times \text{مس}^{\text{ک}} \tfrac{1}{2} \text{فہ} \right\}$$

اور اس لیے

$$\frac{\text{فرط}}{\text{فرو}} = \text{جم}^2 \text{فہ} \frac{\text{فر}}{\text{فرفہ}} \left[\text{مس فہ} \left\{ \text{ا} + 2 \sum (-1)^{\text{ک}} \text{جم ک و} \times \text{مس}^{\text{ک}} \tfrac{1}{2} \text{فہ} \right\} \right]$$

$$= \text{ا} + 2 \sum (-1)^{\text{ک}} \text{جم ک و} \times \text{مس}^{\text{ک}} \tfrac{1}{2} \text{فہ}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$+۲ \text{ جب فہ جم فہ } \Sigma_{ک=۱}^{ک=\infty}(-۱)^{ک} \text{ جم ک و } \frac{\text{فرفہ}}{(\text{مس ک } \frac{۱}{۲} \text{ فہ})}$$

$$= ۱ + ۲ \Sigma_{ک=۱}^{ک=\infty}(-۱)^{ک} \text{ جم ک و} \times \text{مس ک } \frac{۱}{۲} \text{ فہ}$$

$$+۲ \text{ جب فہ جم فہ } \Sigma_{ک=۱}^{ک=\infty}(-۱)^{ک} \text{ جم ک و} \times \text{مس ک } \frac{۱}{۲} \text{ فہ} \times ک \frac{۱ + \text{مس}^{۲} \frac{۱}{۲} \text{ فہ}}{۲ \text{ مس } \frac{۱}{۲} \text{ فہ}}$$

$$= ۱ + ۲ \Sigma_{ک=۱}^{ک=\infty}(-۱)^{ک} \text{ جم ک و} \times \text{مس ک } \frac{۱}{۲} \text{ فہ } (۱ + ک \text{ جم فہ})$$

تکمل کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ

$$ط = و + ۲ \Sigma_{ک=۱}^{ک=\infty}(-۱)^{ک} \frac{\text{مس ک } \frac{۱}{۲} \text{ فہ}}{ک} (۱ + ک \text{ جم فہ}) \text{ جب ک و}$$

تکمل کا مستقل صفر ہے کیونکہ ط اور و ایک ساتھ معدوم ہوتے ہیں۔ اس سلسلہ (۱۶۳)
کی پہلی چار رقمیں ہیں

$$ط = و - ۲ \text{ مس } \frac{۱}{۲} \text{ فہ } (۱ + \text{جم فہ}) \text{ جب و}$$

$$+ \text{ مس}^{۲} \frac{۱}{۲} \text{ فہ } (۱ + ۲ \text{ جم فہ}) \text{ جب ۲ و}$$

$$= \frac{۲}{۳} \text{ مس}^{۳} \frac{۱}{۲} \text{ فہ } (۱ + ۳ \text{ جم فہ}) \text{ جب ۳ و}$$

اگر ز کی تین سے اعلیٰ تر قوتیں نظر انداز کی جا سکیں تو

$$\text{فہ} = ز + \frac{۱}{۶} ز^{۳}, \quad \text{جم فہ} = ۱ - \frac{۱}{۲} ز^{۲} \text{ اور مس } \frac{۱}{۲} \text{ فہ} = \frac{۱}{۲} ز + \frac{۱}{۸} ز^{۳}$$

اور اس لیے حسب سابق حاصل ہوتا ہے

$$ط = و - ۲ ز \text{ جب و} + \frac{۳}{۴} ز^{۲} \text{ جب ۲ و} - \frac{۱}{۳} ز^{۳} \text{ جب ۳ و}]$$

مثال ۱ — یہ دیا گیا ہے کہ

$$ط = و - ۲ ز \text{ جب و} + \frac{۳}{۴} ز^{۲} \text{ جب ۲ و} - \frac{۱}{۳} ز^{۳} \text{ جب ۳ و}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جہاں ز ایک چھوٹی مقدار ہے جس کی تین سے اعلیٰ تر سب قوتیں نظر انداز کیگئی ہیں سلسلہ کو الٹا کر ثابت کرو کہ

$$و = ط + (ز - \frac{1}{4} ز^3) \text{ جب } ط + \frac{5}{4} ز^2 \text{ جب } ۲ط + \frac{13}{12} ز^3 \text{ جب } ۳ط$$

مثال ۲ — ثابت کرو کہ کسی سیارہ کی حرکت کی سمت اور اس کے سمتی نیم قطر کے درمیانی زاویہ کا مماس $\sqrt{۱ - ز^2} \div ز$ جب ع ہے۔

مثال ۳ — اگر خروج المرکز جب فہ اکائی کے بہت ہی قریب ہو تو ثابت کرو کہ اوسط بے قاعدگی ط، اصلی بے قاعدگی و کی رقوم میں حسب ذیل ضابطہ کے ذریعہ بیان ہو سکتی ہے

$$ط = \frac{۲ جم^3 فہ}{(۱ + جب فہ)^2} (لا + \frac{لا^3}{۳} - ۲ \frac{۱ - جب فہ}{۱ + جب فہ} \{\frac{لا^3}{۳} + \frac{لا^5}{۵}\})$$

جہاں لا = مس $\frac{1}{2}$ و۔

مثال ۴ — مساوات ط = ع - ز جب ع سے ع کو حل کرنے کا حسب ذیل ترسیمی طریقہ ثابت کرو جو جے۔ سی۔ آڈمس[1] نے دیا ہے:۔

جیوب کا منحنی ما = جب لا کھینچو۔ میدا و سے محور لا پر و م = ط ناپ لو۔ م میں سے ایک خط کھینچو جو محور لا سے زاویہ مم' ز بنائے اور فرض کرو کہ یہ خط منحنی کو نقطہ پ پر قطع کرتا ہے۔ تب پ کا فاصلہ ع ہے۔

مثال ۵ — مساوات ط = ع - ز جب ع کے حل کے لیے لیویریر (Leverrier) کا قاعدہ ثابت کرو اگر ز کی تین سے اعلیٰ تر قوتیں نظر انداز کی جا سکتی ہوں

$$ع = ط + \frac{ز جب ط}{۱ - ز جم ط} - \frac{1}{2} (\frac{ز جب ط}{۱ - ز جم ط})^3$$

---

[1] نیز دیکھو راوتھ کی Dynamics of a Particle صفحہ ۲۵۲ اور Monthly Notices, R.A.S. Vol. L. صفحہ ۳۰۱

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۶ — اگر ایک سیارہ کا طول بلد طہ ہو جو خالی ماسکہ کے گرد ایک اوج سے ناپا گیا ہے تو ثابت کرو کہ

$$\text{طہ} = \text{ن ت} + \frac{1}{4} \text{ز}^2 \text{جب ۲ ن ت}$$

اگر ز کی دوسے اعلیٰ تر قوتیں نظر انداز کیجائیں۔

(۱۶۴) * **مثال ۷** — اگر ج (طہ)، $\frac{1}{2}$ (طہ + ج طہ) کو تعبیر کرے تو ثابت کرو کہ مساوات طہ = ع − ز جب ع کو حسب ذیل شکل میں لکھا جا سکتا ہے۔

$$\text{ط} = \text{ج} (\text{فہ} + \text{ع}) - \text{ج} (\text{فہ} - \text{ع})$$ جہاں ز = جب فہ

نیز بتاؤ کہ ج (طہ) کی قیمتوں کی ایک جدول سے کپلر کے مسئلہ کو حل کرنے میں کس طرح آسانی پیدا ہوتی ہے۔

دیکھو مسٹر آلڈس (Aldis) کا مضمون مندرجہ منتھلی نوٹیس آر۔ اے ایس جلد ۶۲ صفحہ ۶۳۳ جس میں یہ جدول دی گئی ہے اور اس کے استعمال کی مثالیں درج ہیں۔

۵۳ — ناقصی حرکت کے وہ ضابطے جو تربیعوں کے ذریعہ بیان کئے گئے ہوں۔

فرض کرو کہ سیارہ کے حنیض کا طول بلد جسے مدار کے مستوی میں ایک ثابت سمت سے پیمائش کیا گیا ہے حہ ہے اور سیارہ کا طول بلد طہ ہے اور اصلی بے قاعدگی وہ = (طہ − حہ)۔ مقدار ب^2 ا کول سے تعبیر کیا گیا ہے اور مدت دوران د ہے۔

قطع ناقص کے خواص سے سمتی نیم قطر ر کے لیے حاصل ہوتا ہے

$$\text{ر} = \frac{\text{ل}}{1 + \text{ز جم} (\text{طہ} - \text{حہ})} \quad \ldots\ldots\ldots (1)$$

کسی جرم کے لیے جو سورج کے گرد حرکت کرتا ہو حسب دفعہ ۵۰ حاصل ہوتا ہے

$$\text{ر}^2 \text{فہ طہ فرت} = \sqrt{\text{مہ ل}} \quad \ldots\ldots\ldots (2)$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۲) کو فرت کے لیے حل کرنے، (۱) سے ر کی قیمت درج کرنے، اور تکمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$ت = \frac{ل^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{مہ}} \int_{حہ}^{طہ} \frac{فرطہ}{\{۱ + زجم (طہ - حہ)\}^{۲}} \quad \ldots\ldots (۳)$$

جہاں ت وہ وقت ہے جس میں سیارہ حضیض سے اصلی بے قاعدگی و = (طہ - حہ) تک ایک مدار پر جس کا خروج المرکز ز اور وتر خاص ل ہے حرکت کرتا ہے۔ مساوات بالا کو متجانس شکل

$$\frac{ت}{د^{\frac{3}{2}}} = \frac{ل^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{۴ ط^{۲}}} \int_{و}^{فرو} \frac{۱}{\{۱ + زجم (و)\}^{۲}}$$

میں بھی لکھا جا سکتا ہے جہاں ا، د علی الترتیب زمین کا اوسط فاصلہ اور مدت دوران ہیں۔

(۱) کو ت کے لحاظ سے تفرق کرنے پر

$$\frac{فرر}{فرت} = \frac{ل زجب (طہ - حہ)}{\{۱ + زجم (طہ - حہ)\}^{۲}} \quad \frac{فرطہ}{فرت} = زجب (طہ - حہ) \quad \frac{ر^{۲}}{ل} \quad \frac{فرطہ}{فرت}$$

$$= ز\sqrt{مہ} \; جب (طہ - حہ) \sqrt{ل}$$

$$\text{نیز} \quad ر \frac{فرطہ}{فرت} = \sqrt{مہ} \{۱ + زجم (طہ - حہ)\}^{۲} \sqrt{ل}$$

اور اس لیے سیارہ کی رفتار کے مربع کے لیے حاصل ہوتا ہے

$$\left(\frac{فرر}{فرت}\right)^{۲} + ر^{۲} \left(\frac{فرطہ}{فرت}\right)^{۲} = مہ \{۱ + ۲ زجم (طہ - حہ) + ز^{۲}\} ل$$

$$= ۲ مہ \sqrt{ر} - مہ \sqrt{ا}$$

(۱۶۵) اسے متجانس شکل

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$\left(\frac{1}{ا}-\frac{2}{ر}\right)\frac{ا^2 ب^2 \pi^2 4}{د^2}$$

میں بیان کیا جا سکتا ہے جو عمل حساب کے لیے زیادہ سہولت بخش ہے۔

اگر مدار قطع مکافی ہو جیسا کہ وہ مدار ہوتا ہے جس میں دُمدار ستارونکی بڑی اکثریت گردش کرتی ہے تو اس صورت میں ز = ۱ اور ا = ∞ اسلیے ضابطے (۱) اور (۳) ہو جاتے ہیں

$$\left.\begin{aligned} ر &= \frac{1}{2} ل قط^2 \frac{1}{2}(ط - ح) \\ ت &= \frac{د ل^3}{3 ا^2 \pi^2 4}\left\{مس^3 \frac{1}{2}(ط-ح) + \frac{1}{3} مس^3 \frac{1}{2}(ط-ح)\right\} \end{aligned}\right\} \ldots (۴)$$

یہ نتیجہ جس پر ہم پہنچے ہیں یوں بیان کیا جا سکتا ہے :- فرض کرو کہ کسی سیارہ (مثلاً زمین) کی مدت دوران اور اوسط فاصلہ علی الترتیب د، ا ہیں۔ اگر ایک دُمدار ستارہ کے مکافی مدار کا وتر خاص ل ہو تو وہ وقت جس میں یہ دُمدار ستارہ حضیض سے اصلی بے قاعدگی و تک گذرتا ہے حسب ذیل ہے

$$د ل^3 (مس^3 \frac{1}{2} و + \frac{1}{3} مس^3 \frac{1}{2} و) \div 4 \pi^2 ا^{\frac{3}{2}}$$

یولر کا مسئلہ - مکانی حرکت کی ایک مشہور خاصیت یُولر کے مسئلہ میں بیان ہوئی ہے۔ یولر کے مسئلہ کا دعوے حسب ذیل ہے۔

اگر کسی دُمدار ستارے کے مکافی مدار میں دو نقطے ج اور ج لیے جائیں اور سورج سے ان نقطوں تک سمتی نیم قطر ر اور ر ہوں اور اگر فاصلہ ج ج، ک ہو تو ج سے ج تک حرکت کرنے میں دُمدار ستارے کو جو وقت لگیگا وہ

$$\frac{د}{\pi 12}\left\{\left(\frac{ر + ر + ک}{ا}\right)^{\frac{3}{2}} - \left(\frac{ر + ر - ک}{ا}\right)^{\frac{3}{2}}\right\}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہوگا جہاں ج کوکبی سال کا طول ہے اور ر زمین کا اوسط فاصلہ ہے۔
اختصار کی خاطر ہم رکھتے ہیں

$$ق = ج ل^{-\frac{3}{2}} \sqrt{۲}\,۳\,۴^{-\frac{1}{2}}\,،\quad لا = مس^{\frac{1}{2}} و\,،\quad لا' = مس^{\frac{1}{2}} و'\,،\quad س = (ر + ر' + ک)\sqrt{۲}$$

تو
$$ت' - ت = ق\left\{ لا' - لا + \frac{1}{۳}(لا'^{۳} - لا^{۳}) \right\}$$
$$= \frac{1}{۳} ق (لا' - لا)(۱ + لا^{۲} + ۱ + لا'^{۲} + ۱ + لا لا')$$

لیکن قطع مکافی کی خاصیتوں سے

$$۱ + لا^{۲} = ۲ر \backslash ل\,،\quad ۱ + لا'^{۲} = ۲ر' \backslash ل\,،$$

$$۱ + لا لا' = قط \frac{1}{۲} و قط \frac{1}{۲} و جم \frac{1}{۲}(و' - و) = \frac{۲ \sqrt{ر ر'}}{ل} \sqrt{\frac{س(س - ک)}{ر ر'}}$$

اس لیے

$$ت' - ت = ۲ق(لا' - لا)(ر + ر' + \sqrt{س \times س - ک}) \sqrt{۳ل}$$
$$= ۲ق(لا' - لا)(س + س - ک + \sqrt{س \times س - ک}) \sqrt{۳ل}$$

(۱۶۶) لیکن چونکہ

$$(لا' - لا)^{۲} = ۱ + لا'^{۲} + ۱ + لا^{۲} - ۲(۱ + لا لا')$$
$$= ۲\{س + س - ک - ۲\sqrt{س(س - ک)}\} \backslash ل$$
$$= ۲\{\sqrt{س} - \sqrt{س - ک}\}^{۲} \backslash ل$$

اِس لیے
$$ت' - ت = ۲ق \sqrt{۲} \{س^{\frac{3}{2}} - (س - ک)^{\frac{3}{2}}\} \sqrt{۳} ل^{-\frac{3}{2}}$$
$$= ق\{(ر + ر' + ک)^{\frac{3}{2}} - (ر + ر' - ک)^{\frac{3}{2}}\} ۲ ل^{-\frac{3}{2}}$$

اِس میں ق کی بجائے اِس کی قیمت رکھنے سے مطلوبہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

* **لیمبرٹ کا مسئلہ** — یولر کا مسئلہ قطع مکافی میں حرکت سے متعلق ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اس کی ایک اہم توسیع اُس عام تر صورت کے لیے جو قطع ناقص میں حرکت سے متعلق ہے لیمبرٹ (Lambert) نے بیان کی ہے جسے حسب ذیل طریقہ پر واضح کیا جا سکتا ہے۔

اگر ایک سیارہ اُس محل سے جہاں سمتی نیم قطر ر ہے اُس محل تک جہاں سمتی نیم قطر رَ ہے حرکت کرنے میں وقت ت لے اور اگر ان دو محلوں کا درمیانی وتر ک ہو تو

$$۲\pi ت \sqrt{د} = (عا - جب عا) - (عَا - جب عَا)$$

جہاں جب $\frac{۱}{۲}$ عا $= \frac{۱}{۲} \sqrt{\frac{ر + رَ + ک}{ا}}$ اور جب $\frac{۱}{۲}$ عَا $= \frac{۱}{۲} \sqrt{\frac{ر + رَ - ک}{ا}}$

اور سیارہ کی مدت دوران د ہے۔

چونکہ [۱]

$$ر = ا (۱ - ز جم ع)\ ،\ رَ = ا (۱ - ز جم عَ)\ ،$$

$$ک^۲ = ا^۲ (جم ع - جم عَ)^۲ + ا^۲ (۱ - ز^۲) (جب ع - جب عَ)^۲\ ،$$

$$۲\pi ت \sqrt{د} = ع - عَ - ز (جب ع - جب عَ)$$

$$= ع - عَ - ۲ ز جب \tfrac{۱}{۲} (ع - عَ) جم \tfrac{۱}{۲} (ع + عَ)$$

اس لیے $(ر + رَ) \sqrt{۱۲ ا} = ۱ - ز جم \frac{۱}{۲} (ع + عَ) جم \frac{۱}{۲} (ع - عَ)$،

$$ک^۲ \sqrt{۱۴ ا^۲} = جب^۲ \tfrac{۱}{۲} (ع - عَ) \{۱ - ز^۲ جم^۲ \tfrac{۱}{۲} (ع + عَ)\}\ ،$$

$$۲\pi ت \sqrt{د} = ع - عَ - ۲ ز جم \tfrac{۱}{۲} (ع + عَ) جب \tfrac{۱}{۲} (ع - عَ)\ ،$$

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ا اور اس لیے د معلوم ہوں تو (ر + رَ) ک، اور ت مقداروں ع - عَ اور ز جم $\frac{۱}{۲}$ (ع + عَ) کے تفاعل ہیں۔

---

[۱] ثبوت جو یہاں دیا گیا ہے آڈمس سے منسوب ہے، Collected papers. Vol. I, p, 411 نیز دیکھو راوتھ کی Dynamics of a Particle صفحہ ۲۲۸ —

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۱۶۷) اب فرض کرو کہ

غ − ظ = ۲ عہ اور ز جم ½ (ظ + غ) = جم بہ

تو (ر + ر′)\ ۱۲ ا = ۱ − جم عہ جم بہ ، ک\ ۱۲ ا = جیب عہ جیب بہ

اس لیے (ر + ر′ + ک)\ ۱۲ ا = ۱ − جم (بہ + عہ)،

(ر + ر′ − ک)\ ۱۲ ا = ۱ − جم (بہ − عہ)

نیز ۲ π ت\ د = ۲ عہ − ۲ جیب عہ جم بہ

= {بہ + عہ − جیب (بہ + عہ)} − {بہ − عہ − جیب (بہ − عہ)}

اس میں بہ + عہ = عا اور بہ − عہ = عا رکھنے سے لیمبرٹ کا مسئلہ حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۱ — ثابت کرو کہ ایک ناقصی مدار میں جس کا اوسط فاصلہ ا ہے اوسط بے قاعدگی ط حسب ذیل مختلف طریقوں سے بیان کی جا سکتی ہے:۔

ط = ۲ π ا^{-۳/۲} ت\ ا^{۳/۲} د = ۲ π ا^{-۳/۲} (۱ − ز^۲)^{۳/۲} ت\ ا^{۳/۲} د = ت\ √(مہ ا^۳)

جہاں سورج سے زمین کا اوسط فاصلہ ا ہے اور کوکبی سال کا طول د ہے۔

مثال ۲ — اگر اوسط بے قاعدگی ط ہو، اصلی بے قاعدگی و، اور خروج المرکز ز تو ثابت کرو کہ

$$\frac{1}{2}ط = (1-ز)\left(\frac{1-ز}{1+ز}\right)^{\frac{1}{2}} مس\frac{1}{2}و - \frac{1-3ز}{3}\left(\frac{1-ز}{1+ز}\right)^{\frac{3}{2}} مس\frac{3}{2}و$$

$$+ \frac{1-5ز}{5}\left(\frac{1-ز}{1+ز}\right)^{\frac{5}{2}}$$

اور اس مساوات کو ذیل کی مساوات میں تبدیل کرو:

$$\frac{ت\ \sqrt{(مہ)}}{2\ ل^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{(1+ز^2)^2} مس\frac{1}{2}و - \frac{1-3ز}{(1+ز)^3} مس\frac{3}{2}و$$

$$+ \frac{1-5ز}{5}\frac{1-ز}{(1+ز)^4} مس\frac{5}{2}و - \ldots\ldots\ldots$$

[Edinburgh Degree Examination, 1907]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہمیں معلوم ہے

$$ط = ع - ز جب ع$$

$$= ۲\left\{ مس^{-۱}\left(\sqrt{\frac{۱-ز}{۱+ز}}\, مس \frac{۱}{۲} و\right) - ز \sqrt{\frac{۱-ز}{۱+ز}}\, مس \frac{۱}{۲} و \right\} \Big/ \left\{ ۱ + \frac{۱-ز}{۱+ز} مس^{۲} \frac{۱}{۲} و \right\}$$

$\sqrt{\frac{۱-ز}{۱+ز}}\, مس \frac{۱}{۲} و$ کی بجائے ل لکھو تو

$$\frac{۱}{۲} ط = مس^{-۱} ل - ز \frac{ل}{۱+ل^{۲}}$$

$$= ل - \frac{۱}{۳} ل^{۳} + \frac{۱}{۵} ل^{۵} - \ldots\ldots - ز ل (۱ - ل^{۲} + ل^{۴} - ل^{۶} + \ldots)$$

$$= (۱-ز) ل - \frac{۱-۳ز}{۳} ل^{۳} + \frac{۱-۵ز}{۵} ل^{۵} - \ldots\ldots$$

$$= (۱-ز)\left(\frac{۱-ز}{۱+ز}\right)^{\frac{۱}{۲}} مس \frac{۱}{۲} و - \frac{۱-۳ز}{۳}\left(\frac{۱-ز}{۱+ز}\right)^{\frac{۳}{۲}} مس^{۳} \frac{۱}{۲} و$$

$$+ \frac{۱-۵ز}{۵}\left(\frac{۱-ز}{۱+ز}\right)^{\frac{۵}{۲}} مس^{۵} \frac{۱}{۲} و - \ldots\ldots$$

لیکن $$ن = \frac{\sqrt{مہ}}{ل^{\frac{۳}{۲}}} = (۱-ز^{۲})^{\frac{۳}{۲}} \frac{\sqrt{مہ}}{ل^{\frac{۳}{۲}}}$$ (۱۶۸)

$$\therefore \quad ط = (۱-ز^{۲})^{\frac{۳}{۲}} \frac{\sqrt{مہ}}{ل^{\frac{۳}{۲}}} ت$$

اسلیے $$\frac{\sqrt{مہ}\, ت}{۲\, ل^{\frac{۳}{۲}}} = \frac{۱}{(۱+ز)^{۲}} مس \frac{۱}{۲} و - \frac{۱-۳ز}{۳(۱+ز)^{۳}} مس^{۳} \frac{۱}{۲} و$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$+ \frac{1-5ز}{5} \frac{1-ز}{(1+ز)^4} \text{مس}^5 \tfrac{1}{2}و - \dots\dots$$

میکانی مدار کے لیے دفعہ ۵۳ کی مساوات (۴) حاصل ہوئی تھی، اس کے جواب میں قطع ناقص یا قطع زائد کے لیے مساوات بالا حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہمیں ز = ۱ رکھا جائے تو ہمیں صرف یہ مساوات حاصل ہوتی ہے:

$$\sqrt{\text{امہ}}\, ت = \tfrac{1}{2} ل^{\frac{3}{2}} \left\{ \text{مس} \tfrac{1}{2}و + \tfrac{1}{3} \text{مس}^3 \tfrac{1}{2}و \right\}$$

کیونکہ دوسری رقم کے بعد سب رقموں میں (۱-ز) ایک جزو ضربی کے طور پر شامل ہے

مثال ۳ — ثابت کرو کہ ایک دُمدار ستارہ زمین کے مدار کے اندر جتنا وقت صرف کرتا ہے وہ ایک سال کا $\sqrt{۲} \backslash ۳ ۱۱$ $(۱-ط)^{\frac{3}{2}} (۱+۲ط)$ حصہ ہے جہاں ط دُمدار ستارے کا حقیقی فاصلہ ہے اور فاصلہ کی اکائی زمین کا شمس مرکزی فاصلہ ہے جسے مستقل سمجھا گیا ہے۔ دُمدار ستارے کے مدار کا ایک قطع مکافی ہونا اور اس کا طریق الشمس کے مستوی میں ہونا تسلیم کر لیا گیا ہے۔

چونکہ ل = ۲ ط اس لیے حضیض سے اصلی بے قاعدگی و تک وقت کے لیے جملہ حاصل ہوتا ہے

$$\frac{3}{2} ط^{\frac{3}{2}} \left(\text{مس} \tfrac{1}{2}و + \tfrac{1}{3} \text{مس}^3 \tfrac{1}{2}و \right) \backslash ۱۱ \sqrt{۲}$$

نیز $ر = ط \text{ قط}^2 \tfrac{1}{2}و$

اس لیے جم $\tfrac{1}{2}و = ط$ سے اُس نقطہ کی اصلی بے قاعدگی متعین ہوگی جہاں دُمدار ستارہ زمین کے مدار کو عبور کرتا ہے۔ اس لیے مس $\tfrac{1}{2}و$ کی بجائے اندراج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\left\{ \left(\frac{1-ط}{ط} \right) \frac{1}{3} + \sqrt{\frac{1-ط}{ط}} \right\} \frac{\frac{3}{2} ط^{\frac{3}{2}}}{۱۱ \sqrt{۲}}$$

جو زمین کے مدار سے حضیض تک وقت ہے اور اس وقفہ کا دُگنا سوال کا جواب ہے

اس جملہ کی بڑی سے بڑی قیمت $\sqrt{۲} \backslash ۳ ۱۱$ ہے جبکہ ط = $\tfrac{1}{2}$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

* **مثال ۴** — دو سیارے ہم مستوی مداروں میں حرکت کر رہے ہیں۔ ثابت کرو کہ جب یہ سیارے ایک دوسرے سے قریب ترین ہوتے ہیں تو ان کے طول بلدوں طہ اور طَہ کو حسب ذیل دو مساواتیں پوری کرنی چاہئیں :—

$$ت + ل^{\frac{3}{2}} \int_{حہ}^{طہ} \frac{\text{فرطہ}}{(1+\text{زجم}(\text{طہ}-\text{حہ}))^2} - ت - ل^{\frac{3}{2}} \int_{حہ}^{طہ} \frac{\text{فرطہ}}{(1+\text{زجم}(\text{طہ}-\text{حہ}))^2} = 0$$

اور $\frac{\text{ز}}{\sqrt{\text{ال}}}$ جب (طہ − حہ) $\{ر - رَ\text{جم}(\text{طہ}-\text{طَہ})\} + \frac{\text{زَ}}{\sqrt{\text{ال}}}$ جب (طہ − حہ) $\{رَ - ر\text{جم}(\text{طہ}-\text{طَہ})\}$

$$+ \text{جب}(\text{طہ}-\text{طَہ})\sqrt{\text{ال}}\,\text{رَ} - \sqrt{\text{ال}}\,\frac{\text{رَ}}{\text{ر}} = 0$$

جہاں ت اور تَ وہ لمحات ہیں جن پر یہ سیارے حضیض میں سے گذرتے ہیں۔

پہلی مساوات سے صرف یہ بیان ہوتا ہے کہ سیارے ایک ہی آن پر طول بلد طہ اور طَہ رکھتے ہیں۔

دوسری مساوات معلوم کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ر^2 − ۲ ررَ جم (طہ − طَہ) (۱۶۹)
+ رَ^{2} کو اقل ہونا چاہئے، اس لیے

$$\text{ر}\frac{\text{فرر}}{\text{فرت}} - \text{رَ}\frac{\text{فرر}}{\text{فرت}}\text{جم}(\text{طہ}-\text{طَہ}) - \text{ر}\frac{\text{فررَ}}{\text{فرت}}\text{جم}(\text{طہ}-\text{طَہ}) + \text{رَ}\frac{\text{فررَ}}{\text{فرت}}$$

$$+ \text{ررَ جب}(\text{طہ}-\text{طَہ})\left(\frac{\text{فرطہ}}{\text{فرت}} - \frac{\text{فرطَہ}}{\text{فرت}}\right) = 0$$

اسمیں $\frac{\text{فرر}}{\text{فرت}} = \frac{\text{ز}}{\sqrt{\text{ال}}}$ جب (طہ − حہ)، $\frac{\text{فرطہ}}{\text{فرت}} = \frac{\sqrt{\text{ال}}}{\text{ر}^2}$ درج کرنے سے دوسری مساوات حاصل ہوتی ہے۔

اگر ز اور زَ دونوں چھوٹے ہوں تو طہ اور طَہ تقریباً مساوی ہیں اور دوسری مساوات اس طرح لکھی جا سکتی ہے

$$(1 - \text{ا}^2)\{\text{ز}\sqrt{\text{ا}^2}\,\text{جب}(\text{طہ}-\text{حہ}) - \text{زَ}\sqrt{\text{ا}^2}\,\text{جب}(\text{طَہ}-\text{حہ})\}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$+ (ا^{\frac{3}{2}} - ا_{\frac{3}{2}}) \text{ جب } (\text{طہ} - \text{طَہ}) = ٠$$

* **مثال ۵** — ثابت کرو کہ زمین سے ایک سیارہ کا فاصلہ جس کا مدار طریق الشمس کے مستوی میں ہے بالعموم اقل نہیں ہوگا جبکہ سیارہ تقابل میں ہو سوائے اُس صورت کے جبکہ زمین اُن دو نقطوں میں سے ایک یا دوسرے پر ہو جو سیارے کے مدار میں ہیں، لیکن اگر سیارہ اور زمین کے مداروں کے حضیضوں کے شمس مرکزی طول بلد ایک ہی ہوں اور اِن کے وتر خاص خروج المرکزوں کی نسبت متناۃ میں ہوں تو محولہ بالا فاصلہ ہر تقابل پر اقل ہوگا۔ [Math. Trip. 1. 1900]

اسے سوال ۴ سے اخذ کیا جا سکتا ہے یا دوسری طرح حسب ذیل طریقہ پر ثابت کیا جا سکتا ہے :-



شکل (۵۷)

فرض کرو کہ وقت ت پر اِن دو سیاروں کے محل پ، ق (شکل ۵۷) ہیں اور وقت ت + مف ت پر اِن کے محل پَ، قَ ہیں۔ اب اگر پ ق اقل یا اعظم ہو تو ہمیں حاصل ہونا چاہئے پ ق = پَ قَ - اِس لیے

پ پَ جم پ پ ن = ق قَ جم ق قَ ن

فرض کرو زاویہ ا ف پ = طہ، زاویہ ا ف ق = طَہ، زاویہ ا ن پ = سہ، زاویہ ف پ پَ = فہ، ف ق قَ = فَہ، ف پ = ر اور ف ق = رَ تو

پ پَ جم فہ = - فر، پ پَ جب فہ = ر فرطہ

اِس لیے

پ پَ جم پ پ ن = پ پَ جم (فہ - طہ + سہ)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$= -$ فرجم (طہ - سہ) + رفرطہ جب (طہ - سہ)

$= \{ -$ زجب (طہ - حہ) جم (طہ - سہ) $\sqrt{\text{ال}}$

$+ \sqrt{\text{ال}}$ جب (طہ - سہ) ر $\} \sqrt{\text{امہ}}$ فرت

$= \{$ زجب (حہ - سہ) $\sqrt{\text{ال}} +$ جب (طہ - سہ) $\sqrt{\text{ال}} \} \sqrt{\text{امہ}}$ فرت

اس لئے اگر پ ق = پَ قَ تو حاصل ہونا چاہئے

زجب (حہ - سہ) $\sqrt{\text{ال}} +$ جب (طہ - سہ) $\sqrt{\text{ال}} =$ زَجب (حَہ - حہ) $\sqrt{\text{ال}}$

$+$ جب (طَہ - سہ) $\sqrt{\text{الَ}}$

اگر طہ = طَہ = سہ تو سیارہ تقابل میں ہے اور

زجب (حہ - طہ) $\sqrt{\text{ال}} =$ زَجب (حَہ - طہ) $\sqrt{\text{الَ}}$

پس طہ کی دو قیمتیں ہیں جن میں ۱۸۰° کا فرق ہے۔ یہ سوال کا پہلا حصہ ہے۔ (۱۷۰)

نیز اگر حہ = حَہ اور ز $\sqrt{\text{ال}} =$ زَ $\sqrt{\text{الَ}}$ تو ہر تقابل پر یہ شرط پوری ہوتی ہے۔

مثال ۶ — قطع مکافی کی قوس مرتسم کرنے میں جو وقت لگتا ہے اس کے لیے یولر کا مسئلہ لیمبرٹ کے مسئلہ سے کس طرح اخذ کیا جا سکتا ہے۔

اس صورت میں بہ اور عہ لانہایت چھوٹے ہو جائیں گے۔

مثال ۷ — سورج راس الحمل میں سے بتاریخ ۲۰ مارچ ۱۸۹۸ء بوقت ۲ گھنٹے ۵ منٹ گذرا تھا اور راس المیزان میں سے بتاریخ ۲۲ ستمبر ۱۸۹۸ء بوقت ۱۲ گھنٹے ۳۵ منٹ گذرا تھا۔ ثابت کرو کہ یہ وقفہ ان نتیجوں کے مطابق ہے کہ زمین کے مدار کا خروج المرکز تقریباً $\frac{1}{60}$ ہے اور خطِ اوجین، خطِ اعتدالین پر تقریباً علی القوائم ہے۔ [coll. Exam.]

اگر سورج ایک اعتدالی نقطہ پر ہو اور اگر ز^2 قابل نظر انداز ہو تو بآسانی یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ

جب (حہ + ع) = زجب حہ

پس ع کی دو قیمتیں حاصل ہوتی ہیں یعنے زجب حہ - حہ اور ۱۱ - حہ - زجب حہ -

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اگر ۲ اور ۱ میں سے گذرنے کے اوقات علی الترتیب $ت_1$ اور $ت_2$ ہوں اور حضیض میں سے گذرنے کا وقت ت اور سال کا طول د ہو تو

$$\frac{ت_1 - ت}{د} ۲\pi = \text{زجب حہ} - \text{حہ} - \text{زجب} (\text{زجب حہ} - \text{حہ})$$

$$\frac{ت_2 - ت}{د} ۲\pi = \pi - \text{حہ} - \text{زجب حہ} - \text{زجب} (\text{حہ} + \text{زجب حہ})$$

اس لیے $ت_2 - ت_1 = \frac{1}{2} د - \frac{2}{\pi} د \text{ زجب حہ}$

اگر حہ، ۹۰° کے قریب ہو، ز = $\frac{1}{60}$ تقریباً اور د = ۳۶۵ $\frac{1}{4}$ تو ہم دیکھتے ہیں کہ $ت_2 - ت_1$، نصف سال سے بقدر ۳،۸ دن کے مختلف ہے۔

مثال ۸۔ یہ تسلیم کرکے کہ زمین کا مدار بلحاظ سورج کے ایک مستوی منحنی ہے ثابت کرو کہ شمسی محددوں عہ، ضہ، عَہ، ضَہ، عَّہ، ضَّہ کے تین مشاہدوں کے ہر جٹ کے لیے حسب ذیل مساوات پوری ہوتی ہے:۔

مس ضہ جب (عَہ - عَّہ) + مس ضَہ جب (عَّہ - عہ) + مس ضَّہ جب (عہ - عَہ) = ۰

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۱۷۱)

آٹھواں باب

استقبال اور کبو

دفعہ		صفحہ
۵۴	قمر شمسی استقبال کا مشاہدہ	۲۶۳
۵۵	قمر شمسی استقبال اور کبو کی طبیعی توضیح	۲۶۶
۵۶	سیاروی استقبال	۲۷۰
۵۷	صعود مستقیم اور میل کی رقوم میں استقبال اور کبو کیلئے عام ضابطے	۲۷۳
۵۸	راس الحمل کی حرکت طریق الشمس پر	۲۸۵
۵۹	غیر تابع یومی اعداد	۲۸۹
۶۰	ستاروں کی ذاتی حرکتیں	۳۰۰
۶۱	ارضی عرض بلدوں میں تغیرات	۳۰۲

۵۴ — قمر شمسی استقبال کا مشاہدہ — وہ اہم مظہر جسے ہم

اعتدالین کے استقبال کے طور پر جانتے ہیں بہت آسانی سے واضح ہو جاتا ہے اگر ایک آن پر کسی ثابت ستارہ کے مشاہدہ کردہ صعود مستقیم اور میل کا مقابلہ ایک دوسری آن پر جو اول الذکر آن سے کافی فصل رکھتی ہو اُسی ستارہ کے مشاہدہ کردہ صعود مستقیم اور میل کے ساتھ کیا جائے۔ مثلاً قطب تارے کے محدد حسب تفصیل ذیل معلوم ہوئے تھے :-

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

قطب تارہ یکم جنوری ۱۸۵۰ء | ص - م (صعود مستقیم) | ۱ گھنٹہ | ۵ منٹ | ۲۳ ثانیے
ضہ (میل) | + ۸۸° | ۳۰′ | ۴۹″

اِن کا مقابلہ اِسی ستارے کے اُن محددوں سے کرنا ہے جو ۵۰ سال بعد حاصل ہوئے تھے :-

قطب تارہ یکم جنوری ۱۹۰۰ء | ص - م | ۱ گھنٹہ | ۲۳ منٹ | ۰ ثانیے
ضہ | ۸۸° | ۴۶′ | ۵۳″

ہم دیکھتے ہیں کہ محددوں کے اِن دو جٹوں میں صعود مستقیم کے درمیان پاؤ گھنٹہ سے زیادہ فرق اور میل کے درمیان پاؤ درجہ سے زیادہ فرق پایا جاتا ہے - اِن فرقوں پر بڑی توجہ کی ضرورت ہے -

پہلی نظر میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ قطب تارے کے ظاہری محل کا یہ تغیر خود اِس کی حقیقی حرکتوں کا نتیجہ ہے - لیکن ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اِس مظہر کی ایسی توجیہ نہیں کی جا سکتی - یہ ہو سکتا ہے کہ کسی نقطہ کے محددوں میں تبدیلیاں اِن محوروں میں تبدیلیوں کی وجہ سے پیدا ہوں جن کے لحاظ سے اِن محددوں کی پیمائش عمل میں آئی ہے یا خود نقطے کے محل میں مطلق تبدیلیوں کا نتیجہ ہوں - ہم ثابت کرینگے کہ ستارے کے مقام میں یہ تبدیلیاں صرف ظاہری ہیں - وہ ستارے کے مقام کی تبدیلیوں سے نہیں بلکہ اُس بڑے دائرے کے مقام کی تبدیلیوں سے منسوب کیجانی چاہئیں جس کے حوالہ سے ستارہ کا مقام متعین کیا جاتا ہے - یہ تبدیلیاں اُن مظاہر کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں جو **استقبال** اور **کبو** کے طور پر مشہور ہیں - (۱۷۲)

اولاً قطب تارے کے میل پر غور کرو جو نصف صدی کے عرصہ میں حسب مشاہدات ۱۶′ ۴″ سے زیادہ بڑھ چکا ہے یا سالانہ ۱۹″ کی اوسط شرح سے اِس کے یہ معنی ہیں کہ قطب اور قطب تارے کا درمیانی فاصلہ سالانہ ۱۹″ کی شرح سے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

گھٹ رہا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ قطب یا قطب تارہ یا دونوں حرکت میں ہونے چاہئیں۔

لیکن قطب تارے کے قطبی فاصلہ کے اس تغیر کا کوئی قابل قدر حصہ اس ستارے کی ذاتی حرکت (دفعہ ۶۰) سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قریب کے ستاروں سے قطب تارے کا فاصلہ ناپا جائے تو اس میں کوئی ایسا تغیر نہیں پایا جاتا جس کا مقابلہ اس تغیر سے کیا جا سکے جو قطب تارے اور قطب کے درمیانی فاصلہ میں پایا جاتا ہے۔ قطب تارے کی اگر کوئی حقیقی ذاتی حرکت ہے بھی تو وہ اس قدر خفیف ہے کہ وہ اس تارے کے میل میں مشاہدہ کردہ تبدیلیوں کا باعث نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی واضح رہے کہ پچاس سال کے عرصہ میں دوسرے ستاروں کے قطبی فاصلوں میں بالعموم بڑا تغیر پایا جاتا ہے لیکن خود ستاروں کے باہمی فاصلوں میں کوئی قابل قدر تبدیلیاں نظر نہیں آتیں۔ پس ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ قطب تارے اور قطب کے درمیانی فاصلہ میں جو تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں وہ خود قطب تارے کی حرکت سے منسوب نہیں کی جانی چاہئیں بلکہ انہیں قطب سماوی کی حرکت سے منسوب کرنا چاہئے۔ اب ہم اس حرکت کی نوعیت کا مطالعہ کرینگے۔

اگر قطب کرۂ سماوی پر اپنا محل مسلسل بدلتا ہے تو سماوی خط استواء کی بھی مسلسل حرکت ہونی چاہئے کیونکہ خط استواء پر کا ہر نقطہ بہر حال قطب سے ۹۰° پر ہونا چاہئے۔ چنانچہ خط استواء حرکت کرتا ہے لیکن طریق الشمس کے ساتھ اس کا اوسط میلان مستقل رہتا ہے۔ یہ زاویہ صرف چند ثانیوں کی مقدار میں طریق الشمس کی ایک جانب یا دوسری جانب متزلزل ہوتا ہے۔ وسط گرما میں سورج کا میل طریق الشمس کا میلان ہے اور یہ میلان سنہ ۱۸۵۰ء میں بھی وہی تھا اور سنہ ۱۹۰۰ء میں بھی وہی (دیکھو صفحہ ۲۸۸)۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ خط استواء کی حرکت اس طرح ہونی چاہئے کہ وہ طریق الشمس کو جسے ثابت متصور کیا گیا ہے، تقریباً ایک مستقل زاویہ پر قطع کرے اور اعتدالی نقطے طریق الشمس پر زمین کی حرکت کی سمت کے مخالف حرکت کریں۔ طریق الشمس کے قطب کو (۱۷۳)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کرۂ سماوی پر ثابت خیال کیا جا سکتا ہے اور مذکورۂ بالا حرکت کی وجہ سے خط استواء کا قطب طریق الشمس کے قطب کے گرد ایک چھوٹا دائرہ مرتسم کرتا ہے یہ وہ حرکت ہے جو اعتدالین کے قمر شمسی استقبال کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا سادہ ترین اظہار کسی ستارہ کے طول بلد میں مسلسل اضافہ کے ذریعہ ہوتا ہے درآنحالیکہ ستارہ کا عرض بلد غیر متبدل رہتا ہے۔ بالعموم قمر شمسی استقبال سے کسی جرم فلکی کے میل اور صعود مستقیم دونوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔

۵۵۔ قمر شمسی استقبال اور کبو کی طبیعی توضیح۔ اس محور کی سمت میں، جس کے گرد زمین اپنی یومی گردش کرتی ہے، بہت سست تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں اور یہ تبدیلیاں استقبال اور کبو کے مظاہر پیدا کرتی ہیں مستقل سمت سے زمین کے محور کا یہ خلل اس واقعہ کی وجہ سے ہے کہ زمین جیسے ایک کرۂ نمائی جسم پر بیرونی جسم (چاند یا سورج) کی کشش کا حاصل زمین کے مرکز ثقل میں سے گذرنے والی ایک واحد قوت نہیں ہے۔

اگر زمین فی الواقعی ایک کروی استوار جسم ہوتی اور اگر ہر اندرونی ہم مرکز کروی غول کی سطح پر کثافت مستقل ہوتی تو کسی بیرونی جسم (جیسے کہ چاند یا سورج) کی کشش ایک قوت کے مماثل ہوتی جو کرۂ کے مرکز پر عمل کرتی۔ اگر کسی قوت کا خط عمل اس جسم کے مرکز ثقل میں سے گذرے جس پر یہ عمل کرتی ہے تو جسم کی گردش پر جو مرکز ثقل کے گرد ہو ایسی قوت کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ لیکن ان حالات کے تحت جو نظام شمسی میں موجود ہیں نہ سورج کی کشش اور نہ چاند کی کشش زمین کے مرکز ثقل میں سے گذرتی ہے۔ اس لیے زمین کی گردش میں وہ خلل پیدا ہوتے ہیں جن پر اب ہم غور کریں گے۔

اگرچہ ان وجوہ کی بنا پر جو بعد میں بیان کئے جائیں گے استقبال کے پیدا کرنے میں سورج کی بہ نسبت چاند کا زیادہ حصہ ہے لیکن ہم پہلے سورج کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اثر پر غور کرینگے کیونکہ زمین کے لحاظ سے اس کی اضافی حرکت چاند کی حرکت کی بہ نسبت زیادہ سادہ ہے۔

(۱۷۴) اگر ہم یہ مان لیں کہ زمین ایک گردشی جسم ہے اور خط استواء کے گرد متشاکل ہے تو چونکہ ن س (شکل ۵۰) زمین کا محور ہے اور ج اسکا مرکز اور پ کوئی بیرونی ذرہ اس لیے مستوی ن س پ زمین کو متشاکلاً تقسیم کرتا ہے اور اس لیے زمین پر پ کی حاصل کشش مستوی ن س پ میں واقع ہوتی ہے، نیز اگر پ خط استواء کے مستوی میں ہو تو حاصل کشش بھی اس مستوی میں ہوگی۔ اس لیے اگر پ استوائی مستوی ا ب میں واقع ہو تو حاصل کشش، ج پ پر ہوگی۔

اگر پ، محور ن س میں ہوتا (اس صورت پر غور کرنا ضروری نہیں ہے) تو یہ واضح ہے کہ حاصل کشش ج پ پر ہوتی لیکن پ کے کسی دوسرے مقام کے لیے جیسے کہ شکل ۵۰ میں دکھایا گیا ہے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ حاصل کشش، ج میں سے نہیں گذرتی بلکہ مستوی ن س پ میں واقع ہونے والے ھ پ کی طرح کے ایک خط پر عمل کرتی۔



شکل (۵۰)

پہلی نظر میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ یہ قوت، ن س کو ھ پ کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

عمود دوار سمت میں پھیرنے کا میلان رکھے گی یعنی بالفاظ دیگر چونکہ تجاذبی جسیم سورج ہے اس لیے ایسی قوت کا فوری اثر بظاہر یہ معلوم ہوگا کہ وہ زمین کے خط استوا کو طریق الشمس کی جانب لانے پر مجبور کرتی ہے۔ لیکن یہ واقعہ کہ زمین تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے اس بظاہر متناقض اثر کا باعث ہے کہ محور ن س ہر لمحہ ایک ایسی سمت میں حرکت کرتا ہے جو مستوی ن س پ میں نہیں بلکہ اس پر عمود دوار ہے۔

اس مظہر کی اچھی تمثیل معمولی لٹو سے ملتی ہے اگرچہ کہ اس صورت میں ہم ایک جسم کے (جو فضا میں آزاد ہو) مرکز ثقل کے گرد گردش پر نہیں بلکہ ایک ثابت نقطہ کے گرد گردش پر بحث کر رہے ہیں۔ لیکن علم ریاضی کے نقطہ نظر سے یہ دونوں مسئلے بہت مشابہ ہیں۔ جبکہ لٹو اپنے تشاکل کے محور کے گرد تیز گردش کر رہا ہوتا ہے تو خود یہ محور آہستہ آہستہ انتصابی خط کے گرد ایک مخروط مرتسم کرتا ہے۔ پس لٹو کا یہ محور ہر آن ایک ایسی سمت میں حرکت کر رہا ہوتا ہے جو اس سمت کے عمود دوار ہوتی ہے جس میں قوت جاذبہ ارض اس کو لانا چاہتی ہے لیکن اس سمت کی طرف جانے سے روکنے والا صرف یہ واقعہ ہے کہ لٹو کی گردش اپنے محور کے گرد خود محور کی مخروطی گردش کی بہ نسبت بہت زیادہ تیز ہے۔ (۱۷۵)

زمین کی یومی حرکت اس کے محور کی مخروطی حرکت کے مقابلہ میں بہت تیز معلوم ہوتی ہے کیونکہ موخرالذکر کا دور تقریباً ۲۵۸۰۰ سال ہے۔ لٹو کے محور کی مخروطی گردش کی تمثیل کو زمین کی گردش کی صورت پر (جبکہ سورج کے لحاظ سے پیدا شدہ خلل زیر غور ہو) استعمال کیا جائے تو ہمیں اس امر کی توقع رکھنی چاہیئے کہ ارضی محور ن س طریق الشمس کے مستوی کے عمود کے گرد آہستہ آہستہ ایک قائم مستدیر اسطوانہ مرتسم کرے گا۔

چاند کا استقبالی عمل سورج کی بہ نسبت زیادہ اہم ہے کیونکہ زمین پر چاند کی کل کشش سورج کی کشش کی بہ نسبت بہت ہی کم ہے تاہم چونکہ استقبالی اثر ان کششوں کے درمیانی فرق پر منحصر ہوتا ہے جو زمین کے مختلف حصوں پر خلل ڈالنے والا

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جسم عائد کرتا ہے اس لیے چاند کی قربت اس کے استقبالی اثر کو سورج کے اثر کا تقریباً دگنا کر دیتی ہے۔

چاند کے مدار کا مستوی طریق الشمس کے بہت قریب ہے چنانچہ وہ صرف ۵° کا چھوٹا زاویہ طریق الشمس سے بناتا ہے۔ چاند کا مدار اس میلان کو قائم رکھتے ہوئے مسلسل حرکت میں رہتا ہے اور اس کا عقدہ طریق الشمس کا پورا چکر تقریباً ۱۹ سال میں ختم کرتا ہے، صریحاً یہ مدت ۲۶۰۰۰ سال کے استقبالی دور کے مقابلہ میں بہت چھوٹی ہے۔ چونکہ چاند طریق الشمس سے ہمیشہ قریب رہتا ہے اور جتنا اس کے نیچے رہتا ہے اتنا ہی اوپر اور چونکہ اس کے مدار کا اوسط محل طریق الشمس پر منطبق ہوتا ہے اس لیے یہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے کہ چاند کے استقبالی عمل کا اصل حصہ اسی عام اثر کا مقتضی ہے جو سورج کے عمل کا ہے۔ سورج کا عمل اور چاند کے عمل کا یہ حصہ قمر شمسی استقبال کا باعث ہوتے ہیں جس کی وجہ سے راس الحمل ۷، طریق الشمس پر سالانہ ۵۰" ۱/۴ کی شرح سے اس سمت میں حرکت کرتا ہے جو بڑھتے طول بلدوں کے مخالف ہے۔ اس مقدار کا تقریباً دو تہائی حصہ چاند کے عمل کی وجہ سے ہے اور باقی سورج کے عمل کی وجہ سے۔ خط استوا، کے ساتھ طریق الشمس کا میلان سہ، قمر شمسی استقبال کی وجہ سے نہیں بدلتا۔

لیکن چاند کا ایک اہم اثر اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کی حرکت اگرچہ طریق الشمس کے قریب ہے لیکن ٹھیک طریق الشمس کے مستوی میں نہیں ہے۔ چاند کے استقبالی عمل کا اقتضا یہ ہے کہ زمین کا محور چاند کے مدار کے قطب کے گرد ایک مخروط مرتسم کرے لیکن خود چاند کا قطب طریق الشمس کے قطب کے گرد ۵° کے نصف قطر کا ایک دائرہ مرتسم کرتا ہے۔ اس کا اثر خط استوا، کے مستوی پر دوگونہ ہے۔ ایک یہ کہ اس کی باعث راس الحمل ۷، اپنے اوسط مقام کے گرد جس کی تعیین قمر شمسی استقبال کے لحاظ سے کی گئی ہو طریق الشمس پر آگے پیچھے چھوٹے دور کی

(۱۷۶)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ایک اہتزازی حرکت رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ سہ بھی اپنی اوسط قیمت کے گرد آگے پیچھے خفیف اہتزاز کرتا ہے۔ یہ مظاہر کبو (Nutation.) کے طور پر معروف ہیں اور ان کا انکشاف بریڈلے (Bradley.) کے بڑے کارناموں میں سے ایک ہے۔ کبو کے پیدا کرنے میں سورج کا بھی کچھ اثر ہے لیکن وہ چاند کے اثر کے مقابلہ میں بہت قلیل ہے۔

۵۶۔ سیاروی استقبال ۔ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں قمر شمسی استقبال اور کبو، خط استوا، اور طریق الشمس کے اضافی محل میں تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور اس کی وجہ اول الذکر کی حرکت ہے۔ اب ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیئے کہ خود طریق الشمس بالکل ایک ثابت مستوی نہیں ہے اور اس میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں اگرچہ یہ تبدیلیاں اس قدر قلیل ہیں کہ ان کو اکثر مقاصد



شکل (۵۸)

کے لیے غیر موجود سمجھا جا سکتا ہے اور طریق الشمس کو بالکل ثابت فرض کیا جا سکتا ہے زمین پر دوسرے سیاروں کی کششوں کی وجہ سے طریق الشمس کی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

یہ حرکتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اعتدالی نقطوں کے محلوں میں اس طرح جو بیقاعدگی پیدا ہوتی ہے اس کو سیّاروی استقبال[1] کہتے ہیں کیونکہ اس کا باعث زمین پر سیاروں کی کششیں ہیں۔

ہمیں طریق الشمس کا کوئی معیاری محل لینا چاہیئے تاکہ دوسری تاریخوں پر اس کے محل کا حوالہ اس معیاری محل کے ذریعہ دیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے ہم وہ بڑا دائرہ لیتے ہیں جس پر طریق الشمس سنہ ۱۸۵۰ء کے آغاز میں منطبق ہوا تھا، فرض کرو کہ یہ بڑا دائرہ نرنر ہے (شکل ۵۸)۔ فرض کرو کہ (۱۷۷)
سنہ ۱۸۵۰+ت میں طریق الشمس کا محل نرنر ہے۔ فرض کرو کہ سنہ ۱۸۵۰ء کے آغاز میں خط استواء کا محل ل ا ہے اور فرض کرو کہ وقت ۱۸۵۰+ت پر خط استواء قمر شمسی استقبال کی وجہ سے آ آ تک حرکت کر چکا ہے۔ فرض کرو کہ ایک ستارہ س سے نرنر اور نرنر پر عمود س ل اور س لَ ڈالے گئے ہیں۔ فرض کرو کہ نرنر اور ا ل کے نقطہ تقاطع د سے نرنر پر عمود د دَ ڈالا گیا ہے۔ اب ہمیں حسب ذیل مواد ملتا ہے۔

ت سال میں قمر شمسی استقبال ب د ہے۔

سنہ ۱۸۵۰+ت میں اصلی طریق الشمس کا میلان زاویہ دَ ج آ ہے۔

سنہ ۱۸۵۰+ت میں ثابت طریق الشمس کا میلان زاویہ د ب آ ہے۔

ب ج چونکہ خط استواء پر وہ فاصلہ ہے جس میں سے عقدہ ت سال میں طریق الشمس کی حرکت کی وجہ سے منتقل ہو چکا ہے اس لیے وہ سیاروی استقبال ہے اور اس کی مقدار ۱۳ء۱ ت معلوم ہوتی ہے۔

---

[1] سیاروی استقبال کے متعلق اور زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے نیو کومب (New comb) کی کمپینڈیم آف اسفریکل اسٹرانومی کا مطالعہ کیا جائے جس میں سے یہاں مستعملہ عددی قیمتیں لی گئی ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ج د کو طول بلد میں عام استقبال کہتے ہیں۔ خط استواء اور ظاہری طریق الشمس کے نقطہ تقاطع کا ثانی الذکر پر ہٹاؤ عام استقبال ہے اور اس کا سالانہ اضافہ بتاریخ سنہ ۱۸۵۰+ت حسب ذیل ہے

۵۰٫۲۴۵۳″ + ۰٫۰۰۰۲۲۲۵ ت

اس مقدار کو استقبال کا مستقل کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی سستی سے بدلتا ہے چنانچہ سنہ ۱۹۰۰ء میں اس کی قیمت ۵۰٫۲۵۶۴″ تھی اور سنہ ۱۹۵۰ء میں ۵۰٫۲۶۷۵ ہوگی۔

آج کل استقبال کے مستقل کو ۵۰٫۲۶″ لینا ہمارے مقاصد کے لیے کافی صحیح ہے۔

سنہ ۱۸۵۰+ت میں استواء اور اسی تاریخ کے طریق الشمس کے درمیان زاویہ (دوری رقموں کو نظر انداز کرکے) حسب ذیل ہے

۲۳° ۲۷′ ۳۲٫۰″ − ۰٫۴۷ ت″

اس کی دوسری رقم کو میلان کی قرنی (Secular) تبدیلی کہتے ہیں۔ شکل میں تیروں کی سمتوں کا مشاہدہ کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ثابت طریق الشمس پر اصلی طریق الشمس کا نزولی عقدہ نہ ہے اور اس لیے ثابت طریق الشمس پر اصلی طریق الشمس کے صعودی عقدہ کا طول بلد ۱۸۰° نہ ج ہے۔

ستارہ س کا طول بلد جو سنہ ۱۸۵۰ء میں د ل تھا سنہ ۱۸۵۰+ت میں قمر شمسی استقبال کی باعث ب ل ہو جاتا ہے۔ اس کا عرض بلد یعنے س ل قمر شمسی استقبال سے نہیں بدلتا۔

اگر سیاروی استقبال اور قمر شمسی استقبال دونوں کو ملحوظ رکھا جائے تو س کا طول بلد جو سنہ ۱۸۵۰ء میں د ل تھا سنہ ۱۸۵۰+ت میں ج ل ہو جاتا ہے اور اسی طرح عرض بلد س ل سے س ل تک بدلتا ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

۵۷ - صعود مستقیم اور میل کی رقوم میں استقبال اور کبو کیلئے عام ضابطے - (۱۷۸)

ہم بالعموم یہ مان لینگے کہ طریق الشمس کا مستوی غیر متغیر رہتا ہے اور یہ کہ طریق الشمس کے لحاظ سے خط استواء کے محل میں استقبال اور کبو کی باعث کسوف تبدیلیاں ہوتی ہیں - یہ تبدیلیاں صرف اُن طریقوں پر واقع ہوتی ہیں جن کے مطابق کرہ کا ایک بڑا دائرہ بدل سکتا ہے یعنی عقدوں کا خط بدلتا ہے اور طریق الشمس کا میلان بھی بدلتا ہے - اگر اُن بڑے دائروں میں جن کے لحاظ سے کسی ستارے کے محددناپے جاتے ہیں کوئی تبدیلیاں ہوں تو ان تبدیلیوں کی وجہ سے ستارہ کے محددوں میں بھی تبدیلیاں ہوں گی اگرچیکہ جیسا کہ اب ہم فرض کرینگے، کرہ سماوی پر ستارہ کے مقام میں فی الواقعی کوئی تبدیلی نہ ہو -

خط استواء کے دو محلوں پر غور کرو - فرض کرو کہ پہلا محل طریق الشمس کو ایک اعتدالی نقطہ ♈ پر قطع کرتا ہے اور طریق الشمس کے ساتھ اس کا میلان سہ ہے - فرض کرو کہ دوسرا محل طریق الشمس کو ایک اعتدالی نقطہ ♎ پر قطع کرتا ہے جو طریق الشمس پر گھٹنے والے طول بلدوں کی سمت میں قوس ک میں سے حرکت کر چکا ہے اور میلان سہ سے سہ تک بدل چکا ہے (شکل ۵۹) -

فرض کرو کہ پہلے خط استواء اور اعتدال کے حوالے سے (نظام اول) ایک ستارہ س کا صعود مستقیم اور میل علی الترتیب عہ اور ضہ ہیں اور دوسرے خط استواء اور اعتدال (نظام دوم) کے حوالہ سے اسی ستارے کے محدد عہ اور ضہ ہیں -

فرض کرو کہ اِن دو نظاموں کے حوالہ سے ایک دوسرے ستارے کے متناظر محدد عہ، ضہ اور عہ، ضہ ہیں -

اب چونکہ قوس س س کا طول وہی ہے خواہ محددوں کا کوئی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

نظام لیا جائے اس لیے حسب ذیل اساسی مساوات

جب ضہ جب ضہ۱ + جم ضہ جم ضہ۱ جم (عہ - عہ۱)

= جب ضہَ جب ضہَ۱ + جم ضہَ جم ضہَ۱ جم (عہَ - عہَ۱)

حاصل ہوتی ہے جو دفعہ ۱۲ میں استعمال کیجا چکی ہے۔

اب ہم اس مساوات پر تین ایسی صورتیں لیکر غور کریں گے جن میں عہ۱، ضہ۱ اور عہَ۱، ضہَ فوراً معلوم ہوتے ہیں اور اس طرح استحالہ کی تین مساواتیں حاصل کریں گے۔

اگر دوسرا ستارہ سںَ، ۷ پر ہو تو اس کے محدد نظام اول میں حسب ذیل ہیں

عہ۱ = ۰، ضہ۱ = ۰

اسی ستارے کے محدد دوسرے نظام میں مساواتوں

جب ضہَ۱ = جب ک جب سہَ،

جم ضہَ۱ جب عہَ۱ = جب ک جم سہَ،

جم ضہَ۱ جم عہَ۱ = جم ک

سے ملتے ہیں۔

(۱۷۹) ان قیمتوں کو اساسی مساوات میں درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

جم ضہ جم عہ = جب ک جب سہَ جب ضہَ

+ جم ک جم ضہَ جم عہَ + جب ک جم سہَ جم ضہَ جب عہَ .. (۱)

اسی طرح سںَ کو ۷ پر لینے سے حاصل ہوتا ہے

جم ضہَ جم عہَ = - جب ک جب سہ جب ضہ + جم ک جم ضہ جم عہ

- جب ک جم سہ جم ضہ جب عہ .... (۲)

بالآخر فرض کرو کہ یہ دوسرا ستارہ سںَ طریق الشمس کے قطب پر ہے تو نظام اول میں اس کے محدد ہیں

عہ۱ = ۲۷۰°، ضہ۱ = ۹۰° - سہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اور نظام دوم میں

عَ۱ = ۲۷۰° ، ضَ۱ = ۹۰° − سہ



شکل (۵۹)

اساسی مساوات میں ان قیمتوں کو داخل کرنے سے حاصل ہوتا ہے

جب ضہ جم سہ = جم ضہ جب سہ جب عہ

= جب ضَ جم سَ − جم ضَ جب سَ جب عَ ..(۳)

اِس طرح عہ، ضہ کو عَ، ضَ اور ضروری مستقلات ک، سہ، سَ کے ساتھ ملانے والی تین عام مساواتیں حاصل ہوتی ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ مساوات (۳) زبر زدہ اور غیر زبر زدہ حرفوں میں متشاکل ہے اور یہ آسانی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ (۲) کو (۱) سے کس طرح زبر زدہ اور غیر زبر زدہ حروف کے باہمی تبادلہ اور ک کی علامت بدلنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔

اگر معلومہ مقداریں عَ، ضَ ہوں تو (۱)، (۲)، (۳) سے ہم جب ضہ اور جم ضہ جب عہ کو عَ، ضَ کی رقوم میں بیان کر سکتے ہیں اور اس طرح حسب ذیل تین مساواتوں (۴)، (۱)، (۵) کو ایک جٹ میں (۱۸۰) رکھ سکتے ہیں جس سے عہ، ضہ بغیر ابہام کے معلوم ہو سکتے ہیں:۔

جب ضہ = جب ضَ (جم ک جب سہ جب سَ + جم سہ جم سَ)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

- جم ضہ جم عہ جب سہ جب ک
+ جم ضہ جب عہ (جم ک جب سہ جم سہ - جم سہ جب سہ) ... (۴)
جم ضہ جم عہ = جب ضہ جب ک جب سہ
+ جم ضہ جم عہ جم ک
+ جم ضہ جب عہ جب ک جم سہ ..... (۱)
جم ضہ جب عہ = جب ضہ (جم ک جم سہ جب سہ - جب سہ جم سہ)
- جم ضہ جم عہ جم سہ جب ک
+ جم ضہ جب عہ (جم ک جم سہ جم سہ + جب سہ جب سہ)
..... (۵)

اگر عہ، ضہ دئے گئے ہوں اور عہ، ضہ معلوم کرنے ہوں تو اسی طرح حسب ذیل تین مساواتیں حاصل ہوتی ہیں :-

جب ضہ = جب ضہ (جم ک جب سہ جب سہ + جم سہ جم سہ)
+ جم ضہ جم عہ جب سہ جب ک
+ جم ضہ جب عہ (جم ک جب سہ جم سہ - جم سہ جب سہ) .. (۶)
جم ضہ جم عہ = - جب ضہ جب ک جب سہ
+ جم ضہ جم عہ جم ک
- جم ضہ جب عہ جب ک جم سہ ..... (۲)
جم ضہ جب عہ = جب ضہ (جم ک جم سہ جب سہ - جب سہ جم سہ)
+ جم ضہ جم عہ جم سہ جب ک
+ جم ضہ جب عہ (جم ک جم سہ جم سہ + جب سہ جب سہ)
..... (۷)

استقبال محسوب کرنے میں ک کو بالعموم اسقدر چھوٹا سمجھا جا سکتا ہے کہ اسکی پہلی سے اعلیٰ ترقوتیں نظر انداز کیجا سکتی ہیں اور نیز ہم لیتے ہیں سہ = سہ، اس لیے ضابطے (۶)، (۲)، (۷) ہو جاتے ہیں

جب ضہ = جب ضہ + ک جب سہ جم ضہ جم عہ،

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جم ضہ جم عہ = جم ضہ جم عہ ـ ک جب سہ جب ضہ ـ ک جم سہ جم ضہ جب عہ
جم ضہ جب عہ = جم ضہ جب عہ + ک جم سہ جم ضہ جم عہ
ان سے ہمیں بآسانی حسب ذیل تقریبی ضابطے حاصل ہوتے ہیں
عہ ـ عہ = ک جم سہ + ک جب سہ مس ضہ جب عہ ..... (۸)
ضہ ـ ضہ = ک جب سہ جم عہ ..... (۹)
یہ ضابطے استقبال کے لیے اساسی ضابطے ہیں ـ

(۱۸۱) **مثال ۱** ـ اگر ایک ستارے کا میل اور صعود مستقیم ضہ، عہ ہوں تو ثابت کرو کہ استقبال کی باعث صعود مستقیم میں سالانہ اضافہ قوس کے ثانیوں میں ۴۶ + ۲۰ مس ضہ جب عہ کے بہت قریب ہوگا اور میل میں سالانہ اضافہ ۲۰ جم عہ ہوگا۔

مثال ۲ ـ خط استواء کے قطب کی زاوئی رفتار طریق الشمس کے قطب کے گرد ک ہے، طریق الشمس کی گردش کے فوری محور کا طول بلد ل ہے، اور اس کی زاوئی رفتار عا ہے۔ ثابت کرو کہ حوالہ کے مستویوں کی ان تبدیلیوں سے کسی ستارے کے صعود مستقیم عہ اور میل ضہ میں تبدیلی کی سالانہ شرحیں

م + ن جب عہ مس ضہ اور ن جم عہ

پیدا ہوتی ہیں جہاں م = ک جم سہ ـ عا جب ل قم سہ
اور ن = ک جب سہ، جہاں سہ طریق الشمس کے ساتھ استواء کا میلان ہے

مثال ۳ ـ ثابت کرو کہ کرۂ سماوی پر کے وہ نقطے جن کے میل ایک دی ہوئی مدت میں اعتدالوں کے استقبال کی وجہ سے بڑی سے بڑی تبدیلی میں سے گذرتے ہیں ایک بڑے دائرے کی دو قوسوں پر واقع ہوتے ہیں۔ نیز ثابت کرو کہ وہ نقطے جن کے میل اس مدت کے اختتام پر غیر متغیر رہتے ہیں ایک دوسرے بڑے دائرے پر واقع ہوتے ہیں۔

فرض کرو کہ خط استواء کے قطب اس مدت کی ابتداء اور ختم پر ق، ق ہیں۔ تو ہندسی طور پر یہ واضح ہے کہ اس مدت میں استقبال کی باعث میل کی بڑے سے بڑی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ممکن تبدیلی قوس ق ق' کے مساوی ہے اور یہ کہ دو ستارے جو اس تبدیلی میں سے گذرتے ہیں ق ق' میں سے گذرنے والے بڑے دائرے پر واقع ہیں اور قوس ق ق' اور اس کے تحت قدمی قوس کی حدود سے باہر ہیں۔ وہ ستارے جن کے میل اس مدت کے ختم پر غیر متغیر رہتے ہیں اس بڑے دائرہ پر واقع ہیں جو قوس ق ق' کی علی القوائم تنصیف کرتا ہے۔

مثال ۴ — اگر ایک ستارہ دائرہ انقلابین پر واقع ہو تو ثابت کرو کہ وہ میل میں استقبال نہیں رکھتا۔ نیز ثابت کرو کہ دائرہ اعتدالین پر کے سب نقطے صعود مستقیم اور نیز میل میں ایک ہی استقبال رکھتے ہیں۔

مثال ۵ — ثابت کرو کہ اگر س ایک ستارہ ہو جس کے صعود مستقیم میں استقبال نہیں ہے اور اگر خط استواء اور طریق الشمس کے قطب علی الترتیب ق اور ک ہوں تو س ق اور س ک علی القوائم ہونگے۔

مثال ۶ — ثابت کرو کہ وہ سب ستارے جنکا صعود مستقیم استقبال کی وجہ سے فی الحال نہیں بدلتا ایک ناقصی مخروط پر واقع ہوتے ہیں جو خط استواء اور طریق الشمس کے قطبوں میں سے گذرتا ہے۔

شرط ہے، دیکھو (۸)

جم سہ + جب سہ مس ضہ جب عہ = ۰،

اگر ہم رکھیں لا = رجم عہ جم ضہ،

ما = رجب عہ جم ضہ،

ی = رجب ضہ

اور ر، عہ، ضہ کو ساقط کریں تو مخروط کی مساوات حاصل ہوتی ہے

ما ی جب سہ + (لا۲ + ما۲) جم سہ = ۰.

(۱۸۲) **مثال ۷** — ثابت کرو کہ ان سب ستاروں کے لیے جن کے میل میں (خط استواء کے عقدہ کی طریق الشمس میں حرکت کی وجہ سے) تغیر کی شرح اپنی بڑی سے بڑی قیمت ا رکھتی ہے صعود مستقیم میں تغیر کی شرح (اسی سبب سے) ا مم سہ ہے جہاں سہ طریق الشمس اور خط استواء کا درمیانی زاویہ ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۸ ۔ ضابطوں (۱)، (۲)، (۳) سے ثابت کرو کہ سہ اور ک کے لحاظ سے عہ، ضہ کے تفرقی سروں کے لیے حسب ذیل جملے حاصل ہوتے ہیں:۔

$$\frac{\text{جف عہ}}{\text{جف سہ}} = -\text{مس ضہ جم عہ}\,،\quad \frac{\text{جف ضہ}}{\text{جف سہ}} = \text{جب عہ}\,،$$

$$\frac{\text{جف عہ}}{\text{جف ک}} = \text{جم سہ} + \text{جب سہ مس ضہ جب عہ}\,،\quad \frac{\text{جف ضہ}}{\text{جف ک}} = \text{جب سہ جم عہ}$$

(۶) کو سہ کے لحاظ سے تفرق کرنے اور عہ، ضہ، ک، سہ کو مستقل سمجھنے سے مساوات (۷) کی بناء پر حاصل ہوتا ہے

$$\text{جم ضہ}\ \frac{\text{جف ضہ}}{\text{جف سہ}} = \text{جم ضہ جب عہ}\,،$$

اس لیے صورت ضہ = ۹۰° کو خارج کرنے سے

$$\frac{\text{جف ضہ}}{\text{جف سہ}} = \text{جب عہ}$$

(۲) کو سہ کے لحاظ سے تفرق کرنے سے

$$\text{جم ضہ جب عہ}\ \frac{\text{جف عہ}}{\text{جف سہ}} + \text{جب ضہ جم عہ}\ \frac{\text{جف ضہ}}{\text{جف سہ}} = 0$$

اس لیے $\frac{\text{جف ضہ}}{\text{جف سہ}}$ کی بجائے جب عہ رکھنے سے

$$\frac{\text{جف عہ}}{\text{جف سہ}} = -\text{مس ضہ جم عہ}$$

(۶) کو ک کے لحاظ سے تفرق کرنے سے

$$\text{جم ضہ}\ \frac{\text{جف ضہ}}{\text{جف ک}} = \text{جب سہ}\ (-\text{جب ضہ جب ک جب سہ} + \text{جم غہ جم عہ جم ک} - \text{جم ضہ جب عہ جب ک جم سہ})$$

$$= \text{جب سہ جم ضہ جم عہ}$$

اس لیے $\frac{\text{جف ضہ}}{\text{جف ک}} = \text{جب سہ جم عہ}$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

بالآخر (۳) کو ک کے لحاظ سے تفرق کرنے اور $\frac{\text{جف ضہ}}{\text{جف ک}}$ کی محصلہ بالاقیمت کو درج کرنے سے

$$۰ = \text{جم ضہ جم سہ جب سہ جم عہ + جب ضہ جب سہ جب عہ جب سہ جم عہ}$$
$$- \text{جم ضہ جب سہ جم عہ} \frac{\text{جف عہ}}{\text{جف ک}}$$

اس لیے $\frac{\text{جف عہ}}{\text{جف ک}} = \text{جم سہ + جب سہ مس ضہ جب عہ}$

مثال ۹ — ثابت کرو کہ استقبالی حرکت کے باوجود سماوی خط استواء ہمیشہ دو ثابت چھوٹے دائروں کو مس کرتا ہے۔

مثال ۱۰ — اگر میلان میں تبدیلی مف سہ ہو اور ۷ میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو ثابت کرو کہ

$$\text{جم عہ جم ضہ = جم عہ جم ضبہ}$$
$$\text{جب عہ جم ضہ = جب عہ جم ضبہ جم مف سہ - جب ضبہ جب مف سہ}$$
$$\text{جب ضہ = جب عہ جم ضبہ جب مف سہ + جب ضہ جم مف سہ}$$

جہاں عہ، ضہ علی الترتیب ایک ستارہ کے وہ صعود مستقیم اور میل ہیں جو اس تبدیلی سے متاثر ہیں اور عہ، ضہ وہ صعود مستقیم اور میل جو اس تبدیلی سے غیر متاثر ہیں۔

(۱۸۳) مثال ۱۱ — فرض کرو کہ ایک دی ہوئی آن پر ایک ستارہ کا صعود مستقیم اور میل عہ، ضہ ہیں، استقبال کا مستقل ک ہے اور طریق الشمس کا میلان سہ۔

اگر جملہ $\text{ا جب سہ جب ضہ + ب جم سہ جم ضہ جب عہ}$ کو ا سے اور جملہ جم عہ جم ضہ کو ب سے تعبیر کیا جائے تو ت سال بعد اسی ستارے کے لیے ان جملوں کی قیمتیں ہوں گی

$$\text{ا جم ک ت + ب جب ک ت اور ب جم ک ت - ا جب ک ت}$$

نیز اگر اس مدت میں میل ضہ سے ضہ ہو جائے تو

$$\text{جب ضہ - جب ضہ = جب سہ \{ ا (۱ - جم ک ت) - ب جب ک ت \}}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں تک استقبال کا تعلق ہے جملہ

(جب سہ جب ضہ + جم سہ جم ضہ جب عہ)^2 + (جم عہ جم ضہ)^2

ایک غیر متغیرہ ہے اور یہ دیکھنا آسان ہے کہ یہ جملہ ہمیشہ عرض بلد کی جیب التمام کا مربع ہوتا ہے۔ جملہ

جب ضہ جم سہ ـ جم ضہ جب عہ جب سہ

بھی جو عرض بلد کی جیب ہے بلاشبہ ایک غیر متغیرہ ہے اور اس وجہ سے ضابطہ (۳) فوراً لکھ لیا جا سکتا تھا۔

مثال ۱۲ ـ ثابت کرو کہ استقبال کی باعث ایک ستارہ کا صعود مستقیم جو طریق الشمس کے قطب سے $\frac{1}{2}$ ۲۳° سے زیادہ فاصلہ پر ہو تمام ممکن تبدیلیوں میں سے گذرے گا لیکن اگر ستارہ کا صعود مستقیم طریق الشمس کے قطب سے $\frac{1}{2}$ ۲۳° سے کم فاصلہ پر ہو تو وہ ہمیشہ ۱۲ گھنٹوں سے بڑا ہوگا۔

اگر لا = مس $\frac{1}{2}$ ک تو مساواتوں (۲) اور (۷) سے حاصل ہوتا ہے

لا^2 (۲ جب ضہ جب سہ جم سہ + جم ضہ جب عہ جم ۲ سہ ـ مس عہ جم ضہ جم عہ)

ـ ۲ لا (جم ضہ جم عہ جم سہ + مس عہ جب ضہ جب سہ + مس عہ جم ضہ جب عہ جم سہ)

+ مس عہ جم ضہ جم عہ ـ جم ضہ جب عہ = ۰

اس دو درجی کی اصلوں کے حقیقی ہونے کی شرط بآسانی حسب ذیل حاصل ہوتی ہے

مس^2 عہ جم^2 بہ + جم^2 سہ ـ جب^2 بہ > ۰

جہاں بہ ستارہ کا عرض بلد ہے۔ اگر بہ < (۹۰° ـ سہ) تو عہ کی ہر قیمت کے جواب میں ک کی ایک حقیقی قیمت معلوم ہو سکتی ہے۔

نیز مثال (۱۱) سے حاصل ہوتا ہے

جب ضہ جم سہ ـ جم ضہ جب عہ جب سہ = جب بہ

اگر بہ > (۹۰° ـ سہ) تو جب عہ ہمیشہ منفی ہونا چاہیئے۔

مثال ۱۳ ـ لا کا محور اعتدال ربیع میں سے گذرتا ہے، ما کا محور خط استواء کے مستوی میں ہے اور محور لا پر عمود ہے، ی کا محور زمین کا قطبی محور ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

فرض کرو کہ اِن قائم محوروں کے حوالہ سے ایک ستارے کے محدد لا، ما، ی ہیں۔ مان لو کہ طریق الشمس ثابت ہے اور استقبال کو طریق الشمس کے قطب کے گرد خط استواء کے قطب کی گردش سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جس کی زاوئی شرح ق ہے فرض کرو کہ ت سال کے وقفہ کے بعد اس ستارہ کے محدد محوروں کے نئے محلوں کے حوالہ سے ضا، عا، طا ہیں۔

ثابت کرو کہ محددوں کے اِن دو جٹوں کے درمیان حسب ذیل روابط ہیں

ضا = لا جم ق ت - ما جم سہ جب ق ت - ی جب سہ جب ق ت،

عا = لا جم سہ جب ق ت + ما (جم² سہ جم ق ت + جب² سہ) + ی جم سہ جب سہ (جم ق ت - ۱)،

طا = لا جب سہ جب ق ت + ما جم سہ جب سہ (جم ق ت - ۱) + ی (جب² سہ جم ق ت + جم² سہ)

جہاں سہ طریق الشمس کا میلان ہے۔

چونکہ لا = جم ضہ جم عہ، ضا = جم ضہ جم عہَ (۱۸۴)

ما = جم ضہ جب عہ، عا = جم ضہَ جب عہَ،

ی = جب ضہ، طا = جب ضہَ

اس لیے ک = ق ت رکھنے اور سہَ = سہ فرض کرنے سے مطلوبہ نتیجے مساواتوں (۲)، (۶)، (۷) سے فوراً حاصل ہوتے ہیں۔

***مثال ۱۴** — یہ فرض کرکے کہ ایک مدار کا قطب یکساں رفتار سے ایک چھوٹے دائرہ میں حرکت کرتا ہے معلوم کرو کہ کونسے بڑے دائروں پر عقدوں کی حرکت (۱) یکساں ہے (۲) مسلسل لیکن متغیر ہے (۳) اہتزازی ہے، اور ثابت کرو کہ آخری صورت میں عقدہ کی راست حرکت رجعی حرکت کی بہ نسبت زیادہ وقت لیتی ہے۔

فرض کرو کہ سہَ (= ۹۰° - ط) اُس دائرہ کا نصف قطر ہے جو متحرک قطب ق ثابت نقطہ ق کے گرد مرتسم کرتا ہے تو وہ بڑا دائرہ ج جس کا قطب ق ہے دائرہ ج کو جس کا قطب ق ہے مستقل زاویہ سہَ پر قطع کرتا ہے۔ عقدہ یکساں طور پر ج پر حرکت کرتا ہے اور ج کے سوا کوئی اور بڑا دائرہ نہیں ہے جس پر عقدہ یکساں طور پر حرکت کرتا ہو۔ ج کے متوازی دو چھوٹے دائرے ج۱ اور ج۲ کھینچو جو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ج کی مخالف سمتوں میں ہوں اور اس سے مستقل فاصلہ سہ پر واقع ہوں۔ اب چونکہ ج پر کا کوئی نقطہ، ج سے سہ سے زیادہ فاصلہ پر نہیں ہو سکتا اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ج پر کے سب نقطے ج۱ اور ج۲ کے درمیانی منطقہ ے میں واقع ہونے چاہئیں۔ اس لیے کسی دوسرے دائرہ و سے منقطع ہونے والے ج کے تمام ممکن عقدے اس منطقہ ے میں محدود ہیں۔



شکل (۶۰)

دائرہ ج، ج۱ اور ج۲ کو جن نقطوں پر مس کرتا ہے اپنے متصلہ محل ہے ان نقطوں پر منقطع ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وہ عقدہ جس میں دائرہ ج کسی اور دائرہ و کو قطع کرتا ہے مقیم ہو تو یہ عقدہ، ج۱ یا ج۲ پر واقع ہونا چاہئے۔

اگر وہ عقدہ جس میں ثابت دائرہ و، ج سے منقطع ہوتا ہے مسلسل آگے بڑھے تو اسے کسی نقطہ پر مقیم نہ ہونا چاہئے اور اس لیے و کو ج۱ اور ج۲ کے ساتھ کوئی حقیقی نقاط تقاطع نہیں رکھنے چاہئیں اس لئے اسکو منطقہ ے کے اندر محدود ہونا چاہئے۔

اگر و منطقہ ے کے اندر محدود نہیں ہے تو عقدے صرف اہتزاز کر سکتے ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں عقدے منطقہ ے کے اندر واقع ہوتے ہیں لہذا یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ و کے ان حصوں میں داخل نہیں ہو سکتے جو ے کے باہر ہیں اور اس لیے ہر عقدے کو ان دو قوسوں میں سے ایک میں اہتزاز کرنا چاہئے جو و پر سے منقطع ہوتی ہیں۔

فرض کرو کہ ج۱ اور ج۲ کے ساتھ ج کے نقاط تماس ت۱ اور ت۲

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہیں اور فرض کرو کہ $و_1$ اور $و_2$ وہ نقطے ہیں جن میں و کی ایک قوس ج$_1$ اور ج$_2$ میں ختم ہوتی ہے۔

فرض کرو کہ $و_1$ سے و تک کھینچی ہوئی قوس اُس سمت کے ساتھ ایک عادہ زاویہ بناتی ہے جس میں ج$_1$ پر واقع شدہ ج کے عقدے حرکت کر رہے ہیں۔ جب ت$_1$، $و_1$ پر منطبق ہوتا ہے تو اُس عقدہ کی راست حرکت $و_1$ $و_2$ پر شروع ہو رہی ہو گی۔ لیکن یہ راست حرکت اُس وقت تک ختم (۱۸۵)
نہیں ہو گی جبتک کہ ت$_2$، $و_2$ پر منطبق نہ ہو جائے اور اس کے لیے ج کو نصف سے زیادہ حصہ میں سے گھمانا پڑے گا یعنی راست امتزاز ج کے کل دور کا نصف سے زیادہ حصہ لیتا ہے۔ لیکن ت$_2$ جب $و_2$ سے گذر جاتا ہے تو رجعی حرکت شروع ہوتی ہے اور یہ اُس وقت ختم ہو گی جبکہ ت$_1$ پھر $و_1$ پر پہنچ جائے اور اِس لیے مکمل گردش کے نصف سے کم ضرورت ہو گی۔

ہم اِس مسئلہ کی تحقیق اِس طرح بھی کر سکتے ہیں:۔ فرض کرو کہ ھ ف ھ (شکل ۶۰) دائرہ ج ہے، ھ ن دائرہ ج ہے اور ف ن دائرہ و۔ تب مثلث ف ھ ن سے حسب دفعہ ۱ ضابطہ (۶) حاصل ہوتا ہے

جم عہ جب ک + جب عہ جم ک جم سہ = جب عہ مم سہ جب سہ = ۰ ..... (۱)

عہ اور ک کی متناظر تبدیلیاں معلوم کرنے کے لیے ہم سہ اور سہ کو مستقل سمجھ کر تفرق کرتے ہیں تو حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\text{مف عہ}}{\text{مف ک}} = \frac{\text{جم عہ جم ک ۔ جب عہ جب ک جم سہ}}{\text{جب عہ جب ک ۔ جم عہ جم ک جم سہ + جم عہ مم سہ جب سہ}}$$

اگر ن ایک مقیم عقدہ ہو تو جم عہ جم ک ۔ جب عہ جب ک جم سہ = ۰ یعنی ھ ن = ۹۰° جس کے یہ معنی ہیں کہ سہ، ن سے ف ھ پر عمود ہے جو فی الحقیقت وہی شرط ہے کہ ن، ج$_1$ پر واقع ہونا چاہیئے۔ پس ہم معلوم کرتے ہیں کہ جم ک = مس سہ مم سہ اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ھ ایک قوس ۲ ک پر حرکت کرتا ہے اور اس اثنا میں عقدہ ج$_2$ پر کے مقیم عقدے ن سے ن تک رجعت کرتا ہے۔ شکل میں جو صورت تعبیر کی گئی ہے اُس میں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

چونکہ مس سہ مم سہ مثبت ہے اس لیے ک < ۹۰° یعنی ۲ ک نصف محیط سے کم ہے، اس لیے اہتزازی حرکت میں عقدوں کی رجعی حرکت راست حرکت کی بہ نسبت کم وقت لیتی ہے۔

* مثال ۱۵ — وہ وقفہ جو ایک دئے ہوئے نصف النہار پر ایک ہی ستارے کے دو متصل مرورں کے درمیان ہوتا ہے استقبال کی وجہ سے ایک اوسط کوکبی یوم سے مختلف ہوگا۔ اگر ستارہ کا عرض التمام قطب کے عرض التمام سے کم ہو تو ثابت کرو کہ یہ فرق معدوم ہوگا جبکہ قطب اور ستارہ کے طول بلدوں کا

فرق جم $\frac{\text{مس (ستارہ کا عرض التمام)}}{\text{مس (قطب کا عرض التمام)}}$ ہو۔

* مثال ۱۶ — اگر ایک دوہرے تارے کے چھوٹے جزو ترکیبی کا زاویہ محل لمحہ ت. پر م. ہو تو ثابت کرو کہ اگر صرف استقبال کا اثر ملحوظ رکھا جائے تو کسی دوسرے لمحہ ت پر زاویہ محل م مساوات

م = م. + ۰٫۳۳۴۲ (ت - ت.) جب عہ قط ضہ

سے حاصل ہوگا جہاں اس زوج کے صدر تارے کا صعود مستقیم اور میل عہ، ضہ ہیں اور ت اور ت. کو سالوں میں بیان کیا گیا ہے۔

۵۸ — راس الحمل کی حرکت طریق الشمس پر۔

استقبال اور کبو کی وجہ سے خط استواء اور طریق الشمس کا نقطہ تقاطع جسے ہم راس الحمل (♈) کہتے ہیں طریق الشمس پر (جسے ثابت فرض کر لیا گیا ہے) متحرک ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا محل وقت کا ایک تفاعل ہے اور اگر طریق الشمس پر کے کسی ثابت نقطہ و سے ♈ کا فاصلہ ص ہو تو ہم لکھ سکتے ہیں

ص = ا + ب ت + د

اس مساوات میں ت وہ وقت ہے جو کسی مستقل آن سے شمار کیا گیا ہے اور ا اور ب مستقل ہیں اور د میں صرف دوری رقمیں شامل ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِن رقموں میں ت، زاویوں کے جملوں میں آتا ہے جو د میں صرف اِن کی جیوب اور جیوب التمام کے ذریعہ داخل ہوتے ہیں۔ اِس طرح مقداروں ب ت اور د کے درمیان ایک بنیادی فرق ہے چنانچہ اول الذکر مقدار وقت کی نسبت سے غیر محدود اضافے کی قابلیت رکھتی ہے اور اسمیں ب دراصل استقبال کا مستقل ہے۔ برخلاف اِس کے د کی قیمت حدود کے درمیان مقید ہے چنانچہ وہ کسی خاص مقدار + د سے بڑی نہیں ہوسکتی اور نہ - د سے کم ہوسکتی ہے جہاں د ایک محدود مقدار ہے۔ مقدار د وہ کبو ہے جس میں سے ص اُس یکساں طور پر متحرک محل کے گرد اہتزاز ہے جو وہ کبو کے موجود نہ ہونے کی صورت میں اختیار کرتا۔

فرض کرو کہ ن ایک نقطہ ہے جو طریق الشمس پر یکساں طور پر حرکت کرتا ہے اور نقطہ و سے اس کا فاصلہ وقت ت پر ل + ب ت سے تعبیر ہوتا ہے۔ ۷ بعض اوقات ن سے آگے ہوگا اور بعض اوقات اس کے پیچھے لیکن فاصلہ ۷ ن ہرگز د سے متجاوز نہیں ہوسکتا۔ ۷ کی حرکت بالاوسط وہی ہوگی جو ن کی ہے اور اس لیے ن کو اعتدال ربیع کا اوسط نقطہ سمجھا جاسکتا ہے جو طریق الشمس پر یکساں طور پر حرکت کرتا ہے اور جس کے عین قرب میں راس الحمل ہمیشہ پایا جاتا ہے۔

چونکہ کسی ستارے کے طول بلد کو طریق الشمس پر ۷ سے پیمائش کرتے ہیں اس لیے یہ ظاہر ہے کہ یہ طول بلد ۷ کی حرکت کی وجہ سے بالعموم بڑھتے رہنا چاہیے اگرچیکہ خود ستارہ ذاتی حرکت سے محروم ہو۔ صدر رقموں کی عددی قیمتیں[1] داخل کرنے سے طریق الشمس پر کسی ستارے کے اصلی طول بلد کے لئے حسب ذیل جملہ حاصل ہوتا ہے:-

[1] علماء ہیئت کی ایک کانفرنس نے جو بمقام پیرس بماہ مئی ۱۸۹۶ء منعقد ہوئی تھی اس جملہ کے سروں کی مندرجہ قیمتیں اختیار کی تھیں اور ابتک یہ بحری جنتری میں استعمال کی جاتی ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

لہ = لہ + ۲۶ء ۵۰ً ت - ۲۳۵ء ۱۷ً آجب چ - ۲۷ء آجب ۲ل

جہاں

لہ، ن کے حوالہ سے شروع سال پر ستارہ کا طول بلد ہے،
ت، سال کی وہ کسر ہے جو زیر بحث وقت تک گذر چکی ہے،
چ، چاند کے صعودی عقدہ کا ارض مرکزی طول بلد ہے،
ل، سورج کا اوسط طول بلد ہے جو ہمارے موجودہ مقصد کے لیے کافی صحت کے ساتھ سورج کا اصلی ارض مرکزی طول بلد سمجھا جا سکتا ہے۔

(۱۸۷) لہ کے اس جملہ میں دوسری رقم استقبال کی وجہ سے ہے۔ یہ رقم ستارے کے طول بلد میں سالانہ اضافہ ۲۶ء ۵۰ً کے جواب میں ہے۔ چونکہ اس رقم میں ت بطور ایک جزو ضربی کے شامل ہے اس لیے وہ غیر محدود اضافہ قبول کرنے کی اہلیت رکھتی ہے اور اس لیے وہ لہ کے جملہ کی تین متغیر رقموں میں سے زیادہ اہم ہو سکتی ہے۔

تیسری رقم میں چ آتا ہے جو چاند کے صعودی عقدہ (طریق الشمس پر) کا طول بلد ہے۔ اس رقم سے راس الحمل کا طول بلد (+ ۲۳۵ء ۱۷ً) سے (- ۲۳۵ء ۱۷ً) تک اپنی اوسط قیمت کے کسی ایک جانب متغیر ہو سکتا ہے۔ چونکہ عقدے طریق الشمس کے گرد تقریباً ۱/۲ ۱۸ سال میں گردش کر لیتے ہیں اس لیے کبو اس امر کا باعث ہوتا ہے کہ ۷ اپنے اوسط مقام سے تقریباً ۹ سال تک آگے رہتا ہے اور پھر تقریباً ۹ سال تک اپنے اوسط مقام سے پیچھے۔ لہ کے جملہ کی آخری رقم سورج کی باعث طول بلد میں کبو ہے، اسے ل کی رقوم میں بیان کیا گیا ہے جو سورج کا اوسط طول بلد ہے، اس رقم کا دور تقریباً چھ ماہ ہے۔

طول بلد پر اثر رکھنے کے ماسوا کبو طریق الشمس کے میلان پر دوری اثر بھی رکھتا ہے، اس لیے کسی دئے ہوئے وقت پر اصلی میلان معلوم کرنے کے لیے شروع سال کے اوسط میلان میں ۲۱ء ۹ً جم چ + ۵۵ء ۰ً جم ۲ل کا اضافہ کرنا چاہئے۔ یہاں یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ سیاروی استقبال

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(دفعہ ۵۶) کی وجہ سے بھی طریق الشمس کے میلان میں ایک اور خفیف تغیر ہوتا ہے۔ میلان کے تغیر کی مجموعی مقدار جو ان اسباب سے پیدا ہوتی ہے ایک تخفیف ہے جس کی شرح سالانہ ۴۶۸ء۰" ہے۔

کبو کے (چھوٹی رقموں کو ترک کرکے) اور سیارہ کی استقبال کے مجموعی اثر کی وجہ سے طریق الشمس کے میلان[1] کے لیے حسب ذیل جملہ تاریخ ت کے لیے حاصل ہوتا ہے:-

۲۳° ۲۷′ ۵۸ء۳″ - ۴۶۸ء۰" (ت - ۱۹۱۰)

+ ۲۱ء۹" جم ج + ۵۵ء۰" جم ۲ ل

اس جملہ کی آخری دو رقموں سے کبو کافی صحت کے ساتھ تغیر ہوتا ہے

یہ پورا جملہ ایفیمرس (Ephemeris.) میں دیا گیا ہے۔ (دیکھو مثال ۵)

مثال ۱ — استقبال کے مستقل کی نیوکمب کی قیمت (جو بحری جنتری میں استعمال کی گئی ہے) یہ ہے

۲۴۵۳ء۵۰" + ۲۲۲۵ء۰۰۰" ت

جہاں ت، سنہ ۱۸۵۰ء سے سالوں میں وقفہ ہے۔

ثابت کرو کہ اس سے سنہ ۱۹۰۹ء میں استقبال کا مستقل ۲۵۸۴ء۵۰" حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۲ — اگر طول بلدوں کا مبداء سنہ ۱۹۰۸ء میں اوسط اعتدالی نقطہ کا محل ہو تو بتاریخ ۲۹ جون سنہ ۱۹۰۸ء راس الحمل کا طول بلد اور طریق الشمس کا میلان معلوم کرو، یہ دیا گیا ہے کہ ج = ۹۴ء۹°، ل = ۹۷° اور ت = ۰۴۹۳ء۔ (۱۸۸)

---

[1] نیوکمب نے سنہ ۱۷۵۰ء سے سنہ ۲۱۰۰ء تک آٹھ متساوی الفصل زمانوں کے لیے اوسط میلان کی حسب ذیل قیمتیں دی ہیں، اسفریکل اسٹرانومی صفحہ ۲۳۸۔

سنہ ۱۷۵۰ء ۲۳° ۲۸′ ۱۸ء۵۱″ سنہ ۱۹۰۰ء ۲۳° ۲۷′ ۸ء۲۶″ سنہ ۲۰۵۰ء ۲۳° ۲۵′ ۵۷ء۹۹″

سنہ ۱۸۰۰ء ۲۳° ۲۷′ ۵۵ء۱۰″ سنہ ۱۹۵۰ء ۲۳° ۲۶′ ۴۴ء۸۴″ سنہ ۲۱۰۰ء ۲۳° ۲۵′ ۳۴ء۵۶″

سنہ ۱۸۵۰ء ۲۳° ۲۷′ ۳۰ء۶۸″ سنہ ۲۰۰۰ء ۲۳° ۲۶′ ۲۱ء۴۱″

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِس وقفہ میں طول بلد میں استقبال ۸ ؍ ۲۴ ؍ ہے اور کبو کی رقمیں علی الترتیب
- ۱ ؍ ۱۷ ؍ اور + ۳ ؍ ۰ ؍ ہیں اس لیے جواب ۰ ؍ ۸ ؍ ہے۔ اسی طرح میلان
۲۳° ۲۷′ ۹۶ ؍ ۲ ؍ حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۳ ۔ ثابت کرو کہ آغاز سال ۱۹۰۹ء سے طول بلد میں استقبال
بتاریخ ۷ نومبر ۱۹۰۹ء ۷ ؍ ۲۱ ؍ ہے اور کبو - ۳ ؍ ۱۷ ؍ ہے یہ دیا گیا ہے کہ ل = ۱ ؍ ۲۲۶°
اور چ = ۷ ؍ ۶۸°

مثال ۴ ۔ اگر ۱۹۰۹ء میں طریق الشمس کے میلان کی اوسط قیمت
۲۳° ۲۷′ ۴ ؍ ۰۴ ؍ ہو تو ثابت کرو کہ بتاریخ ۱۰ جون ۱۹۰۹ء اس کی ظاہری قیمت
۲۳° ۲۷′ ۴۸ ؍ ۵ ؍ ہوگی جبکہ چ = ۶ ؍ ۶۷° اور ل = ۲ ؍ ۲۸°۔

* **مثال ۵** ۔ اگر طریق الشمس کے میلان کے کبو مف سہ کو زیادہ
مکمل جملہ (بحری جنتری ۱۹۱۰ء صفحہ ۵)

مف سہ = + ۲۱۰ ؍ ۹″ جم چ - ۰۹۰ ؍ جم ۲ چ + ۱۵۵۱ ؍ ″ جم ۲ ل
- ۰۰۹ ؍ ″ جم (ل - ۲۸ ؍ ۶°) + ۰۲۲ ؍ ″ جم (۳ ل + ۲۸ ؍ ۶°)

سے محسوب کیا جائے تو ثابت کرو کہ بتاریخ یکم مئی ۱۹۰۹ء میلان کا کبو + ۹۷ ؍ ۱۷ ہے
جبکہ یہ دیا گیا ہو کہ چاند کے صعودی عقدہ کا طول بلد چ = ۷ ؍ ۸۱° اور سورج کا
اوسط طول بلد ل = ۸ ؍ ۳۸°۔

* **مثال ۶** ۔ اگر طول بلد کے کبو مف ل کو زیادہ مکمل جملہ

مف ل = - ۲۳۵ ؍ ۱۷ ؍ جب چ + ۲۰۹ ؍ ″ جب ۲ چ - ۲۷۰ ؍ ۱۷ ؍ جب ۲ ل
+ ۱۰۷ ؍ ″ جب (ل + ۳ ؍ ۷۴°) - ۰۰۵ ؍ ″ جب (۳ ل + ۶ ؍ ۲۸°)

سے محسوب کیا جائے تو ثابت کرو کہ بتاریخ ۲۷ دسمبر ۱۹۰۹ء اس کی قیمت - ۳۷ ؍ ۱۵ ؍
ہے، یہ دیا گیا ہے کہ چ = ۰۰ ؍ ۶۶° اور ل = ۳۳ ؍ ۲۷۵°۔

* **۵۹ ۔ غیر تابع یومی اعداد** ۔ اگر کسی ستارے کی کوئی ذاتی حرکت
نہ بھی ہو جیسا کہ ہم فی الحال فرض کریں گے تو بھی اس کے محدد استقبال اور کبو
کی باعث مسلسل بدلتے رہنے چاہئیں۔ اب ہم یہ فرض کر سکتے ہیں کہ طریق الشمس

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ایک ثابت دائرہ ہے اور اوسط اعتدالی نقطہ طریق الشمس پر یکساں حرکت کرتا ہے اور اس لیے اس کا اوسط فاصلہ راس الحمل کے نقطہ سے صفر ہے۔ اوسط خط استواء تاریخ ت پر طریق الشمس کو اوسط اعتدالی نقطہ پر قطع کرتا ہے اور حسب تشریح بالا طریق الشمس کے ساتھ زاویہ

۲۳° ۲۷′ ۵۸″ ۳‴ ۴۶۸ء (ت - ۱۹۱۰)

کا میلان رکھتا ہے۔

کسی ستارہ کے اوسط صعود مستقیم اور میل سے اس ستارہ کا وہ صعود مستقیم اور میل سمجھا جائے گا جو آغاز سال پر اوسط خط استواء کے حوالہ سے لئے گئے ہوں۔ اب ہمارے سامنے یہ مسئلہ ہے کہ کسی خاص دن کسی ستارہ کے ظاہری محدد عہ، ضہ کیا ہیں جبکہ اس کے محدد عہ اور ضہ اس سال کے لئے دئے گئے ہوں جس میں یہ دن آتا ہے۔ (۱۸۹)

مطلوبہ مساواتیں دفعہ ۵۷ کے عام ضابطوں (۶)، (۲)، (۷) سے حاصل ہوں گی اور موجودہ مقصد کے لیے ک اور سہ - سہ چھوٹی مقداریں سمجھی جا سکتی ہیں جن کے مربع یا حاصل ضرب نظر انداز کئے جا سکتے ہیں۔ ان حالات کے تحت محولۂ بالا مساواتیں، مساواتوں

جب ضہ = جب ضہ + جب ک جب سہ جم ضہ جم عہ + جب (سہ - سہ) جم ضہ جب عہ،

جم ضہ جم عہ = جم ضہ جم عہ - جب ک جب سہ جب ضہ - جب ک جم سہ جم ضہ جب عہ،

جم ضہ جب عہ = جم ضہ جب عہ + جب ک جم سہ جم ضہ جم عہ - جب (سہ - سہ) جب ضہ

میں تحویل ہوتی ہیں اور ان سے حسب ذیل مساواتیں حاصل ہوتی ہیں

جم ضہ جب (عہ - عہ) = جب ک (جم سہ جم ضہ + جب سہ جب ضہ جب عہ)

- جب (سہ - سہ) جب ضہ جم عہ،

۲ جب $\frac{1}{2}$ (ضہ - ضہ) = جب ک جب سہ جم عہ + جب (سہ - سہ) جب عہ

پس اگر عہ - عہ کو وقت کے ثانیوں میں اور ضہ - ضہ، ک اور سہ - سہ کو قوس کے ثانیوں میں بیان کیا جائے تو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$\left.\begin{aligned} عَ - ع &= \frac{1}{15} ک\ جم\ سہ + \frac{1}{15}\{ک\ جب\ سہ\ جب\ ع - (سَ - سہ)\ جم\ ع\}\ مس\ ضہ \\ ضَ - ض &= ک\ جب\ سہ\ جم\ ع + (سَ - سہ)\ جب\ ع \end{aligned}\right\} \ldots (۱)$$

اب ہم تین نئی مقداریں ف، گ، گ ایسی لیتے ہیں کہ

$$ف = \frac{1}{15} ک\ جم\ سہ،\ گ\ جم\ گ = ک\ جب\ سہ،\ گ\ جب\ گ = -(سَ - سہ) \ldots\ldots (۲)$$

تو مساواتیں (۱) ہو جاتی ہیں

$$\left.\begin{aligned} عَ - ع &= ف + \frac{1}{15} گ\ جب\ (گ + ع)\ مس\ ضہ \\ ضَ - ض &= گ\ جم\ (گ + ع) \end{aligned}\right\} \ldots (۳)$$

یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ف، گ، گ ستارہ کے محددوں پر منحصر نہیں ہیں، وہ صرف سال کے دن پر منحصر ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ بدلتے ہیں، ہم ان کو غیر تابع یومی اعداد کہینگے۔

کسی ستارہ کے محددوں پر استقبال اور کبو کے اثرات محسوب کرنیمیں آسانی پیدا کرنے کے لیے الفیمرس میں جدولیں دیجاتی ہیں جن میں سال کے ہر دن کے جواب میں غیر تابع یومی اعداد کی قیمتیں درج کی ہوئی ہوتی ہیں۔ ہر سال الفیمرس میں صحیح ضابطے دئے جاتے ہیں (مثلاً دیکھو بحری جنتری سنہ ۱۹۱۰ء صفحہ ۲۳۳) جن سے یومی اعداد ف، گ، گ محسوب کئے جا سکتے ہیں، نیز ان سے دیگر یومی اعداد بھی جن کا حوالہ ابتک ہم نے نہیں دیا ہے معلوم ہو سکتے ہیں۔ فی الحال (۱۹۰) جس حد تک ہمیں واسطہ ہے حسب ذیل تقریبی مساواتیں کافی ہونگی

$$\left.\begin{aligned} ف &= \frac{1}{15} جم\ سہ\ (۲۶،۵۰''\ ت - ۲،۱۷''\ جب\ چ - ۳،۱''\ جب\ ۲ل) \\ &= ۳،۰۷^{ش}\ (ت - ۲،۳۴\ جب\ چ - ۰،۲۵\ جب\ ۲ل) \\ گ\ جم\ گ &= جب\ سہ\ (۲۶،۵۰''\ ت - ۲،۱۷''\ جب\ چ - ۳،۱''\ جب\ ۲ل) \\ &= ۲۰،۰۵''\ (ت - ۲،۳۴\ جب\ چ - ۰،۲۵\ جب\ ۲ل) \\ گ\ جب\ گ &= -۹،۲''\ جم\ چ - ۶،۰''\ جم\ ۲ل \end{aligned}\right\} \ldots (۴)$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِن مساواتوں میں ل سورج کا اوسط طول بلد ہے اور چ خط اُستواء پر چاند کے صعودی عقدہ کا طول بلد ہے (دیکھو صفحہ ۲۸۷)۔
وقت ت سال کا وہ کسری حصہ ہے جو آغاز سال سے زیر بحث وقت تک گذر چکا ہے[1]۔
صعود مستقیم اور میل کے سالانہ استقبال کو راست ضابطوں (۳) کی مدد سے ف، گ، گ کی بجائے وہ قیمتیں درج کرنے سے حاصل کیا جا سکتا ہے جو ضابطوں (۴) سے حاصل ہوتی ہیں اگر ہم اُن رقموں کو خارج کر دیں جو کبو کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ (۳) میں ہم ف کی بجائے ۳ ث ۰٫۰۷۳ ت، ک کی بجائے ۰٫۰۵ ۲۰ اور گ کی بجائے صفر درج کرتے ہیں اور اس طرح ستارہ عہ، ضہ کے لیے ہمیں معلوم ہوتا ہے (حسب مثال ۱ دفعہ ۵۷) کہ

صعود مستقیم میں ایک سال کا استقبال، عہ کو
عہ + ۳ ث ۰٫۰۷۳ + ۳۳۶٫۱ ث جب عہ مس ضہ
میں تبدیل کرتا ہے
میل میں ایک سال کا استقبال، ضہ کو ..... (۴)
ضہ + ۰٫۰۵ ۲۰″ جم عہ
میں تبدیل کرتا ہے

اب ہم استقبال اور کبو کے عام مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ حسب ذیل ہے:
اگر سال ت کے آغاز پر ایک ستارہ کا صعود مستقیم اور میل

[1] یہ یاد رہے کہ جب زیادہ سے زیادہ صحت مطلوب ہوتی ہے تو سال کی ابتدا اُس لمحہ پر لیتے ہیں جبکہ سورج کا اوسط طول بلد ٹھیک ۲۸۰° ہو۔ سال ۱۹۱۰ء میں یہ طول بلد یکم جنوری کی صبح کے گ ۴ ۰ پر یعنے جنوری ۰٫۷۳۵ دن پر ہے۔ سنہ ۱۹۱۰ اور سنہ ۲۰۰۰ کے درمیان ہر اُستوائی سال کی ابتدا کے گرینوچ اوسط وقت کو معلوم کرنیکے لیے نیو کومب کی اسفیریکل اسٹرانومی کا ضمیمہ صفحہ ۴۰۳ دیکھو جہاں اور دوسری کارآمد جدولیں بھی دی گئی ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

عہ، ضہ دئے گئے ہوں تو سال ت، کے کسی دن اسی ستارہ کا ظاہری صعود مستقیم اور میل عہ، ضہ معلوم کرو جہاں تک کہ استقبال اور کبو کا تعلق ہے۔

پہلے اس ستارہ کے وہ محدد معلوم کرنے چاہئیں جو سال ت، (۷ ب) میں یکم جنوری کو اوسط خط استواء کے حوالے سے تھے۔ یہ محدد دئے ہوئے اوسط صعود مستقیم اور میل میں حسب ذیل استقبالات جمع کرنے سے حاصل ہوتے ہیں:۔

صعود مستقیم میں استقبال (۳ ث ۳ ۰۷۳، + ۳۳۶، ۱ جب عہ مس ضبہ) (ت، - ت ب) (۱۹۱)

میل میں استقبال (۰۵، ۲۰ً جم عہ) (ت، - ت ب)

اس طرح سال ت، میں بتاریخ یکم جنوری اوسط مقام معلوم کرنیکے بعد اس سال کی الیفمرس سے ف، گ، گ، کی قیمتیں اس مخصوص دن کے کے لیے جس کے لیے عہ، ضہ مطلوب ہیں معلوم کی جاتی ہیں اور ضابطوں (۳) کو استعمال کیا جاتا ہے تو حاصل ہوتا ہے

$$\left.\begin{aligned} \text{عہ} &= \text{عب} + (\overset{\text{ث}}{3}\,۰۷۳،\ 3 + ۳۳۶،\ ۱ \text{ جب عہ مس ضبہ})(\text{ت،} - \text{ت ب}) \\ &\quad + \text{ف،} + \tfrac{1}{15}\,\text{گ،} \text{ جب } (\text{گ،} + \text{عہ}) \text{ مس ضبہ} \\ \text{ضہ} &= \text{ضب} + ۰۵،\ ۲۰ \text{ً جم عہ} (\text{ت،} - \text{ت ب}) + \text{گ،} \text{ جم } (\text{گ،} + \text{عہ}) \end{aligned}\right\} \quad \ldots (۷)$$

ان ضابطوں کے اطلاق کی مثال حسب ذیل ہے۔ فرض کرو کہ گرینوچ پر جوزا (به) (Geminorum) کا ظاہری صعود مستقیم اور میل بتاریخ، نومبر ۱۹۱۰ء بوقت اوسط نیم شب محسوب کرنا مطلوب ہے جہاں تک کہ استقبال اور کبو کا تعلق ہے[1] گرینوچ کے دوسرے دس سالہ کٹیلاگ سے جسمیں ۶۸۹۲ ستاروں کے حوالے درج ہیں

[1] دیکھو بحری جنتری بابتہ ۱۹۱۰ء جس میں ضلالت اور ذاتی حرکت کے لیے بھی تصحیحات درج ہیں۔ نیز دیکھو گیارہواں باب دفعہ ۹۱۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

یہ معلوم ہوتا ہے کہ سنہ ۱۸۹۰ء میں جوزا (بہ) کا اوسط مقام حسب ذیل ہے:

عہ = ۷ گ ۳۸ م ۳۵٫۰۶ ش ، ضہ = ۲۸° ۱۷′ ۲۸٫۴″

اِن قیمتوں کو ۳٫۰۷۳ ش + ۳۳۶٫۱ ش جب عہ مس ضہ میں درج کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سالانہ استقبال ۳٫۷۲۷ ش ہے، پس چونکہ اس صورت میں ت - ت۱ بیس سال ہے اس لیے صعود مستقیم میں استقبال سنہ ۱۸۱۰ء کے اوسط مقام سے سنہ ۱۹۱۰ء کے اوسط مقام تک ۱ م ۵۴٫۴ ش ہے۔ اسی طرح میل میں سالانہ استقبال ۲۰٫۰۵″ جم عہ (= - ۳٫۸″) ہے اور اس لیے ۲۰ سال میں اس کی مقدار - (۲′ ۲٫۷″) ہوتی ہے۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ سنہ ۱۹۱۰ء میں جوزا (بہ) کا اوسط مقام حسب ذیل ہے

عہ = ۷ گ ۳۹ م ۶۰٫۹ ش ، ضہ = ۲۸° ۱۴′ ۱۲٫۴″

اب ہمیں وہ تصحیحات عمل میں لانی چاہئیں جن سے اس کا ظاہری مقام بتاریخ ۷ نومبر سنہ ۱۹۱۰ء حاصل ہوتا ہے۔ اس دن کے لیے بحری جنتری صفحہ ۲۵۰ سے حاصل ہوتا ہے

ف = ۱٫۷۵ ، لوک گ = ۱۰۹۹٫۱ ، گ = ۱۰′ ۳۳۲°

قوس میں عہ کا معادل ۱۴ م ۵۷٫۴ ش ہے، اس لیے گ + عہ = ۷ گ ۸٫۸°

اور اس لیے $\frac{1}{15}$ گ جب (گ + عہ) مس ضہ = ۴۶٫۰ ش، پس عہ کیلئے تصحیح ہے ۱٫۷۵ ش + ۴۶٫۰ ش = ۲٫۲۱ ش۔ میل ضہ کے لیے تصحیح ہے گ جم (گ + عہ) = ۷٫۰″۔

بالآخر بتاریخ ۷ نومبر سنہ ۱۹۱۰ء ستارہ کا مطلوبہ ظاہری مقام ہے

عَہ = ۷ گ ۳۹ م ۱۸۱٫۵۱ ش ، ضَہ = ۲۸° ۱۴′ ۱۹٫۴″

اگر وقت ت = ۰ پر خط استوا، پر کے ایک ستارہ کا صعود مستقیم اوسط (۱۹۲)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اعتدال کے حوالہ سے عہ ہو تو اس ستارہ کا اصلی صعود مستقیم وقت ت (جبکہ ت کو سالوں میں بیان کیا جائے) پر جہاں تک کہ ۷ کی حرکت کا تعلق ہے حسب ذیل ہوگا :-

عہ = عہ + ۳،۰۷۳ ث ت - ۱،۰۶ اث جب چ - ۰،۰۸ ث جب ۲ ل

اس ضابطہ میں ۳،۰۷۳ وہ سالانہ تبدیلی ہے جو صعود مستقیم میں استقبال کی باعث واقع ہوتی ہے اور پہلی دو رقمیں وقت ت پر اوسط صعود مستقیم کو تعبیر کرتی ہیں - آخری دو رقمیں کبو کی وجہ سے ہیں - پس ہم دیکھتے ہیں کہ کسی استوائی ستارہ کے صعود مستقیم کے تغیرات اپنی اوسط قیمت سے حدود + ۱۴،۱ اث اور - ۱۴،۱ اث کے درمیان رہتے ہیں - جہانتک کبو کی خاص رقم کا تعلق ہے ممکنہ تبدیلیوں کا ایک مکمل دور ۱/۲ ۸ سال میں پورا ہوتا ہے، جیسا کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے - یہ وہ مدت ہے جس میں چ، بقدر ۳۶۰° زاویہ کے بڑھتا ہے -

فرض کرو کہ چاند کے عقدہ کے طول بلد میں اور سورج کے اوسط طول بلد میں یومی تبدیلیاں علی الترتیب مف چ اور مف ل ہیں تو لا میں یومی تبدیلی کبو کی وجہ سے حسب ذیل ہوگی

- ۱،۰۶ اث جم چ مف چ - ۰،۱۶ ث جم ۲ ل مف ل

مف چ اور مف ل کی قیمتیں نیم قطری زاویوں میں تقریباً - ۰،۰۰۹۲۷ اور ۰،۰۱۷۲ ہیں اور اس لیے ۷ میں یومی تبدیلی قریب قریب

۰،۰۰۱ ث جم چ - ۰،۰۰۳ ث جم ۲ ل

کے مساوی ہے - اس جملہ کو حدود - ۰،۰۰۴ ث اور + ۰،۰۰۴ ث کے درمیان واقع ہونا چاہیئے اور اس لیے کسی کوکبی یوم اور اوسط کوکبی یوم کے درمیان فرق ۰،۰۰۴ ث سے متجاوز نہیں ہو سکتا اور نہ - ۰،۰۰۴ ث سے گھٹ سکتا ہے -

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہم نے دفعہ ۲۳ میں کوکبی یوم کی تعریف اُس وقفہ سے کی ہے جو ♈ کے دو متواتر مرُوروں کے درمیان ہوتا ہے۔ اب یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمام کوکبی یوم ٹھیک ٹھیک مساوی نہیں ہوتے کیونکہ ♈ کی حرکت بالکل یکساں نہیں ہے۔ اس لیے یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اوسط کوکبی یوم اور ظاہری کوکبی یوم میں، جو ♈ کے دو مرُوروں کے درمیان ہوتا ہے اور اس لیے کسی قدر متغیر ہے، امتیاز کرنا چاہیئے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اُس امتیاز کا خیال آتا ہے جو ظاہری شمسی یوم اور اوسط شمسی یوم کے درمیان ہے لیکن فی الحقیقت ان دو صورتوں میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ ایک ہی سال میں دو ظاہری شمسی دنوں کا درمیانی فرق دو کوکبی دنوں کے بڑے سے بڑے درمیانی فرق کا کئی ہزار گنا ہو سکتا ہے (دیکھو صفحہ ۳۳۲)۔

(۱۹۳) اگر ہمارے پاس ایک نظری طور پر مکمل گھڑی ہو جو بغیر کسی تصحیح کے ۱۸½ سال تک ایسا ٹھیک وقت دے کہ ہر اوسط کوکبی یوم کے ختم پر اس کی سوئیاں گ ۰ م ۰ ث وقت بتلائیں تو ♈ ۱۸½ سال تک روزانہ مختلف اوقات پر جو ۲۳ گ ۵۹ م ۵۶٫۵۸ ث اور گ ۰ ۰ م ۱۴٫۰۲ ث کے درمیان واقع ہوں گے مرُور کرے گا۔ لیکن ایسی کوئی کامل گھڑی موجود نہیں ہے اور بہترین گھڑیاں جو موجود ہیں ان میں اکثر مشاہدات کے مقابلہ سے تصحیح کرنی پڑتی ہے، وہ غلطیاں جو ایک تصحیح اور دوسری تصحیح کے درمیان پیدا ہوتی ہیں اور ♈ کی بے قاعدگیوں کی وجہ سے ہیں نظر انداز کیجاتی ہیں کیونکہ وہ خطا کے دیگر ماخذوں کے مقابلہ میں ناقابل قدر ہیں۔ اس لیے ہم کوکبی یوم کی تعریف یہ کرتے ہیں کہ اس کا آغاز، اصلی راس الحمل کے مرُور سے ہوتا ہے۔

کوکبی وقت کی پیمائش پر ♈ کی حرکت کے اثر کی حقیقی حد کی وضاحت کے لیے ہم ۱۰ جون اور ۲۰ جون ۱۹۰۹ء کی صورت لیں گے۔ پہلی تاریخ کے لیے الفیرس سے کبو ۰۵٫۱۰ ث اور دوسری تاریخ کے لیے ۰۲٫۱۰ ث

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

حاصل ہوتا ہے۔ خطا کے دیگر ذریعوں کو نظر انداز کرنے سے کبو کے تغیر کی شرح اوسطاً ۳۰۰ ثانیہ فی یوم کے مماثل ہے۔ اب یہ ظاہر ہے کہ اسقدر چھوٹی مقدار بمقابل اُن بڑی تبدیلیوں کے جو گھڑی کی شرح میں اُسکے کل پُرزوں کے نقائص یا آب و ہوا کے اثرات سے پیدا ہوتے ہیں قابل التفات نہ ہو سکے گی۔ نیز ۷ کی بے قاعدگی سے جو خطا پیدا ہوتی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جمع نہیں ہوتی کیونکہ ۱۸ر اکتوبر کو کبو پھر ۰۵ر۰ آگے ہو جاتا ہے اور اس لیے ۱۰ر جون سے ۱۸ر اکتوبر تک اِس سبب سے گھڑی کی شرح کی اوسط ظاہری تبدیلی صفر ہوگی۔

پس گھڑی کی خطا کو اکثر متعین کرتے رہنے سے نہ صرف وہ چھوٹی بے قاعدگیاں دُور ہونگی جو گھڑی جیسی مشین میں ناگزیر ہیں خواہ وہ کتنی ہی احتیاط سے بنائی جائے بلکہ ساتھ ہی ہم یہ مان سکیں گے کہ تصحیح کے بعد جو کوئی وقت گھڑی سے معلوم ہوتا ہے وہ پوری ضروری صحت کے ساتھ راس الحمل کا ساعتی زاویہ ہے۔

ایک ستارہ کے مقام پر استقبال اور کبو کے اثرات کی تحقیق حسب ذیل دوسرے طریقہ سے کرنا مفید ہوگا۔

چونکہ ستارہ کا طول بلد راس الحمل سے ناپا جاتا ہے اِس لیے خط اُستواء کی استقبالی حرکت ستارہ کے طول بلد کو تبدیل کرے گی لیکن اِس کا عرض بلد غیر متغیر رہے گا۔ مثلاً اگر ستارہ کا طول بلد کسی وقت ہ لہ ہو اور اگر راس الحمل اس طرح حرکت کرے کہ ستارہ کا طول بلد لہ + مف لہ ہو جائے اور ساتھ ہی میلان سہ، سہ + مف سہ ہو جائے تو مساواتوں کے حسب ذیل دو نظامات حاصل ہوتے ہیں۔ اِن میں مساواتوں (۱)، (۲)، (۳) سے عہ اور ضہ کی قیمتیں پہلی آن کے لیے حاصل ہوتی ہیں اور پھر مساواتوں (۴)، (۵)، (۶) سے مف عہ اور مف ضہ ملتے ہیں جو زیر بحث وقفہ میں استقبال کی وجہ سے اِن محددوں کی تبدیلیاں ہیں۔

جم ضہ جب عہ = جب لہ جم بہ جم سہ − جب بہ جب سہ، ..... (۱)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جم ضہ جم عہ = جم لہ جم بہ، ..... (۲)

جب ضہ = جب لہ جم بہ جب سہ + جب بہ جم سہ، ..... (۳)

اور

جم (ضہ + مف ضہ) جب (عہ + مف عہ) = جب (لہ + مف لہ) جم بہ جم (سہ + مف سہ)

- جب بہ جب (سہ + مف سہ)، ... (۴)

جم (ضہ + مف ضہ) جم (عہ + مف عہ) = جم (لہ + مف لہ) جم بہ، ..... (۵)

جب (ضہ + مف ضہ) = جب (لہ + مف لہ) جم بہ جب (سہ + مف سہ)

+ جب بہ جم (سہ + مف سہ)، ..... (۶)

اِن مساواتوں سے مف عہ اور مف ضہ معلوم ہوتے ہیں جبکہ مف لہ اور مف سہ دئے گئے ہوں اور حل عام ترین صورت میں بغیر کسی ابہام کے حاصل ہوتا ہے۔ لیکن علم ہیئت میں وہ صورت جو سب سے زیادہ عام طور پر مستعمل ہے اُس میں یہ چار مقداریں مف لہ، مف سہ، مف عہ، مف ضہ سب کی سب چھوٹی مقداریں ہیں اور ہم راست حسب ذیل طریقہ پر عمل جاری رکھتے ہیں:-

(۳) کو تفرق کرنے اور جم ضہ سے تقسیم کرنے (کیونکہ ضہ = ۹۰° کی صورت پر غور کرنے کی ضرورت نہیں ہے) سے اور مختصر کرنے سے حاصل ہوتا ہے

مف ضہ = جم عہ جب سہ مف لہ + جب عہ مف سہ

نیز (۱) کو تفرق کرنے اور جم ضہ سے تقسیم کرنے سے

جم عہ مف عہ - مس ضہ جب عہ مف ضہ = جم عہ جم سہ مف لہ - مس ضہ مف سہ

اس طرح حسب ذیل نتیجے حاصل ہوتے ہیں جن سے صعود مستقیم اور میل پر استقبال کے اثرات اکثر مقاصد کے لیے کافی صحت کے ساتھ محسوب کئے جا سکتے ہیں۔

اگر راس الحمل کا محل طریق الشمس پر اس طرح ہٹے کہ سب طول بلد بقدر چھوٹی مقدار مف لہ کے بڑھ جائیں اور اگر میلان سہ میں بقدر چھوٹے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

زاویہ مف سہ کے اضافہ ہو تو کسی ستارہ کے صعود مستقیم اور میل میں متناظر تبدیلیاں مف عہ اور مف ضہ، مساواتوں

مف عہ = (جم سہ + جب عہ مس ضہ جب سہ) مف لہ - مس ضہ جم عہ مف سہ

مف ضہ = جم عہ جب سہ مف لہ + جب عہ مف سہ

سے ملیں گی۔

مثال ۱ — ثابت کرو کہ کسی دئے ہوئے دن میں جن ستاروں کے میل استقبال کی وجہ سے بڑھ جاتے ہیں اور جن کے میل استقبال کی وجہ سے گھٹ جاتے ہیں اِن دونوں کے درمیان خط فاصل ایک بڑا دائرہ ہے جس پر کے ستارے اُس دن میل میں کوئی استقبال نہیں رکھتے۔

کیونکہ اگر جم (گ + عہ) = ۰ تو وہ سب ستارے جن کا صعود مستقیم ۹۰° - گ یا ۲۷۰° - گ ہے میل میں استقبال کی وجہ سے نہیں بدلتے۔

مثال ۲ — ثابت کرو کہ غیر تابع یومی اعداد سے کس طرح طریق الشمس کا (۱۹۲۵) میلان آسانی کے ساتھ محسوب کیا جا سکتا ہے۔

دفعہ ۵۹ کی مساوات کی رُو سے گ جب گ = - (سہ - سہ) اور اس لیے سہ = سہ - گ جب گ

مثلاً بتاریخ ۲ مارچ سنہ ۱۹۱۰ء بحری جنتری صفحہ ۲۴۵ سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ لوک گ = ۲۳۲ ۷۲ ۰، اور گ = ۲۴۳° ۴۹' ۰" اِس لیے گ جب گ = - ۴۷ ۴"، اور چونکہ اوسط میلان بابتہ سنہ ۱۹۱۰ء (بحری جنتری صفحہ ۱) ۲۳° ۲۷' ۵۸ ۳"، ہے اِس لیے میلان جبکہ اِس کی تصحیح کبو کے لیے کی جائے ۲۳° ۲۷' ۳۲ ۸"، ہے۔ نیز چونکہ اوسط میلان یکساں طور پر سالانہ ۴۶۸ ۰" کی شرح سے گھٹتا ہے اِس لیے اِس میلان میں سے ۰۸ ۰" گھٹانا چاہیئے تاکہ ۲ مارچ سنہ ۱۹۱۰ء کو ظاہری میلان حاصل ہو جائے چنانچہ یہ میلان ۲۳° ۲۷' ۲۴ ۸"، ہے۔ (دیکھو بحری جنتری صفحہ ۲۱۷)۔

مثال ۳ — سال کے آغاز پر اوسط اعتدالی نقطہ ♈ ہے۔ بتاؤ کہ ♈ کے لحاظ سے طریق الشمس پر ظاہری اعتدالی نقطہ کا محل ♈ کس طرح محسوب

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کیا جا سکتا ہے۔

۶۷. مقدار ک ہے جو دفعہ ۵۹ مساواتوں (۲) کی رُو سے (۲۲۵ ف^{۲} + گ^{۲} جم^{۲} گ)$^{\frac{1}{2}}$ کے مساوی ہے۔ مثلاً بتاریخ ۲۵ دسمبر سنہ ۱۹۱۰ء (نیم شب) ف = ۲ ، ۲۷۴ ، لوک گ = ۱ ، ۲۰۱۸ ، اور گ = ۴۷° ۳۳۸ (بحری جنتری صفحہ ۲۵۱) ، اس لیے ک = ۲ ، ۳۷ ۔

مثال ۴ ۔ ثابت کرو کہ دُب اصغر (صہ) کے صعود مستقیم میں سالانہ استقبال ۔ ۳۰ ، ۶ ش ہے ، یہ دیا گیا ہے کہ عہ = ۱۶ گ ۵۶ م ۱۲ ش اور ضہ = ۸۲° ۱۲ ′ (۱۹۰۰ء) ۔

مثال ۵ ۔ اس امر کی تشریح کرو کہ ایک سماوی گولے کی مدد سے کس طرح یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ تاروں کے جو مجموعے ۲۰۰۰ سال قبل کیمرج کے عرض بلد میں نظر آتے تھے وہ اب وہاں نظر نہیں آتے ۔ نیز یہ بتاؤ کہ آسمان کے کس حصہ میں وہ واقع ہیں ۔

۶۰ ۔ ستاروں کی ذاتی حرکتیں ۔ ہم دیکھ آئے ہیں کہ کسی ستارے کے صعود مستقیم اور میل میں تبدیلیوں کی ایک وجہ یہ ہے کہ اُن بڑے دائروں میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جن کے حوالہ سے ستارہ کے یہ محدد دیے جاتے ہیں ۔ اِن تبدیلیوں کے علاوہ بہت سے ستاروں کی صورت میں مقام کی حقیقی تبدیلیاں ہیں جو خود ستاروں کی اصلی حرکتوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں اِن تبدیلیوں کو ہم ذاتی حرکتیں کہیں گے ۔ وہ ستارہ جو شمالی نیم کرہ میں اِس قسم کی بڑی سے بڑی معلومہ حرکت رکھتا ہے بُرج کلاب الصید[1] میں مقدار ۶ ، ۵ کا ایک چھوٹا ستارہ ہے ۔ گروم برج (Groombridge) کے کیٹلاگ میں اس ستارہ کا عدد ۱۸۳۰ ہے اور اس کے محدد سنہ ۱۹۰۰ء کے لیے یہ ہیں

عہ = ۱۱ گ ۲ ، ۴۷ م ، ضہ = + ۳۸° ۲۶′

[1] Canes Venatici

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

یہ ستارہ سالانہ ۷ء کی ایک قوس پر حرکت کر لیتا ہے اور چونکہ اس کا فاصلہ بھی معلوم ہے اس لیے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ اس کی رفتار ۱۵۰ میل فی ثانیہ سے کم نہیں ہونی چاہئے۔ اس ستارہ کی حرکت سے بڑی حرکت رکھنے والا ایک چھوٹا ستارہ (مقدار ۵ء۸) جنوبی نیم کرہ میں ہے اور اسکی ذاتی حرکت سالانہ ۷ء۸ء ہے جس کو کپٹین اور انس (Kapteyen, Innes) نے معلوم کیا تھا۔ اس ستارہ کے محدد ہیں

عہ = ۵گ ۷ء۷م، ضہ = - ۴۵° ۳'

(۱۹۶) چمکدار تاروں میں بڑی سے بڑی ذاتی حرکت قنطورس (عہ

{عہ = ۱۴گ ۸ء۳۲م، ضہ = - ۶۰° ۲۵' (سنہ ۱۹۰۰ء)} کی ہے جس کی مقدار سالانہ ۳ء۷ء ہے اور اس کی سمت ایسی ہے کہ صعود مستقیم میں - ۴۹ء۳ ث کی اور میل میں + ۷ء۰ء کی سالانہ تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ سماک رامح (Arcturus) {عہ = ۱۴گ ۱۱ء۱م، ضہ = + ۱۹° ۴۲' (سنہ ۱۹۰۰ء)} سالانہ ۳ء۲ء کی ذاتی حرکت رکھتا ہے جو ۲۵۷ میل فی ثانیہ کی رفتار کے متناظر ہے اور اس ذاتی حرکت کا سالانہ اثر صعود مستقیم پر - ۰۸ء۰ ث اور میل پر - ۲ء۰ء ہے۔ ایفیمرس میں سال تمام کے لیے ستاروں کے ظاہری مقامات دینے میں ذاتی حرکت کا لحاظ رکھا جاتا ہے اگر وہ قابل قدر ہو۔

یہ ذاتی حرکتیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے وہ ہیں جو کرہ سماوی پر ستارہ کے محددوں کو متاثر کرتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی ستارہ خط نظر میں حرکت کر رہا ہو تو اس حرکت سے اس کے کروی محدد نہیں بدلتے اور ایسی حرکت کا وجود صرف طیف پیمائی مشاہدات سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً گروم برج ۱۸۳۰ کے متعلق یہ معلوم ہوا ہے کہ وہ ہمارے نظام شمسی کی طرف ۵۹ میل فی ثانیہ کی شرح سے آ رہا ہے۔ قبل ازیں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس ستارہ کی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مماسی رفتار ۱۵۰ میل فی ثانیہ ہے، اس لیے فضا میں سورج کے لحاظ سے اس کی کل رفتار تقریباً ۱۶۰ میل فی ثانیہ معلوم ہوتی ہے۔

۶۱ — ارضی عرض بلدوں میں تغیرات — کوٹنر (Kustner)

نے معلوم کیا کہ وہ محور جس کے گرد زمین گھومتی ہے بلحاظ زمین کے ایک چھوٹی حرکت رکھتا ہے۔ زمین کے محور میں ایسی تبدیلی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ارضی قطبوں کے محل بدل جاتے ہیں اور اس لیے ارضی خط استواء کا محل بدل جاتا ہے۔ اس لیے زمین کی سطح پر کے کسی نقطہ کے عرض بلد میں تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جو اس نقطہ کی واقعی حرکت کی وجہ سے نہیں ہیں بلکہ اس قاعدہ میں تبدیلیوں کی وجہ سے ہیں جس سے عرض بلد ناپے جاتے ہیں۔ اس مضمون کی سب سے پہلی باقاعدہ تحقیق چینڈلر (Chandler) نے ۱۸۹۱ء میں کی، اس سے یہ بتایا کہ عرض بلد میں مشاہدہ شدہ تبدیلیاں اس مفروض کے ذریعہ بظاہر سمجھائی جا سکتی ہیں کہ زمین کا قطب تقریباً چودہ ماہ کے وقفہ میں تیس فٹ کے نصف قطر کا ایک دائرہ مرتسم کرتا ہے۔ خود چینڈلر اور دیگر علماء ہیئت کی بعد کی تحقیقاتوں نے یہ ثابت کیا کہ گو یہ عام واقعہ صحیح ہے کہ قطب متحرک ہے لیکن اس کی حرکت کی نوعیت اسقدر سادہ نہیں ہے جیسے کہ پہلے فرض کیجا چکی تھی۔ ہم یہاں وہ نقشہ (شکل ۶۱) نقل کرتے ہیں جو پروفیسر البرشت (Albrecht.) نے انٹرنیاشنل جیوڈیٹک ایسوسی ایشن (Int. Geodetic Association) کے کام کے مشروط نتیجہ کے طور پر "Astronomische Nachrichten" میں دیا ہے۔ اس روئداد کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے جو مسٹر سڈنی ڈی ٹاونلی (Sidney Townley) نے (The Publications of the Astronomical Society of the pacific کی جلد ۱۹ صفحہ ۱۵۲ میں دی ہے۔

اس نقشہ میں شکل کے مرکز پر کا مبدأ زمین میں شمالی قطب کا اوسط محل ہے اور منحنیوں پر نشان کئے ہوئے نقطوں سے متناظر تاریخوں پر

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

قطب کے حقیقی محل معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً مرکز سے جو قریب ترین منحنی ہے اُس سے قطب کی حرکت ۱۸۹۹ء سے ۱۹۰۱ء تک معلوم ہوتی ہے اور پھر اِس سے آگے کی ترسیم اِس کے مختلف لفیفوں میں ۱۹۰۷ء تک معلوم کیجا سکتی ہے۔ یہ مشاہدہ طلب ہے کہ قطب کے محل ایک مربع کے اندر شامل ہیں جس کا ہر ضلع زمین کے مرکز پر تقریباً ۰٫۵۰" کا زاویہ بناتا ہے۔ پس قطب کی حرکتیں ان چھ سالوں میں ایک مربع کے اندر رہتی ہیں جس کے ضلع ۵۰ فٹ سے بڑے نہیں ہیں۔ انفرادی محل بڑی حد تک مشتبہ ہیں۔



شکل (۶۱)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

آٹھویں باب پر مثالیں

(۱۹۸)

مثال ۱۔ یہ تسلیم کرکے کہ استقبال کا مستقل ۵۰٫۲۴۵۳ً + ۰٫۰۰۰۲۲۲۵ ت ہے جہاں ت، سالوں میں ۱۸۵۰ء سے وقفہ ہے، سالوں کی وہ تعداد معلوم کرو جو ۷ کے طریق الشمس کا مکمل دور کرنے سے قبل گذرنی چاہئے۔

تکمل کرنے سے ت سال میں ۷ کی حرکت معلوم ہوتی ہے اور اگر لا وہ عدد ہو جس کی تلاش ہے تو ہمیں حاصل ہوتا ہے

۵۰٫۲۴۵۳ لا + ۰٫۰۰۰۱۱۱۲۵ لا^۲ = ۱۲۹۶۰۰۰

اس دو درجی کی دو اصلوں میں سے ایک منفی ہے اور اس لیے ناقابل قبول، دوسری اصل ۲۴۴۶۸ ہے یا تقریباً ۲۴۵۰۰۔

* **مثال ۲۔** ثابت کرو کہ کرۂ سماوی پر کے وہ نقطے جہاں استقبال اور کبو کی وجہ سے صعود مستقیم میں تصحیح کسی دئے ہوئے دن میں صفر ہے مخروط

ف (لا^۲ + ما^۲) + $\frac{۱}{۱۵}$ گ ی (لا جب گ + ما جم گ) = ۰

پر واقع ہوتے ہیں جہاں مبداء سورج کے مرکز پر ہے اور محاور + لا، + ما، + ے علی الترتیب ان نقطوں میں سے گذرتے ہیں جن کے صعود مستقیم اور میل (۰°، ۰°)، (۹۰°، ۰°)، (۰°، ۹۰°) ہیں اور جہاں ف، گ، گ زیر بحث دن کے لیے غیر تابع یومی اعداد ہیں۔ اگر کبو کو ترک کر دیا جائے، تو دفعہ ۵۷ کی مثال ۲ اخذ کرو۔

مثال ۳۔ کبو کو نظر انداز کرکے ثابت کرو کہ ستارہ (عہ، ضہ) کی نصف النہار تک دو متواتر واپسیوں کے درمیان وقفہ کوکبی یوم سے بقدر ۰٫۰۰۳۶۶ ث جب عہ مس ضہ کے متجاوز ہوگا جہاں کوکبی یوم وہ وقفہ ہے جو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

۷ کے دو مُرورں کے درمیان ہے اور یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ ستارہ کی کوئی ذاتی حرکت نہیں ہے۔

مثال ۴ ۔ طریق الشمس پر ایک ستارہ کا صعود مستقیم عہ ہے، اس کا میل ضہ اور طول بلدل ہے۔ صعود مستقیم، میل، اور طول بلد میں استقبال علی الترتیب عہَ، ضہَ، لَ ہیں۔ حسب ذیل رشتے ثابت کرو

ضہَ مم ضہ = لَ مم ل = عہَ مم عہ جم ضہ

مثال ۵ ۔ کرۂ سماوی پر کے ستاروں کو ایک اُستوار نظام سمجھا گیا ہے، اور یہ فرض کیا گیا ہے کہ ستارے حسب ذیل تین گردشوں کے ماتحت ہیں:

(۱) ۷ کو شطب مان کر اس کے گرد ایک چھوٹے زاویہ عا میں سے گردش

(۲) ب کو " " " " ضا " "

(۳) ق کو " " " " طا " "

جہاں ق شمالی قطب ہے اور ب وہ نقطہ ہے جسکے محدد عہ = ۹۰°، ضہ = ۰ ہیں

ثابت کرو کہ اگر ایک ستارہ کے محددوں عہ اور ضہ میں تبدیلیاں جو اس طرح پیدا ہوتی ہیں مف عہ، مف ضہ ہوں تو

مف عہ = ۔ عاجم عہ مس ضہ ۔ ضا جب عہ مس ضہ + طا،

مف ضہ = عا جب عہ ۔ ضا جم عہ

یہ سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ علم ہندسہ صغاری کی مدد سے ثابت ہوتا ہے اگر ان میں سے ہر گردش پر جدا جدا غور کیا جائے۔

مثال ۶ ۔ ثابت کرو کہ سال کی کسی تاریخ ت پر استقبال اور کبو سے متاثرہ خط اُستوار کا ظاہری مقام اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ (۱۹۹)
آغاز سال پر خط اُستوار کا جو محل تھا اُس پر حسب ذیل تین گردشیں عائد کی جائیں:۔

(۱) ۷ کو شطب مانکر اس کے گرد چھوٹے زاویہ گ جب گ میں سے گردش

(۲) ب کو " " " " گ جم گ " "

(۳) ق کو " " " " ۔ ۱۵ ف " "

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جہاں ق شمالی قطب ہے اور ب وہ نقطہ ہے جس کے محدد عہ = ۹۰° ضہ = ۰ ہیں۔

وہ نقطہ جہاں سال کے آغاز میں ۲ واقع تھا تاریخ ت کے استواء کے لحاظ سے محدد عہ = ۱۵ اف، ضہ = گ جم گ رکھتا ہے جہاں ف وقت کے ثانیوں میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح نقطہ ب سال کے آغاز میں تاریخ ت کے استواء کے لحاظ سے محدد عہ = ۹۰° + ۱۵ اف، ضہ = - گ جب گ رکھتا ہے۔ علم ہندسہ سے یہ واضح ہے کہ شطیوں ۲، ب، ق کے گرد گردشیں گ جب گ، گ جم گ اور - ۱۵ اف، زیر بحث دو نقطوں کو آغاز سال کے استواء سے تاریخ ت کے استواء تک لیجائیں گی۔

مثال ۷۔ ہندسی طور پر ثابت کرو کہ ستاروں کے صعود مستقیم اور میل پر وقفہ ت میں استقبال اور کبو کا اثر اس اثر کے مماثل ہے جو کرہ سماوی کو (وہ کرہ سماوی جس میں ستارے ہیں لیکن حوالہ کے دائرے نہیں) ایک قطر کے گرد گھمانے سے پیدا ہوتا ہے جو اس نقطہ میں سے گذرتا ہے جس کا طول بلد صفر ہے اور عرض بلد

$$\text{مس}^{-1}\left(\frac{\text{ا ت} + \text{مف ل}}{\text{مف سہ}}\right)$$

ہے۔ گردش کا زاویہ

$$\left\{(\text{ا ت} + \text{مف ل})^2 + (\text{مف سہ})^2\right\}^{\frac{1}{2}}$$

ہے اور اس کی سمت رجعی ہے جہاں ا استقبال کا مستقل ہے اور مف ل، مف سہ علی الترتیب طول بلد میں اور طریق الشمس کے میلان میں کبو ہیں۔

طول بلد میں استقبال اور کبو کا اثر کرہ سماوی کو طریق الشمس کے قطب ق کے گرد زاویہ ا ت + مف ل = ط ق ط، (شکل ۶۲) میں سے گھمانے سے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ق ط پر کا کوئی نقطہ ر، ق ط، پر کے نقطہ ر، پر منتقل ہوتا ہے۔ اس گردش کی سمت اس لازمی نتیجہ سے متعین

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہوتی ہے کہ وہ ہر نقطہ کے طول بلد کو بڑھانی چاہیئے۔



شکل (۶۲)

(۲۰۰) اُس تبدیلی کو پیدا کرنے کے لیے جو کبو مف سہ کی وجہ سے سہ میں واقع ہوتی ہے کرۂ سماوی کو ط کے گرد گھمانا چاہیئے۔ زاویہ مف سہ میں سے خط استواء کی حرکت اُس زاویہ کو بڑھا دیتی ہے جو طریق الشمس ط س اور خط استواء کے درمیان ہے لیکن طریق الشمس ثابت رہتا ہے۔ یہ اثر وہی ہوگا گویا سب نقطوں کو ط کے گرد خلاف سمت ساعت گردش مف سہ دی گئی ہے۔ ق ط پر کا ہر نقطہ بائیں جانب حرکت کرے گا اور کوئی خاص نقطہ ر۱ ایسا ہوگا جو اپنے ابتدائی مقام ر پر واپس آئے گا۔ پس جہاں تک اس نقطہ کا تعلق ہے یہ دو گردشیں ایک دوسرے کی تعدیل کرتی ہیں۔ اس لیے ط اور ق کے گرد یہ دو گردشیں، ر کے گرد ایک گردش میں ترکیب پاتی ہیں۔

اگر ر کا عرض بلد طہ ہو تو ط ر = طہ اور

ر ر۱ = (ا ت + مف ل) جم طہ = مف سہ جب طہ

اس لیے مس طہ = (ا ت + مف ل) مف سہ اور چونکہ ترکیبی گردشیں علی القوائم ہیں اس لیے حاصل، اِن کے مربعوں کے مجموعہ کا جذر المربع ہے یعنی

$$\sqrt{(\text{ا ت} + \text{مف ل})^2 + (\text{مف سہ})^2}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۸ ۔ ثابت کرو کہ کسی دیے ہوئے دن میں استقبال اور کبو کی باعث ایک ستارہ کے ظاہری مقام کا بڑے سے بڑا ہٹاؤ

$$\sqrt{(\text{ا ت} + \text{مف ل})^2 + (\text{مف سہ})^2}$$

ہے اور یہ کہ وہ سب ستارے جن میں یہ ہٹاؤ واقع ہوتا ہے ایک بڑے دائرے پر واقع ہونے چاہئیں جس کی مساوات

جم عہ جم ضہ مف سہ + (جب ضہ جم سہ ۔ جب عہ جم ضہ جب سہ)(ا ت + مف ل) = ۰

ہے اور بالآخر یہ کہ ہٹا ہوا محل بھی اسی بڑے دائرہ پر واقع ہوتا ہے ۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۲۰۱)

نواں باب

کوکبی وقت اور اوسط وقت

دفعہ		صفحہ
۶۲	— کوکبی وقت	۳۰۹
۶۳	— ہیئتی گھڑی کی تصحیح	۳۱۱
۶۴	— طریق الشمس کا میلان	۳۱۵
۶۵	— صعود مستقیم کی تعیین میں جتنی صحت ممکن ہے اس کی تخمین	۳۲۰
۶۶	— کوکبی سال اور شمسی سال	۳۲۳
۶۷	— اوسط حرکت کا ہندسی اصول	۳۲۶
۶۸	— اوسط وقت	۳۳۱
۶۹	— اوسط ظہر پر کوکبی وقت	۳۳۵
۷۰	— کوکبی وقت سے اوسط وقت معلوم کرنا	۳۳۸
۷۱	— ارضی تاریخ خط	۳۴۲

۶۲ — کوکبی وقت۔

ہم دیکھ چکے ہیں (مثال ۱ صفحہ ۳۰۴) کہ ☿ تقریباً ۲۴۵ سال میں سماوات کی ایک مکمل گردش کی تکمیل کرتا ہے اور وہ ایسی سمت میں کہ اِس وقفہ میں ستارے ☿ کی بہ نسبت ایک مکمل ظاہری گردش کم کر چکتے ہیں۔ زمین کی محوری گردش کے عرصہ کو کوکبی یوم (دفعہ ۳۳) کے ساتھ وہی نسبت ہے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جو ۲۴۵۰۰ سال + ایک دن کو ۲۴۵۰۰ سال سے ہے۔ اس طرح زمین کی محوری گردش کی مدت کوکبی یوم سے (جو رصدگاہ میں عملاً استعمال ہوتا ہے) تقریباً بقدر ثانیہ کے ایک سویں حصہ کے بڑی ہے۔ دفعہ ۵۹ میں یہ بتایا جا چکا ہے کہ ♈ کی حرکت میں بے قاعدگیوں کی وجہ سے کوکبی یوم کے طول میں جو تغیرات ہوتے ہیں وہ اس قدر چھوٹے ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جا سکتا ہے

کوکبی گھڑی میں جس سے ہمارا مطلب ایسی گھڑی سے ہے جو کوکبی وقت کو بتلاتی ہے ایک ڈائل ہوتا ہے جو ۲۴ مساوی حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور ان حصوں پر صفر سے لیکر ۲۳ تک ہندسے کندہ ہوتے ہیں۔ جب ♈ مشاہد کے نصف النہار پر ہوتا ہے تو کوکبی گھڑی (اگر اس میں کوئی خطا نہیں ہے) وقت ب گ م ث بتلاتی ہے اور اگر گھڑی کی رفتار صحیح ہو تو وہ پھر وقت ب گ ۰ ث بتلائے گی جبکہ ♈ نصف النہار پر پھر واپس ہوگا۔

(۲۰۲) رصدگاہ میں کوکبی وقت کا انتظام رکھنے میں یہ خاص فائدہ ہے کہ ایک ہی ستارہ بعض چھوٹی تصحیحات کے تحت نصف النہار کو ہر دن ایک ہی کوکبی وقت پر عبور کرتا ہے۔

مثال ۱ — اگر ایک ستارے کی ذاتی حرکت کی سالانہ مقدار قوس کے خ ثانئے ہو یعنی اگر ستارہ اپنے محل سے ایک سال کے عرصہ میں کرۂ سماوی پر قوس کے خ ثانئے ہٹے تو ثابت کرو کہ اس حرکت کا جہاں تک تعلق ہے اس ستارہ کے دو متواتر مرُوروں کے درمیان وقفہ، ایک کوکبی یوم سے

۱۸۰۰۰ × خ قط ضہ ثانیوں

سے زیادہ فرق نہیں رکھ سکتا جہاں ضہ ستارہ کا میل ہے۔

مثال ۲ — اگر راس الحمل کا فاصلہ ایک ثابت استوائی ستارہ سے

پ + ق ت + ا جم م ت + ب جب م ت

ہو جہاں پ، ق، ا، م، ب مستقل ہیں اور ت وقت ہے جو سالوں میں دیا گیا ہے تو ثابت کرو کہ راس الحمل کے دو متواتر بالائی مرُوروں کے درمیانی وقفہ کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

حسب ذیل دو انتہائی حدود ہوں گے

$$۲۴^{گ} + م \sqrt{ا^۲ + ب^۲} \setminus ۲۴ ر ۳۶۶$$

اور

$$۲۴^{گ} - م \sqrt{ا^۲ + ب^۲} \setminus ۲۴ ر ۳۶۶$$

فرض کرو کہ ۷ کے بالائی مُرور کا ایک وقت تَ ہے تو دوسرا بالائی مرور تقریباً وقت $تَ + \frac{۱}{۲۴ ر ۳۶۶}$ پر واقع ہوگا۔ ۷ کا فاصلہ اِس کے ابتدائی محل سے بقدر

$$پ + ق (تَ + \frac{۱}{۲۴ ر ۳۶۶}) + ا جم م تَ - م ا \frac{۱}{۲۴ ر ۳۶۶} جب م تَ$$

$$+ ب جب م تَ + م ب \frac{۱}{۲۴ ر ۳۶۶} جم م تَ$$

$$- (پ + ق تَ + ا جم م تَ + ب جب م تَ)$$

کے تبدیل ہو چکا ہوگا۔

اِس میں دَوری حصہ $\frac{م}{۲۴ ر ۳۶۶} (ب جم م تَ - ا جب م تَ)$ ہے اور تَ کی کوئی ایسی قیمت نہیں ہے جو اِس کو عدداً $\frac{م}{۲۴ ر ۳۶۶} (ا^۲ + ب^۲)^{\frac{۱}{۲}}$ سے بڑا کر سکے۔

۶۳۔ ہیئتی گھڑی کی تصحیح۔

ہیئتی گھڑی کی تصحیح معلوم کرنے کا عملی طریقہ اپنی سادہ ترین شکل میں حسب ذیل ہے۔

الفیمرس سے ہر دسویں دن کے لیے سیکڑوں بنیادی ستاروں کے ظاہری صعود مستقیم معلوم ہوتے ہیں یہ ستارے سماوات میں اس طرح پھیلے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہر جگہ اور ہر ساعت اِن میں سے ایک یا زیادہ ستارے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

نصف النہار کے قریب آرہے ہوتے ہیں۔ گھڑی کی تصحیح اس طرح حاصل کیجاتی ہے کہ نصف النہار پر ستارہ کے مرور کا وقت گھڑی میں دیکھ لیا جاتا ہے اور اس وقت کو ستارے کے اُس صعود مستقیم میں سے تفریق کیا جاتا ہے جو الفیمرس سے ادراج کے ذریعہ حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے تصحیح مثبت ہوگی اگر گھڑی سُست ہو کیونکہ اس صورت میں اصلی وقت حاصل کرنے کے لیے گھڑی سے مشاہدہ کردہ وقت میں عمل جمع کرنا ہوگا۔ اگر گھڑی تیز ہو تو تصحیح منفی ہوگی۔ (۲۰۲)

مثلاً فرض کرو کہ ستارہ النہر (بہ) (Eridani) کے مرور کا مشاہدہ بتاریخ ۱۰ فروری ۱۹۱۰ء کیا گیا اور تمام ضروری تصحیحات کے بعد حسب ذیل امور معلوم ہوئے:-

النہر (بہ) کے مرور کا وقت گھڑی سے ۵ گ ۳ م ۴۲٫۶ ث

النہر (بہ) کا ظاہری صعود مستقیم الفیمرس سے ۵ گ ۳ م ۲۵٫۶ ث

گھڑی کی تصحیح ۱۷٫۰ ث

پس اگر گھڑی کی کسی قرارت میں تصحیح ۱۷٫۰ ث کی جائے تو متناظر صحیح وقت حاصل ہو جائے گا۔ مثلاً راس الحمل جس آن نصف النہار پر ہوگا اُس وقت اِس گھڑی سے گ م ث وقت معلوم ہونے کی بجائے گ م ۱۷٫۰ ث وقت ہوگا۔ اِس سے زیادہ صحت حاصل کرنے کے لیے اُن تصحیحات کا اوسط استعمال کرنا چاہیئے جو متعدد بنیادی ستاروں کے اوقات مرور سے ماخوذ ہوں۔

گھڑی کی شرح تصحیحات کا مقابلہ کرنے سے جو مناسب وقفوں سے معلوم کئے گئے ہوں معلوم ہوتی ہے۔ مثلاً فرض کرو کہ

بتاریخ ۱۴ جون ۲۰ گ ک۔ د (کوکبی وقت) تصحیح + ۱۸٫۶۴ ث ہے

" ۱۵ " " ۲۱ " " " + ۲۰٫۸۰ ث ہے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِس لیے گھڑی اس وقفہ میں جس شرح سے وقت ضائع کر رہی ہے
وہ $\frac{۲۴}{۲۵} \times ۲ث ۱۶٫۱ = ۲ث ۰۷٫۲$ فی یوم ہے۔

جب گھڑی کی شرح معلوم ہوتی ہے تو دو ستاروں کے صعود مستقیموں کا فرق اِن کے اوقات مرور کے فرق کا مشاہدہ کرنے سے اور پھر اس وقفہ میں گھڑی کی شرح کے لیے جو تصحیح حاصل ہوی ہے اُس کو عائد کرنے سے معلوم کیا جاتا ہے۔

اِس طرح اگر صرف ایک جرم سماوی کا ہی صعود مستقیم معلوم ہو تو ہم دوسرے اجرام سماوی کے صعود مستقیم بعض شرائط کے تحت متعین کر سکتے ہیں۔ اِس لیے اب صرف یہ دکھانا ہے کہ ایک واحد بنیادی صعود مستقیم کس طرح حاصل کیا جاتا ہے، اب چونکہ ۲ کا محل سورج کی حرکت سے معلوم ہو جاتا ہے اس لیے یہ ظاہر ہے کہ سورج ہی وہ جسم ہونا چاہیئے جس کا مشاہدہ اِس مقصد کے لیے کیا جانا چاہیئے۔

اگر طریق الشمس کا میلان سہ ہو اور سورج کا صعود مستقیم عہ اور میل ضہ ہو جہاں سورج کے مرکز کو طریق الشمس میں فرض کیا گیا ہے تو

جب عہ = س ضہ م سہ ..... (۱)

ہم مان لیں گے کہ سہ معلوم ہے (دفعہ ۶۴) اور ضہ کا مشاہدہ کیا جا چکا ہے پھر اِس مساوات سے عہ محسوب کیا جا سکتا ہے۔ اگر مرور کا وقت تہ ہو جو ہیئتی گھڑی سے مشاہدہ کیا گیا ہے تو گھڑی کی خطا عہ ۔ تہ معلوم ہو جاتی ہے (۲۰۴)

اِس عمل کی تمثیل کے لیے ہم حسب ذیل صورت لے سکتے ہیں:۔

فرض کرو کہ گرینوچ کے نصف النہار پر بتاریخ ۲۸ مارچ سنہ ۱۹۰۹ء سورج کے مرور کا وقت گھڑی سے ۲۶ گ ۲۹٫۲ث معلوم ہوتا ہے اور سورج کے مرکز کا مشاہدہ کردہ میل ۲° ۵۱′ ۱۳٫۱″ ش ہے۔ طریق الشمس کا میلان ۲۳° ۲۷′ ۱۱٫۶″ معلوم ہے اور ہم گھڑی کی تصحیح معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ مرور پر سورج کا صعود مستقیم ضابطہ (۱) سے معلوم کیا جاتا ہے اور پھر حساب کا عمل

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

حسب ذیل ہے :-

ل مس ۲° ۵۱′ ۳۱″ ۸٫۶۹۷۱۳۵۷

لوک مم ۲۳ ۲۷ ۱٫۶ ۰٫۳۶۲۷۰۰۲

ل جب گ مم ۳۶ ۷٫۲۱ش = ۹٫۰۵۹۸۳۵۹

اس لیے گھڑی کی تصحیح ہے

گ مم ۲۶ ۷٫۲۱ش - (گ مم ۲۶ ۲٫۴۹ش) = - ۲۷٫۵ش

گھڑی کے کسی وقت میں یہ تصحیح کرنے سے اور گھڑی کی شرح (جسے مستقل مان لیا گیا ہے) کی رعایت رکھنے سے متناظر اصل کوکبی وقت معلوم ہو جاتا ہے۔

کسی ستارہ کا صعود مستقیم معلوم کرنے کے حسب ذیل طریقہ میں ہم فرض کرلیں گے کہ استقبال اور کبو کے اثرات کا لحاظ رکھا جا چکا ہے۔

فرض کرو کہ ایک ستارہ کا نامعلوم صعود مستقیم عہ ہے اور کسی دن کسی مقام پر ت۱ کوکبی وقت کا وہ وقفہ ہے جو سورج کے مرور کے بعد سے ستارہ کے مرور تک گذرتا ہے۔ اس لیے سورج کا صعود مستقیم عہ - ت۱ ہے اگر اس کا میل ضہ۱ ہو اور طریق الشمس کا میلان سہ ہو تو

جب (عہ - ت۱) = مس ضہ۱ مم سہ ..... (۲)

اثنائے سال میں کسی دوسرے موقع پر فرض کرو کہ سورج کا میل ضہ۲ ہے اور اس کا مرور ستارہ کے مرور سے وقت ت۲ قبل واقع ہوا ہے تو

جب (عہ - ت۲) = مس ضہ۲ مم سہ ..... (۳)

ان مساواتوں کو تفریق کرنے سے اور پھر جمع کرنے سے ہم بہ آسانی اخذ کرتے ہیں

مم {عہ - ½ (ت۱ + ت۲)} = مم ½ (ت۲ - ت۱) جب (ضہ۱ - ضہ۲) قم (ضہ۱ + ضہ۲) ... (۴)

پس ضہ۱ اور ضہ۲ کا اور وقت کے وقفوں ت۱ اور ت۲ کا مشاہدہ کرنے سے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

عہ معلوم کرنے کے ذرایع حاصل ہوتے ہیں اگرچہ سہ کی قیمت پہلے سے نا معلوم ہو۔

(۲۰۵) **مثال ۱** — اگر ہیئتی گھڑی کی تصحیح گھڑی کے وقت ت پر ع ہو اور اگر گھڑی فی دن ر ثانیے تیز ہو تو ثابت کرو کہ اصلی وقت حاصل کرنے کے لیے گھڑی کے کسی وقت ت میں جو تصحیح عائد کرنی ہوگی وہ ع۔(ت۔ت۱)ر/۲۴ ہے جہاں ت اور ت۱ گھنٹوں میں بیان کئے گئے ہیں۔

مثال ۲ — اوسط وقت کی ایک گھڑی کے رقاص کے وسط میں ایک چھوٹا سا شیلف (Shelf) لگا یا گیا ہے جس پر چند چھوٹی مساوی کمیتیں ہیں جن میں سے ہر ایک ٹھیک اس قدر وزنی ہے کہ ان کی تعداد میں ایک کے اضافہ سے گھڑی کی شرح میں ایک ثانیہ یومیہ کا اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انتظام کیا گیا ہے کہ ان کمیتوں کی کوئی چھوٹی تعداد شیلف پر رکھی جا سکتی ہے یا شیلف سے جدا کیجا سکتی ہے جبکہ گھڑی چل رہی ہو اور اس سے گھڑی کی حرکت میں خلل واقع نہیں ہوتا۔

اگر کل بوقت ظہر گھڑی کی تصحیح ع۱ تھی اور آج بوقت ظہر ع۲ ہے تو ثابت کرو کہ کمیتوں کی وہ تعداد جو شیلف پر رکھنی ہوگی تاکہ کل بوقت ظہر گھڑی ٹھیک وقت بتلائے ۲ع۲ - ع۱ ہے۔

مثال ۳ — بتاریخ ۲۵ مارچ ۱۸۹۵ء سورج نصف النہار کو جبار (عہ) (Orionis) سے ۵گ ۳۴م ۴۷ش قبل عبور کرتا ہے اور بتاریخ ۲۷ ستمبر سورج نصف النہار کو جبار (عہ) کے ۵گ ۴۷م ۲۸ش بعد عبور کرتا ہے۔ ان تاریخوں میں سورج کے میل علی الترتیب + ۱° ۴۰′ ۲۷″ اور + ۲° ۲۴′ ۳۷″ ہیں۔

ثابت کرو کہ جبار (عہ) کا صعود مستقیم تقریباً ۵گ ۵۰م ۱۴ش ہے۔

۶۴ — طریق الشمس کا میلان — طریق الشمس کا میلان

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(دیکھو صفحہ ۲۸۸) تقریباً انقلاب کے وقت سورج کے میل کی پیمائش سے معلوم کیا جاتا ہے۔ اگر یہ پیمائش انقلاب کے وقت عمل میں آسکے تو میلان اس پیمائش کردہ میل کے مساوی ہوگا۔ لیکن عین انقلاب کے وقت سورج کے میل کا مشاہدہ کرنا بالعموم عملاً آسان نہیں ہے۔ اس لیے غور طلب سوال یہ ہے کہ یہ میلان کس طرح حاصل کیا جاتا ہے جبکہ سورج کے میل کا مشاہدہ انقلاب کے قریب زمانہ میں کیا جائے اور صعود مستقیم معلوم ہو۔

دفعہ ماسبق کی بموجب

$$\text{مس سہ} = \text{مس ضہ قم عہ}' \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (۱)$$

پہلی نظر میں یہ دکھائی دیگا کہ سہ کی تعئین کے لیے جبکہ ضہ اور عہ دئے گئے ہوں اس سے زیادہ سادہ ضابطہ ہو نہیں سکتا۔ لیکن ہم بتائیں گے کہ اعمال حساب کے لیے اس سے زیادہ عملاً مفید ضابطہ حاصل کیا جاسکتا ہے اگرچہ اس کی شکل زیادہ پیچیدہ ہے اور گو وہ صرف ایک تقریبی ضابطہ ہے اور مسدد رجۂ بالا ضابطہ (۱) بالکل ٹھیک ہے۔

انقلاب گرما کے لیے ضابطہ (۱) سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{مس (سہ - ضہ)} = \frac{\text{مس ضہ (۱ - جب عہ)}}{\text{جب عہ + مس}^{۲}\text{ ضہ}}$$

$$= \text{جب ضہ جم ضہ (۱ - جب عہ)}$$

کیونکہ جب عہ تقریباً ایک ہے

اس لیے $\text{سہ - ضہ} = \text{جب ۲ ضہ جب}^{۲}\left(۴۵^{\circ} - \frac{۱}{۲}\text{ عہ}\right) \text{قم ا}'' \quad \ldots\ldots (۲)$

(۲۰۶) یہ وہ خاص ضابطہ ہے جو اس عمل حساب میں استعمال ہونا چاہئے کیونکہ ضابطہ (۲) میں ہم سہ کو محسوب نہیں کر رہے ہیں بلکہ سہ - ضہ کو، اور چونکہ سہ قریب قریب ضہ کے مساوی ہے اس لیے صرف چھوٹی مقدار سہ - ضہ کو محسوب کرنا ہوتا ہے۔ اس کی تشریح ایک خاص صورت کے لیے کی جائے گی۔

بتاریخ ۲۲ جون ۱۹۰۹ء سورج کا ظاہری میل بمقام گرینوچ بوقت

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ظاہری ظہر ۲۳° ۲۷' ۳۲" ہے۔ اِس کا صعود مستقیم گ ۶ ا م ۲۹ ؍ ۴۳ ش (= ۹۰° ۲۸' ۳۵ ؍ ۹ ہ) ہے۔
اب ہم سہ۔ ضہ کو ضابطہ (۲) سے محسوب کرتے ہیں اور لوکارتموں میں اعشاریہ کے صرف تین مقامات استعمال کرتے ہیں۔

ل جب ۲ ضہ = ۹ ؍ ۸۶۳
ل جب (۴۵° - ½ عم) = ۷ ؍ ۵۷۴ (ن)
" = ۷ ؍ ۵۷۴ (ن)
لوک قم آ = ۵ ؍ ۳۱۴

لوک (سہ۔ ضہ) = ۰ ؍ ۳۲۵ سہ۔ ضہ = + ۱ ؍ ۲"
سہ = ۲۳° ۲۷' ۶۱۴"

لوکارتموں میں تین سے زیادہ ہندسوں کے استعمال میں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بقیہ ہندسوں کو ترک کرنے سے سہ میں ۱ ؍ ۲" کا فرق کسی حال نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی واضح ہے کہ ضہ کو صرف قریب ترین منٹ تک لینا کافی ہے جبکہ لوک جب ۲ ضہ کو لکھا جا رہا ہو۔

اگر ہم سہ کو ضابطہ (۱) میں تین ہندسی لوکارتم استعمال کر کے معلوم کرنے کی کوشش کرتے تو حاصل ہوتا

ل مس ضہ = ۹ ؍ ۶۳۷
ل جب عہ = ۰ ؍ ۰۰۰

ل مس سہ = ۹ ؍ ۶۳۷

جس سے یہ ظاہر ہے کہ سہ، ۲۳° ۲۴' ۴۸" اور ۲۳° ۲۷' ۲" کے درمیان کوئی زاویہ ہو سکتا ہے۔ اِس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ضابطہ (۲) سے سہ کی قیمت ۱ ؍ ۲" تک صحیح ملتی ہے اور برخلاف اِس کے ضابطہ (۱) سے سہ کی جو قیمت حاصل ہوتی ہے وہ تقریباً ۳' تک غلط ہو سکتی ہے حالانکہ ہر صورت میں لوکارتموں میں اعشاریہ کے مقامات کی ایک ہی تعداد

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

استعمال کی گئی ہے۔ چند مزید آزمائشوں سے یہ معلوم ہوگا کہ تین ہندسی لوکارتموں کو تقریبی ضابطہ (۲) میں استعمال کرنے سے فی الواقعی ایک زیادہ صحیح نتیجہ حاصل ہوتا ہے بہ نسبت اس کے کہ ٹھیک ضابطہ (۱) میں ۴، ۵، یا ۶ ہندسی لوکارتم بھی استعمال کئے جائیں اور یہ بات صحیح ہے باوجود اس کے کہ ضابطہ (۲)، ضابطہ (۱) سے ماخوذ ہے۔

بلاشبہ ضابطہ (۱) سے صحیح نتیجہ حاصل ہوگا اگر لوکارتموں میں اعشاریہ کے مقامات کی کافی تعداد استعمال کی جائے۔ مثلاً ۷ ہندسے استعمال کرنے سے

لوک مس ضہ = ۹٫۶۳۷۲۸۹۵

لوک جب عہ = ۹٫۹۹۹۹۸۷۸

لوک مس سہ = ۹٫۶۳۷۳۰۱۷

(۲۰۷) اور اس سے صحیح نتیجہ سہ = ۲۳° ۲۷′ ۶٫۴″ حاصل ہوتا ہے۔ لیکن یہ بغیر بینی ادراج کے حاصل نہیں ہو سکتا اگرچہ ہم بیگے (Begay) کی جدولیں استعمال کریں جن میں مثلثی تفاعلوں کے لوکارتم قوس کے ہر ثانیہ کے لیے درج ہیں۔

نہ صرف طریق الشمس کے میلان کی تعئین کے سلسلہ میں بلکہ دیگر ہیئتی مسئلوں میں بھی جن میں ایک نامعلوم مقدار کی تلاش کی جاتی ہے اور جن میں عمل حساب کے لیے سب سے زیادہ موزوں ضابطہ کا انتخاب کرنا ہوتا ہے نکتہ مشرح الصدر نہایت اہم ہے۔

بالعموم ہمیں ایسا ضابطہ منتخب کرنا چاہئے جس سے ضابطہ (۲) کی طرح ایک ایسا جملہ ملے جو نامعلوم مقدار کی ٹھیک قیمت کو تعبیر نہ کرے بلکہ نامعلوم مقدار اور ایک معلومہ تقریبی قیمت کے درمیانی فرق کو ظاہر کرے۔ جب ایسا ضابطہ مل جائے تو عمل حساب میں تکلیف دہ بینی ادراج سے بالعموم نجات مل سکتی ہے اور لوکارتموں میں اعشاریہ کے مقامات کی تھوڑی تعداد کافی ہوتی ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۱ ــ ثابت کرو کہ انقلاب سرما کے قریب زمانہ میں طریق الشمس کا میلان سہ ضابطہ سہ = ضہ + قم اً جب ۲ ضہ جب^{۲} (۴۵° + ½ عہ) سے حاصل ہوتا ہے جہاں سورج کا صعود مستقیم عہ ہے اور جنوبی میل ضہ۔ نیز اس ضابطہ کو یہ ثابت کرنے میں استعمال کرو کہ جس وقت ضہ = ۲۳° ۲۶′ ۲۱٫۵۸″ ج اور عہ = ۱۷ گ ۵۷ م ۹۸٫۴۷ ث (۲۲ر دسمبر ۱۹۰۷ء) تو طریق الشمس کا میلان ۲۳° ۲۷′ ۹٫۱″ ہے۔

مثال ۲ ــ حسب ذیل مشاہدہ اور مفروضات سے ثابت کرو کہ بتاریخ یکم جنوری ۱۸۹۳ء طریق الشمس کا میلان ۲۳° ۲۷′ ۳۶٫۱″ تھا۔

مشاہدہ :ــ

⊙ (سورج) کا ظاہری میل بتاریخ ۱۹ر جون ۱۸۹۳ء بوقت ظاہری ظہر، ۲۳° ۲۶′ ۲۰٫۹۰″ ش

بحری جنتری سے ماخوذ:ــ ⊙ کا ظاہری صعود مستقیم بتاریخ ۱۹ر جون ۱۸۹۳ء بوقت ظاہری ظہر، ۵ گ ۵۲ م ۱۱٫۵۲ ث

⊙ کا ظاہری عرض بلد بتاریخ ۱۹ر جون، ۰٫۴۵″ ش

میلان میں کبو بتاریخ ۱۹ر جون، + ۳٫۷۷″

میلان میں قرنی تبدیلی سالانہ — ۰٫۴۷۶″

سیاروی اختلال (perturbations) کی باعث زمین تھوڑی حد تک کبھی تو طریق الشمس کی ایک جانب اور کبھی دوسری جانب ڈگمگاتی ہے، اس لیے سورج کا مرکز ظاہر ایک چھوٹا عرض بلد رکھتا ہے جو اگرچہ بالعموم نظر انداز کیا جاتا ہے لیکن اس سوال میں محسوب کیا گیا ہے۔ سہ کی قیمت بتاریخ ۱۹ر جون بہ آسانی حاصل ہوتی ہے

سہ = ضہ — بہ جب سہ قم ضہ + جب ۲ ضہ جب^{۲} (۴۵° — ½ عہ) قم اً

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِس میں دی ہوی قیمتیں درج کرنے سے

سہ = ۲۳° ۲۶′ ۹۰٫۴″ + ۳۵٫۹۵″ = ۲۳° ۲۷′ ۸۵٫۱۸″

اب چونکہ میلان میں کبو + ۴۳٫۷″ اور میلان کی قرنی تبدیلی نصف سال کے لیے - ۲۴٫۰″ ہے اِس لیے سہ کی محصلہ بالا قیمت میں تصحیحات - ۴۳٫۷″ اور + ۲۴٫۰″ عمل میں لانے سے آغاز سال پر اوسط میلان ۲۳° ۲۷′ ۳۶٫۱۱″ حاصل ہوتا ہے اور یہی مطلوب تھا۔

مثال ۳ — اگر سورج کا مُشاہدہ کردہ صعود مستقیم ۹۰° - ع ہو اور اِسکا میل ضہ ہو تو طریق الشمس کے میلان کی تعیین کے لیے حسب ذیل ضابطہ انقلاب کے قریب مُشاہدات سے معلوم کرو :—

$$\text{سہ} - \text{ضہ} = \frac{\text{مس}^2 \frac{1}{2}\text{ع}}{\text{جب}\ 1''} \text{جب}\ 2\ \text{سہ} - \frac{\text{مس}^4 \frac{1}{2}\text{ع}}{\text{جب}\ 2''} \text{جب}\ 4\ \text{سہ} + \dots\dots$$

جہاں سہ مطلوبہ میلان ہے اور سہ - ضہ کی پیمائش ثانیوں میں ہوئی ہے۔

حسب ذیل سوالات پر جو ضابطہ بالا سے پیدا ہوتے ہیں احتیاط کے ساتھ غور کرو :—

(۱) ع کی تعیین کے لیے راس الحمل کا محل معلوم ہونا ضروری ہے۔

(۲) سورج کے چھوٹے عرض بلد کی وجہ سے ضہ میں تصحیح کرنی ہوگی۔

(۳) مطلوبہ مقدار سہ بائیں جانب آتی ہے۔ [Coll. Exam]

۶۵ — صعود مستقیم کی تعیین میں جتنی صحت ممکن ہے اُسکی تخمین۔

اُس مبداء کی تعیین میں جس سے صعود مستقیم ناپے جاتے ہیں جس حد تک صحت حاصل ہو سکتی ہے اُس کا امتحان کرنا مفید ہے۔

اول فرض کرو کہ میل کی مُشاہدہ کردہ قیمتوں سے سورج کا صعود مستقیم محسوب کرنے میں طریق الشمس کے میلان کی قیمت میں مف سہ کی خطا تھی۔ مساوات جب عہ = مس ضہ مم سہ کو تفرق کرنے اور ضہ کو مستقل سمجھنے سے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جم عہ مف عہ = - مس ضہ قم^{2} سہ مف سہ

یا مف عہ = - ۲ مس عہ قم^{2} سہ مف سہ

اِس میں سہ کی تقریبی قیمت ۲۳° ۲۷′ درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

مف عہ = - ۲٫۷۴ مس عہ مف سہ

پس اِس سے ظاہر ہے کہ جہاں تک ممکن ہو اعتدال کے قریب مُشاہدات لینے چاہئیں۔ مف سہ کی قیمت دی ہوئی ہو تو عہ کے ساتھ مف عہ بھی بڑھتا ہے۔

اب چونکہ ہم چاہتے ہیں کہ مف سہ، عہ پر کم سے کم ممکن اثر ڈالے اِس لیے عہ اتنا چھوٹا ہونا چاہئے جتنا ممکن ہو۔

فرض کرو کہ میلان کی اختیار کردہ قیمت میں قوس کے ایک ثانیہ کی حد تک غلطی ہے تو مف سہ = آ اور اگر اِس خطا سے عہ میں وقت کے لا ثانیوں کی خطا پیدا ہو تو مف عہ = ۱۵ لا، اِس لیے

لا = - ۱۸۳٫ ث مس عہ

پس اگر صعود مستقیم کو ۱ ث کے اندر تک صحیح حاصل کرنا ہے تو

مس عہ ≯ ۵۴۸٫۰ یا عہ ≯ ۵۴ م۔ سورج کا یہ صعود مستقیم تاریخ ۲۰ اپریل واقع ہوتا ہے۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ اعتدال سے تقریباً ایک ماہ پیشتر یا ایک ماہ بعد تک اِس طریقہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے تاکہ ۷ کا محل ثانیہ کے دسویں حصہ تک صحیح حاصل ہو، بشرطیکہ طریق الشمس کے میلان کی مفروضہ قیمت قوس کے ایک ثانیہ کے اندر تک صحیح معلوم ہو۔ بلا شبہ یہاں یہ تسلیم کر لیا گیا ہے کہ میل کی مشاہدہ کردہ قیمت میں کوئی خطا نہیں ہے۔ (۲۰۹)

اب ہمیں یہ غور کرنا چاہئے کہ مُشاہدہ کردہ میل میں خطا ہو تو اس خطا کا کیا اثر سورج کے صعود مستقیم کی محسوبہ قیمت پر پڑے گا۔

مساوات جیب عہ = مس ضہ مم سہ کو بلحاظ عہ اور ضہ کے تفرق کرنے اور سہ کو مستقل سمجھنے سے حاصل ہوتا ہے

مف عہ = قط عہ قط^{2} ضہ مم سہ مف ضہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اس کو شکل

مف عہ = قط عہ (۱ + جب^{۲} عہ مس^{۲} سہ) مم سہ مف ضہ

میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ چونکہ ضہ پیمائش سے معلوم کیا جا سکتا ہے اس لیے مشاہدات کی ترتیب میں احتیاط برتنی چاہئے تاکہ کوئی خطا مف ضہ (اور ظاہر ہے کہ ایسی خطائیں ناگزیر ہیں) غیر مناسب طور پر عہ کو متاثر نہ کرے جزو ضربی مم سہ مستقل ہے اور چونکہ سورج کا میل، سہ سے ہرگز متجاوز نہیں ہوتا اس لیے قط^{۲} ضہ میں کوئی بڑے تغیرات نہیں ہوں گے۔ لیکن چونکہ قط عہ کی اسے ∞ تک کوئی قیمت ہو سکتی ہے اس لیے یہ ظاہر ہے کہ مف عہ کو حتی الامکان چھوٹا رکھنے کے لیے قط عہ کو اس کی قلیل ترین قیمت پر رکھنا چاہئے یعنے عہ تقریباً صفر یا ۱۸۰° ہونا چاہئے اور اس لیے سورج ♈ یا ♎ کے قریب ہونا چاہئے اور اس لیے مشاہدات اعتدال ربیع یا اعتدال خریف کے قریب کرنے چاہئیں۔

سہ کی عددی قیمت درج کرنے سے ہم آسانی سے معلوم کرتے ہیں کہ مف عہ کی قیمتیں سورج کے مختلف صعود مستقیموں کے جواب میں حسب ذیل ہیں:

سورج کا صعود مستقیم	مف عہ
گ	۲٫۳ مف ضہ
گ^{۲}	۲٫۸ مف ضہ
گ^{۴}	۵٫۳ مف ضہ

اور انقلاب پر مف ضہ کا سر لامتناہی ہوگا۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اعتدالین میں سے ایک کے قریب مشاہدات کر کے خطاؤں کو اقل بنانا کس قدر ضروری ہے۔

اگر صعود مستقیم ثانیہ کے دسویں حصہ کے اندر مطلوب ہو تو مف عہ = ۱٫۰ ث = ۵٫۱ آ اور اس لیے وقت کے ایک ثانیہ کے دسویں حصہ کی خطا سورج کے میل کی تعیین میں ۶۵٫۰ کی خطا سے پیدا ہو سکتی ہے خواہ اعتدال کے قریب ہی مشاہدات کئے گئے ہوں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

۶۶ - کوکبی سال اور شمسی سال - (۲۱۰)

زمین کی گردش کی وجہ سے کسی ارضی مشاہد کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج سال میں ایک مرتبہ سماوات کا ایک مکمل دور کرتا ہے - لفظ سال کو جو مختلف معنے پہنائے جا سکتے ہیں ان میں امتیاز کرنا ضروری ہے -

کوکبی سال وقت کا وہ وقفہ ہے جس میں سورج کا مرکز ستاروں کے حوالہ سے ایک پوری گردش کی تکمیل کرتا ہے یا یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ کسی ایسے ستارہ کے حوالہ سے جو طریق الشمس میں واقع ہو اور ذاتی حرکت سے محروم ہو - کوکبی سال وہ مدت دوران (periodic time) بھی ہے جس میں زمین سورج کے گرد ایک کوکبی گردش کی تکمیل کرتی ہے جبکہ زمین کو نظام شمسی کا ایک سیارہ سمجھا جائے - زمان ۱۹۰۰ء میں کوکبی سال کی مدت ۳۶۵ ، ۲۵۶۴ اوسط شمسی یوم ہے -

شمسی (Tropical) سال وہ اوسط وقفہ ہے جو سورج کی راس الحمل تک دو متواتر واپسیوں کے درمیان ہوتا ہے - یہ نقطہ (راس الحمل) طریق الشمس پر استقبال کی وجہ سے حرکت کرتا ہے اور سالانہ ۵۰ً ، ۲۵۶۴ (نیوکومب) کی شرح (۱۹۰۰ء) سے سورج سے ملنے بڑھتا ہے - پس شمسی سال، کوکبی سال سے بقدر نسبت (۳۶۰° - ۵۰ً ، ۲۵۶۴) / ۳۶۰° کے چھوٹا ہے اور ۳۶۵ ، ۲۴۲۲ اوسط شمسی یوم کے مساوی ہے - ہم یہ ذکر کر چکے ہیں (دیکھو نوٹ صفحہ ۲۹۲) کہ ہیئتی عمل حساب میں شمسی سال کا اغاز اس آن سے ہوتا ہے جبکہ سورج کا اوسط طول بلد ٹھیک ۲۸۰° ہو، یہ ۱۹۱۰ء میں ۳۵ ، ۷ ، ۰ن جنوری کے متناظر تھا -

کاروباری سال متعین کرنے میں شمسی سال کو بنیاد قرار دیا جاتا ہے نہ کہ کوکبی سال کو - جولین کیالنڈر کی بموجب شمسی سال کو ۲۵ ، ۳۶۵ دن

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

فرض کیا گیا تھا اور یہ انتظام تھا کہ ہر چار متصل کاروباری سالوں میں تین سال تو ۳۶۵ دن فی سال کے حساب سے ہوں اور چوتھا سال یعنے وہ جو ۴ سے تقسیم پذیر ہے (Leap year) سال کبیسہ ہو اور اس سال فروری کے مہینہ میں ۲۹ فروری کا اضافہ ہو تاکہ یہ سال ۳۶۶ دن کا ہو جائے۔ اس انتظام سے اوسط کاروباری سال شمسی سال سے تقریباً ۱۱ منٹ بڑھ گیا۔

اوسط کاروباری سال اور شمسی سال میں زیادہ مطابقت پیدا کرنے کے لیے گریگوری کی تصحیح جولین کیالنڈر میں داخل کی گئی۔ اس تصحیح کی بموجب ہر چار صدیوں میں جولین قاعدے سے جتنے سال کبیسہ آتے ہیں ان میں سے تین سال معمولی ۳۶۵ دن کے متصور ہوتے ہیں۔ اگر سال کو تعبیر کرنے والا عدد دو صفروں پر ختم ہو تو وہ چونکہ ۴ سے تقسیم پذیر ہوتا ہے اس لیے جولین قاعدے کی بموجب بلاشبہ سال کبیسہ ہوگا۔ لیکن گریگوری کی تصحیح کی بموجب جو کیالنڈر مرتب ہوا ہو اس میں ایسا سال سال کبیسہ نہیں ہوگا سوائے اس صورت کے جبکہ سن کو تعبیر کرنے والے (۲۱۱)
عدد کے پہلے دو ہندسے ۴ سے تقسیم پذیر ہوں۔ مثلاً ۱۹۰۰، ۲۱۰۰، ۲۲۰۰، ۲۳۰۰ اگرچہ جولین سال کبیسہ ہیں گریگوری کے سال کبیسہ نہیں لیکن ۲۰۰۰ اور ۲۴۰۰ دونوں نظاموں میں سال کبیسہ ہیں۔ ہم وہ جولین کیالنڈر استعمال کرتے ہیں جس میں گریگوری کی تصحیح داخل کی گئی ہے۔

پس موجودہ کیالنڈر میں ہر چار صدیوں میں ۹۷ سال کبیسہ ہوتے ہیں اور اس لیے چار صدیوں میں دنوں کی تعداد ۴۰۰ × ۳۶۵ + ۹۷ = ۱۴۶۰۹۷ ہوتی ہے۔ اس لیے کاروباری سال کا اوسط طول ہمارے موجودہ نظام کی بموجب ۳۶۵،۲۴۲۵ دن ہے۔ یہ شمسی سال سے ۰،۰۰۰۲ دن کے اندر تک مطابقت رکھتا ہے۔ یہ تقریب اس قدر صحیح ہے کہ چند ہزار سال تک ایک دن کی خطا بھی پیدا نہیں ہوگی۔

مثال ۱۔ ثابت کرو کہ کسی رصدگاہ میں ایک شمسی سال کے دوران میں رأس الحمل کے بالائی تکبدوں کی تعداد (یعنے ۷ میں سے سورج کے دو متصلہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

عبوروں کے درمیان کوکبی ایام کی تعداد) اُسی رصدگاہ میں اُسی سال سورج کے بالائی تکبّدوں کی تعداد سے بقدر ایک کے زیادہ ہوتی ہے۔

سال کے آغاز کے بعد ۷ کے پہلے مرور سے کچھ دیر کے بعد سورج کا تکبّد واقع ہونا چاہئے۔ ۷ کے دوسرے، تیسرے، چوتھے اور آئندہ تکبّدوں پر سورج روز بروز زیادہ پیچھے ہوتا جائے گا تا آنکہ جب سال قریب الختم ہوگا تو وہ تقریباً پورے محیط کے برابر پیچھے رہ جائے گا۔ پس سورج کے ن ویں تکبّد سے کچھ ہی قبل ۷ کا (ن + ۱) واں تکبّد واقع ہوگا۔ اگر سورج ۷ کو اس کا تکبّد واقع ہونے سے قبل ملا لے تو سال مکمل ہوگا لیکن سورج کے تکبدوں کی تعداد ۷ کے تکبّدوں کی تعداد سے ایک کم ہوگی۔ اگر سورج ۷ کو عین اسوقت ملا لے جبکہ ۷ کا تکبّد واقع ہو تو سال کے آخری لمحہ میں سورج اور ۷ دونوں کے تکبدوں کی تعداد میں ایک کا اضافہ ہوگا اور اس طرح پھر بھی سورج کے تکبدوں کی تعداد ایک کم ہوگی۔

مثال ۲ — کسی ملک میں سال کبیسہ کے لیے ذیل کا قاعدہ مروج ہے:۔ اگر سال کے عدد کے آخر میں صفر ہوں تو صفروں کے اتنے زوج خارج کردو جتنے ممکن ہوں۔ تب اگر بقیہ عدد ۴ سے تقسیم پذیر ہو تو وہ سال سالِ کبیسہ ہوگا۔ دوسرے ملک میں حسب ذیل قاعدہ ہے:۔ سال کے عدد کو ۴۳ سے تقسیم کرو، تب اگر کوئی باقی حاصل ہو اور یہ باقی ۴ سے تقسیم پذیر ہو تو وہ سال کبیسہ ہوگا۔ ثابت کرو کہ ان دو ملکوں میں گنتی میں ایک دن سے زیادہ کا فرق کبھی نہیں ہوگا۔

۴۳ متصلہ وقفوں میں جن میں سے ہر ایک ۴۰۰ سال کا ہو ایک اور صرف ایک وقفہ ایسا ہونا چاہئے جس کا آغاز ایسے سال سے ہوگا جس کا عدد ۴۳ سے تقسیم پذیر ہوگا۔ یہ سال سالِ کبیسہ نہیں ہوگا اور دوسرے ملک میں ۴۰۰ سال کے اس وقفہ میں کبیسہ سالوں کی کل تعداد ۹۶ ہوگی اور اس طرح اس میں ایک دن کم پڑ جائے گا۔ باقی ۴۲ وقفوں میں سے ہر وقفہ میں کبیسہ سالوں کی تعداد ۹۷ ہوگی۔ اس لیے کل تعداد (۴۲ × ۴۰۰ =) ۱۶۸۰۰ سال میں ۴۲ × ۹۷ + ۱ ہوگی۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۲۱۲) پہلے ملک میں فی ۴۰۰ سال، کبیسہ سال تعداد میں بالعموم ۹۷ ہونگے لیکن ۱۳۲۰۰ سال کے وقفہ میں سوال میں دی ہوئی شرط کی بموجب ۱۰۰ سال کبیسہ نہیں ہوگا اور اس طرح یہاں بھی ایک دن کی کمی ہو جائے۔ اس لیے ہر ملک میں کبیسہ سالوں کی کل تعداد ہر ۱۳۲۰۰ سال کے وقفہ میں ۳۳ × ۹۷ - ۱ = ۳۲۰۰ ہوگی — پس ہم دیکھتے ہیں کہ ۱۳۲۰۰ سال کے ہر دور میں ان دو ملکوں میں سے ہر ملک میں کبیسہ سالوں کی تعداد ٹھیک ۳۲۰۰ ہوگی۔

۶۷ — اوسط حرکت کا ہندسی اصول۔

ایک نقطہ پ ایک دائرہ کے محیط پر اس طرح حرکت کر رہا ہے (شکل ۶۳) کہ وقت ت پر زاویہ و ج پ (= طہ) جس کی پیمائش ایک ثابت نصف قطر ج و سے ہوئی ہے مساوات ذیل سے حاصل ہوتا ہے:۔

$$\text{طہ} = ا + \frac{۲\pi ت}{ت_۰} + ا_۱ \text{جب} \frac{۲\pi ت}{ت_۰} + ب_۱ \text{جم} \frac{۲\pi ت}{ت_۰}$$
$$+ ا_۲ \text{جب} \frac{۲\pi ت}{ت_۰} + ب_۲ \text{جم} \frac{۲\pi ت}{ت_۰} \quad \ldots\ldots (۱)$$
$$+ ا_۳ \text{جب} \frac{۲\pi ت}{ت_۰} + ب_۳ \text{جم} \frac{۲\pi ت}{ت_۰}$$
$$\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots$$



شکل (۶۳)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جہاں ا، ت، ا، ب، ا، ب، ا، ب، ..... مستقل ہیں۔
یہ جملہ ت کی رقوم میں طہ کا بہت ہی عام جملہ ہے، اِس کی ایک مخصوص صورت، وقت کی رقوم میں سورج کے طول بلد کا ضابطہ ہے۔
اگر ت کی بجائے اِس جملہ میں ت + ت، لکھا جائے تو طہ، طہ + ۲۲ ہو جاتا ہے یعنے پ اُس نقطہ پر واپس ہوتا ہے جہاں سے چلا تھا۔ اسلیے پ کی حرکت کی مدتِ دوران ت، ہے۔
طہ کو بلحاظ ت کے تفرق کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\text{فرطہ}}{\text{فرت}} = \frac{۲۲}{ت_۰} + \frac{۲ا_۱ ۲۲}{ت_۰} \text{جم} \frac{۲ت ۲۲}{ت_۰} - \frac{۲ب_۱ ۲۲}{ت_۰} \text{جب} \frac{۲ت ۲۲}{ت_۰} \quad \text{(۲)}$$
$$+ \frac{۲ا_۲ ۲۲}{ت_۰} \text{جم} \frac{۲ت ۲۲}{ت_۰} - \frac{۲ب_۲ ۲۲}{ت_۰} \text{جب} \frac{۲ت ۲۲}{ت_۰} \ldots$$

(۲۱۳) یہ جملہ ایسا ہے کہ اِس میں ت کی بجائے ت + ت، رکھنے سے تغیر واقع نہیں ہوتا۔ اِس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دَور میں نقطہ پ اگر رفتار و سے کسی نقطہ لا میں سے گذرے تو وہ ہر دَور میں نقطہ لا میں سے اُسی رفتار و سے گذرے گا۔
پس یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی دو دَور ہر حیثیت سے ایک دوسرے کے مماثل ہیں۔ نہ صرف ہر دَور میں وہی وقت لگتا ہے بلکہ ہر نقطہ پر ہر دَور میں فی الواقعی وہی رفتار رہتی ہے۔

$\frac{\text{فرطہ}}{\text{فرت}}$ کے جملہ کا وہ حصہ یعنی $\frac{۲۲}{ت_۰}$ جو مثلثی تفاعلوں کو ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے اوسط زاوئی رفتار کہلاتا ہے۔ فرض کرو کہ پ، ایک نقطہ ہے جو دائرہ کے گرد یکساں طور پر زاوئی رفتار $\frac{۲۲}{ت_۰}$ کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور اس لیے ہر لمحہ پر ج پ ثابت نصف قطر ج و کے ساتھ زاویہ ا + ۲۲ ث / ت، بناتا ہے، تب اوسط محل پ،

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اور اصلی محل پ کے حسب ذیل خواص حاصل ہوتے ہیں :-

(۱) پ اور پ' کی دوری مدتیں مماثل ہوتی ہیں۔

(۲) پ اور پ' کے درمیان فاصلہ کبھی ایک خاص معین حد سے بڑھ نہیں سکتا۔

(۳) پ اور پ' کے درمیان اوسط فرق ایک پورے دور کے اثنا میں صفر ہوتا ہے۔

(۱) ظاہر ہے کیونکہ دوری مدتوں میں سے ہر ایک ت ہے۔

(۲) حاصل ہوتا ہے کیونکہ پ اور پ' کے درمیان فرق کبھی مجموعہ

$$\pm ا_۱ \pm ا_۲ \pm ا_۳ \pm ا_۴ \pm ب_۱ \pm ب_۲ \pm ب_۳ + \dots$$

سے تجاوز نہیں ہو سکتا جہاں ہر علامت اس طور پر لیجاتی ہے کہ متناظر رقم مثبت ہو۔

(۳) بھی صحیح ہے کیونکہ جب کبھی ن ایک مثبت صحیح عدد ہوتا ہے تو

$$ا_ن \text{ جب } \frac{۲ن\,۱۱\,ت}{ت_۰} \text{ فرت} = ۰ \text{ اور } ب_ن \text{ جم } \frac{۲ن\,۱۱\,ت}{ت_۰} \text{ فرت} = ۰$$

اس لیے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر ہم پ کے محل کو تعبیر کرنے والے زاویہ کو متناظر زاویہ طہ میں سے تفریق کریں تو اس فرق کی اوسط قیمت صفر ہے کیونکہ اس فرق میں صرف دوری رقمیں شامل ہوتی ہیں اور ان میں سے ہر ایک کی اوسط قیمت صفر ہے۔

پس یہ نتیجہ نکلا کہ پ، دائرہ کے گرد یکساں طور پر حرکت کرنے میں بعض اوقات پ سے آگے ہوتا ہے اور بعض اوقات اس کے پیچھے اور اوسطاً پ، پ سے عین اتنا ہی آگے ہوگا جتنا پیچھے، اسلیے پ کی حرکت کو بجا طور پر پ کی اوسط حرکت کہا جا سکتا ہے۔ ہم پ کی اصلی حرکت کو اوسط مقام پ' کے گرد ایک اہتزازی حرکت سمجھ سکتے ہیں۔

(۲۱۴) **مثال ۱**۔ اگر اوقات ۰، ت/۶، ۲ ت/۶، ۳ ت/۶، ۴ ت/۶، ۵ ت/۶ پر طہ کی قیمتیں علی الترتیب طہ، طہ'، ...، طہ ہوں تو ثابت کرو کہ طہ کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اس حصہ ا کے لیے جو ت پر منحصر نہیں ہے ذیل کا جملہ ملتا ہے :-

ا = $\frac{1}{6}$ (طہ + طہ۱ + طہ۲ + طہ۳ + طہ۴ + طہ۵) — ۱۵۰°

اگر ا۴، ب۴ اور اعلی تر رقمیں ترک کر دیجائیں —

عام ضابطہ (۱) میں متواتر اندراج سے

طہ = ا + ب۱ + ب۲ + ب۳

طہ۱ = ا + ۶۰° + ا۱ |۲ |۳ ۲ + ب۱ |۲ + ا۲ |۳ ۲ — ب۲ |۲ — ب۳

طہ۲ = ا + ۱۲۰ + ا۱ |۲ |۳ ۲ — ب۱ |۲ — ا۲ |۳ ۲ — ب۲ |۲ + ب۳

طہ۳ = ا + ۱۸۰ — ب۱ + ب۲ — ب۳

طہ۴ = ا + ۲۴۰ — ا۱ |۲ |۳ ۲ — ب۱ |۲ + ا۲ |۳ ۲ — ب۲ |۲ + ب۳

طہ۵ = ا + ۳۰۰ — ا۱ |۲ |۳ ۲ + ب۱ |۲ — ا۲ |۳ ۲ — ب۲ |۲ — ب۳

اس لیے عمل جمع سے

ا = $\frac{1}{6}$ (طہ + طہ۱ + طہ۲ + طہ۳ + طہ۴ + طہ۵) — ۱۵۰°

اس لیے اگر ہم ان چھ زمانوں پر جو گردش کے ایک پورے دور ت کو چھ مساوی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں طہ کی قیمتیں معلوم کر لیں تو ہم ا کو معلوم کر سکتے ہیں اور پھر ا + ۳۶۰ ت |۲ ت یعنے کسی وقت ت پر پ کا اوسط محل معلوم ہو جاتا ہے —

مثال ۲ — بتاؤ کہ عام ضابطہ (۱) کس طرح مختصر ہو جاتا ہے اگر حرکت محور ج و کے گرد متشاکل ہو —

اس صورت میں فرطہ |۲ فرت کی قیمت ت اور ت۔ ت کیلیے وہی ہوگی اگر ت کو و میں سے مرور کے وقت سے ناپا جائے۔ اس لیے (۲) میں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{۲\pi ب_۱}{ت} \text{جب} \frac{۲\pi ت}{ت} + \frac{۲\pi ب_۲}{ت} \text{جب} \frac{۴\pi ت}{ت}$$

$$+ \frac{۲\pi ب_۳}{ت} \text{جب} \frac{۶\pi ت}{ت} = ۰$$

یہ چونکہ ت کی سب قیمتوں کے لیے صحیح ہونا چاہیئے اِس لیے $ب_۱ = ب_۲ = ب_۳ = ۰$ اور اِس لیے ضابطہ (۱) ہو جاتا ہے

$$طہ = ۲\pi ت \backslash ا + ا_۱ \text{جب} ۲\pi ت \backslash ا + ا_۲ \text{جب} ۴\pi ت \backslash ا + ا_۳ \text{جب} ۶\pi ت \backslash ا$$

مثال ۳ — یہ مان کر کہ حرکت متشاکل ہے اور تشاکل کا محور وہ محور ہے جس سے طہ ناپا جاتا ہے اور یہ کہ $ا_۳$ اور اس سے اعلیٰ سر صفر سمجھے جا سکتے ہیں ثابت کرو کہ اگر $ا_۳ < ۲ ا_۲$ تو تین حقیقی نقطے ہوں گے جن میں پ کا اوسط محل اِس کے اصلی محل پر منطبق ہوگا۔

مثال ۴ — بحری جنتری بابتہ ۱۹۰۹ء سے اوسط ظہر پر سورج کے ظاہری طول بلد کے لیے حسب ذیل قیمتیں حاصل ہوتی ہیں:—

۱۹۰۹ء		ظاہری طول بلد
اوسط ظہر		☉ کا
یکم جنوری	۲۸۰° ۲۸′ ۱۱″	
۲ر اپریل	۱۲ ۶ ۳۰٫۹	
۲ر جولائی	۹۹ ۵۵ ۴۰٫۴	
یکم اکتوبر	۱۸۷ ۳۹ ۲۷٫۲	

ثابت کرو کہ سورج کا اوسط طول بلد $۲۸۰° ۳۸′ ۴۹٫۹۹ + ۳۶۰° ت \backslash ا$ ہے جہاں ت، اوسط شمسی ایام کی تعداد ہے جو یکم جنوری ۱۹۰۹ء اوسط ظہر سے گذر چکے ہیں اور جہاں ا، اوسط شمسی ایام میں شمسی سال کا طول ہے۔

ضابطہ (۱) کو استعمال کرنے میں اب ہم $ا_۳$، $ب_۳$، اور اعلیٰ رقموں کو (۲۱۵)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

نظرانداز کر دیتے ہیں۔ دَوری رقموں میں ہم کافی صحت کا لحاظ رکھتے ہوئے ت کو متواتر ۔ $\frac{1}{4}$ ت ، $\frac{1}{2}$ ت ، $\frac{3}{4}$ ت بنا سکتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ آخری تین تاریخوں میں ظاہری طول بلدوں میں سے ہر ایک کو بقدر ۳۶۰° کے بڑھانا چاہیئے۔ اس طرح ضابطہ (۱) سے حاصل ہوتا ہے

$$ل = ۲۸۰° ۲۸' ۱۱'' ۱ + ب_۱ + ب_۲$$

$$ل = ۳۰۷۹ ۶ ۳۷۲ + ل_۱ - ب_۲ + ۳۶۰° \times ۹۱ | ت$$

$$ل = ۴۰۷۴ ۵۵ ۴۵۹ + ب_۱ - ب_۲ + ۳۶۰° \times ۱۸۲ | ت$$

$$ل = ۲۷۷۲ ۳۹ ۵۴۷ + ل_۱ - ب_۲ + ۳۶۰° \times ۲۷۳ | ت$$

اس لیے جمع کرنے اور ت = ۲۴۲۲۷۳۶۵ رکھنے سے

$$۱۶۶۰° ۹' ۳۹۷۶'' = ۱۴ ل + ۵۳۸° ۹' ۴۸۷۶''$$

اور اس لیے $ل = ۲۸۰°۴۹۹۷$

سورج کے اوسط طول بلد کا روزانہ اضافہ ۹۸۵۶۵۷۰ ہے اور سال کے آغاز سے ۸۰۷۶۵۶ دنوں بعد یعنی بتاریخ ۲۲ مارچ اوسط طول بلد صفر ہے۔

اگر وہ متعدد چھوٹی رقمیں جو یہاں نظرانداز کی گئی ہیں ملحوظ رکھی جائیں تو سورج کا اوسط طول بلد حاصل ہوگا

$$۲۸۰°۴۹۹۴۲ + ۳۶۰° ت | ت$$

مثال ۵ — پچھلی مثال سے ثابت کرو کہ بتاریخ ۷ نومبر ۱۹۰۶ء سورج کا اوسط طول بلد ۲۲۶°۰۵ ہے۔

مثال ۶ — ثابت کرو کہ سورج کا اوسط طول بلد بوقت ۹۳ ۴ ۰ جنوری ۱۹۰۹ء ۲۸۰° تھا اگر یہ دیا گیا ہو کہ سورج کا اوسط طول بلد بتاریخ یکم اپریل ۱۹۰۹ء ۹°۲۰۷۶۸ ہے اور اس کا روزانہ اضافہ ۹۸۵۶۵۷۰° ہے

۶۸ — اوسط وقت

اگرچہ رصدگاہ کے خاص کام کے لیے کوکبی وقت کو استعمال کرنا

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

لازمی ہے تاہم یہ ظاہر ہے کہ ہیئتی گھڑی کاروباری زندگی کے معمولی مقاصد کو پورا نہیں کرے گی۔ اس آخری غرض کے لیے ایک ایسا دن چاہیئے جس کا طول ستاروں کے ذریعہ نہیں بلکہ سورج کے ذریعہ ناپا گیا ہو۔ اس لیے ہم اپنے معمولی وقت کی پیمائش کے لیے وہ دن استعمال کرتے ہیں جو اوسط شمسی یوم کے نام سے مشہور ہے۔

اب چونکہ سورج کی حرکت صعود مستقیم میں یکساں نہیں ہے اس لیے نصف النہار پر سورج کی دو متواتر واپسیوں کے درمیان وقفہ مستقل نہیں ہے تمثیلاً ہم یہاں شمسی یوم کا کوکبی طول پورے سال ۱۹۰۹ء کے چار مساوی الفصل تاریخوں پر دیتے ہیں۔

سنہ ۱۹۰۹ء

		کوکبی
ظاہری ظہر یکم جنوری سے	ظاہری ظہر دوسری جنوری تک	۲۴گ ۴م ۹ء ۲۴ث
〃 ۲ر اپریل سے	〃 ۳ر اپریل تک	۲۴ ۳ ۳۸ء ۵
〃 ۳ر جولائی سے	〃 ۴ر جولائی تک	۲۴ ۴ ۷ء ۵
〃 ۲ر اکتوبر سے	〃 ۳ر 〃	۲۴ ۳ ۳۰ء ۶

(۲۱۶) اس جدول کی پہلی سطر سے یہ بیان ہوتا ہے کہ اگر وہ وقت جس پر سورج کا مرکز مشاہد کے نصف النہار کو عبور کرتا ہے یکم جنوری ۱۹۰۹ء کو ہیئتی گھڑی میں دیکھا جائے اور مشاہدے کو دوسرے دن دہرایا جائے تو یہ ہیئتی گھڑی (اگر اس کی شرح کے لیے رعایت رکھی جائے) سے یہ معلوم ہوگا کہ کوکبی وقت کے ۲۴گ ۴م ۹ء ۲۴ث کا وقفہ ان دو مروروں کے درمیان گذر چکا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہری شمسی یوم جس کا آغاز یکم جنوری کی ظاہری ظہر سے ہوتا ہے اس شمسی یوم سے ۱۳ء ۴۷ کوکبی تانیے زیادہ طویل ہے جس کا آغاز ۲ر اکتوبر کی ظاہری ظہر سے ہوتا ہے۔ پس یہ معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری شمسی یوم کا طول سال تمام مستقل نہیں رہتا اور اس کے تغیرات یقیناً تین چوتھائی منٹ سے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

تجاوز کرتے ہیں ۔ ان بے قاعدگیوں کی وجہ سے شمسی یوم معمولی وقت کی پیمائش کے لیے موزوں اکائی نہیں ہے ۔ ہم ایک اوسط شمسی یوم کو اکائی کے طور پر اختیار کرتے ہیں جس کا طول بہت سے سالوں کے ظاہری شمسی ایام کا اوسط وقفہ ہوتا ہے ۔ اوپر کی فہرست بابتہ ۱۹۰۹ء میں چاروں کا اوسط وقفہ ۲۴ گ ۳ م ۵۶ ث ہے اور یہ اوسط شمسی یوم کی ایک تقریبی قیمت ہے ۔

جب متصلہ ظاہری شمسی ایام کی ایک بہت بڑی تعداد کا اوسط لیا جاتا ہے تو یہ معلوم ہوا ہے کہ کوکبی وقت میں ایک شمسی یوم کا معادل ۲۴ گ ۳ م ۵۶٫۵۵۵ ث ہے ۔

یہ پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے علماء ہیئت نے اس میں سہولت دیکھی ہے کہ ایک موہوم جسم (یا زیادہ صحیح طور پر ایک نقطہ) کا خیال کیا جائے جو ہر لمحہ خط استواء پر رہے اور اس کا ظاہری صعود مستقیم سورج کے اوسط طول بلد کے مساوی ہو ۔ اس موہوم جسم کو اوسط سورج کہتے ہیں ۔ دفعہ ۴۷ میں یہ ثابت کیا جائے گا کہ سورج کا ظاہری صعود مستقیم سورج کے اوسط طول بلد اور دوری رقموں کے مجموعہ کے مساوی ہوتا ہے ۔ پس سورج کے ظاہری صعود مستقیم اور اوسط سورج کے ظاہری صعود مستقیم میں صرف دوری رقموں کا فرق ہوتا ہے ۔ اس لیے وقت کے ایک طویل وقفہ میں اصلی سورج اور اوسط سورج کے ظاہری صعود مستقیموں کا اوسط فرق صفر کی طرف مائل ہوگا ۔ اگر ہم استقبال اور کبو کی وجہ سے خط استواء کی جو حرکت ہے اسے نظر انداز کر سکیں تو اوسط سورج کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ خط استواء میں اس طور پر یکساں حرکت کرتا ہے کہ ہر لمحہ اس کا صعود مستقیم سورج کے اوسط طول بلد کے مساوی ہوتا ہے ۔

جب اوسط سورج نصف النہار پر ہو تو وہ گھڑی جو مقامی اوسط وقت کو تعبیر کرتی ہے وقت ۱۲ گ ۰ م ۰ ث بتائے گی ۔ پس اوسط وقت کی گھڑی سے جو وقت معلوم ہوگا وہ، نصف النہار سے اوسط سورج کے ساعتی زاویے کو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کسی آن پر ظاہر کرے گا۔ کاروباری مقاصد کے لیے دن کا اغاز نیم شب سے ہوتا ہے اور گھنٹے ۱ گ سے ۱۲ گ (ظہر) تک اور پھر ۱ گ سے ۱۲ گ (نیم شب) تک گنے جاتے ہیں، اول الذکر گھنٹوں کو انگریزی میں حروف A . M . سے اور آخر الذکر کو حروف P - M . سے تمیز کیا جاتا ہے اور ہم انہیں علی الترتیب ب - ن (بعد نیم شب) اور ب - ظ (بعد ظہر) سے تمیز کریں گے۔ ہندی گنتی میں دن ظہر سے ظہر تک لیا جاتا ہے، ظہر کو ۱۲ گ کہتے ہیں اور بعد کے گھنٹے علی التسلسل ۲۳ گ تک گنے جاتے ہیں۔

مثال ۱ — حسب ذیل مفروضات سے کوکبی وقت میں اوسط شمسی یوم کا طول معلوم کرو۔

بتاریخ ۴ ر جولائی ۱۸۳۶ء سورج کے مرکز کا ظاہری صعود مستقیم بمقام گرینوچ مرور کے وقت مشاہدہ کرنے سے ۶ گ ۵۴ م ۷٫۰۳ ث معلوم ہوا۔

اسی طرح بتاریخ ۴ ر جولائی ۱۸۹۰ء سورج کے مرکز کا صعود مستقیم ۶ گ ۵۴ م ۵۴٫۶۱ ث معلوم ہوا۔

ہمیں اول وہ کوکبی وقفہ معلوم کرنا ہے جو ۳ ر جولائی ۱۸۳۶ء کے کوکبی وقت ۶ گ ۵۴ م ۷٫۰۳ ث اور ۴ ر جولائی ۱۸۹۰ء کے کوکبی وقت ۶ گ ۵۴ م ۵۴٫۶۱ ث کے درمیان ہے۔

یہ وقفہ ۵۴ سال کا ہے اور اس لیے راس الحمل کے مرورں کی تعداد سورج کے مرورں کی تعداد سے ۵۴ زیادہ ہوگی (دفعہ ۶۶ مثال ۱)۔ سورج کے مرورں کی تعداد ۱۹۷۲۳ ہے اور ۷ کے مرورں کی تعداد ۱۹۷۷۷ ہے، اور اس لیے پورا وقفہ کوکبی وقت میں

دن گ م ث
۱۹۷۷۷ ۶ ۵۳ ۵۴٫۶۱ — (۶ گ ۵۴ م ۷٫۰۳ ث)

اس کو ۱۹۷۲۳ سے تقسیم کرنے سے اوسط شمسی یوم کی کوکبی قیمت ۲۴ گ ۳ م ۵۶٫۵۵۵ ث معلوم ہوتی ہے۔

مثال ۲ — اوسط شمسی یوم کا طول کوکبی وقت میں حسب مثال ماسبق

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

دو لمحوں پر سورج کے صعود مستقیموں کا مقابلہ کرنے سے معلوم کیا گیا ہے، اِن لمحوں کا فرق ۳۰ سال ہے۔ ثابت کرو کہ دونوں صعود مستقیموں میں ۵ش تک بڑی خطائیں اُس قیمت کو ثانیہ کے ہزارویں حصہ سے زیادہ متاثر نہیں کر سکتیں جو اوسط شمسی یوم کے لیے معلوم کی گئی ہو۔

مثال ۳ — اوسط شمسی وقت کو کوکبی وقت میں بدلنے کا ایک تقریبی قاعدہ اِس طرح بیان کیا جا سکتا ہے:۔ ہر اگ ام کے لیے ۱۰ش جمع کرو، باقی ہر ام اش کے لیے ۱۰/۴ش جمع کرو باقی ہر ۴ش کے لیے ۱۰/۱ش جمع کرو۔ اِس قاعدہ سے اوسط شمسی یوم کا طول معلوم کرنے میں کیا خطا ہوگی۔

مثال ۴ — اگر شمسی سال کی مدت کے اُس جملہ میں جو اوسط شمسی وقت کے دِنوں، گھنٹوں، منٹوں، اور ثانیوں کی رقوم میں ہے دنوں کی تعداد میں ایک کا اضافہ کیا جائے لیکن گھنٹے، منٹ اور ثانیے نہ بدلے جائیں تو نتیجہ شمسی سال کی مدت کو کوکبی وقت کے دنوں، گھنٹوں، منٹوں اور ثانیوں میں بیان کرے گا۔

۶۹ — اوسط ظہر پر کوکبی وقت۔ (۲۱۸)

ایک دئے ہوئے لمحہ پر اوسط سورج کا صعود مستقیم یا زیادہ صحیح طور پر ۷ اور اوسط سورج کا درمیانی فاصلہ حسب شرح دفعہ ۶۸ سورج کا اوسط طول بلد ہوتا ہے اور اس کے لیے جملہ ہے (مثال ۴ دفعہ ۶۷)

$$۶۶۴۲ ۹۹۴ ۸۰ ؛ ۲ + ۳۶۰° \times ت \backslash ت .$$

جہاں ت، شمسی سال کا طول ہے اور ت\ت شمسی سال کا وہ کسری حصہ ہے جو یکم جنوری ۱۹۰۹ء کی ظہر سے گذر چکا ہے۔

اِس جملہ کو ۱۵ فی گھنٹہ کی شرح سے وقت میں تحویل کرنے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یکم جنوری گرینوچ اوسط ظہر کے بعد ت اوسط شمسی ایام پر اوسط سورج کا صعود مستقیم ہے

$$۱۸^{گ} ۴۱^{م} ۵۸ ؛ ۸۴^{ش} + ۲۳۶ ؛ ۵۵ ۵۴ ت$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اُن مشاہدات کی نوعیت جن سے اِس جملہ کی پہلی رقم ا کی قیمت حاصل کی گئی ہے حسب ذیل طریقہ پر واضح کی جا سکتی ہے۔ سال ت کو مساوی حصوں کی ایک کافی تعداد میں تقسیم کرو۔ تقسیم کے ہر نقطہ پر فرض کرو کہ سورج کا صعود مستقیم مشاہدہ کیا گیا ہے اور یہ صعود مستقیم علی الترتیب عہ، عہ، ..... ہیں۔ ہم مان لیں گے کہ اِن صعود مستقیموں کا اوسط انہی لمحوں پر اوسط سورج کے صعود مستقیموں کے اوسط کے مساوی ہے۔ یہ مفروضہ جائز ہے کیونکہ خاص دَوری رقموں میں سے ہر رقم ایک وقفہ میں جس میں سال کے مساوی حصوں کی ٹھیک تعداد شامل ہو تبدیلیوں کے ایک پورے دَور میں سے گذرتی ہے۔ اِس لیے اگر ہم لمحوں کی ایک ایسی تعداد لیں جو سال کو مساوی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں تو اِن میں سے ہر رقم کی اوسط قیمت اِن لمحوں پر صفر ہو گی (بشرطیکہ لمحوں کی تعداد کافی بڑی لی گئی ہو، دفعہ ۶۷) پس اصلی اور اوسط سورج کے اوسط صعود مستقیم اِن لمحوں پر مساوی ہوں گے۔ ہم اِس عمل کو ایسے چھ لمحات لیکر واضح کریں گے۔ فرض کرو کہ اِن لمحات پر سورج کے اوسط طول بلد علی الترتیب

ا، (ا + ۴گ)، (ا + ۸گ)، .....

ہیں جہاں ا نامعلوم مقدار ہے جسے معلوم کرنا ہے۔ اگر ہم اصلی سورج کے صعود مستقیم (عہ، عہ، ....) اِن لمحوں پر معلوم کریں تو حاصل ہوتا ہے

ا + (ا + ۴گ) + (ا + ۸گ) + (ا + ۱۲گ) + (ا + ۱۶گ) + (ا + ۲۰گ)

= عہ + عہ + عہ + عہ + عہ + عہ

ا حاصل کرنے کے لیے ہم ایک مخصوص صورت کے طور پر عہ، عہ، .... (۲۱۹)
عہ کی قیمتیں حسب ذیل جدول سے لیتے ہیں۔

متساوی الفصل تاریخیں

گرینوچ اوسط وقت (گ - ا - و)	سورج کا صعود مستقیم
سنہ ۱۹۰۹ء جنوری ا دن	۱۸گ ۴۵م ۳۳ث

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مارچ	۲ دن	۲۱ گ	۲۲ گ	۵۴ م	۱۲ ث
مئی	۲	۱۸	۲	۳۸	۴۱ + ۲۴ گ
جولائی	۲	۱۵	۶	۴۵	۴۷ + ۲۴ گ
ستمبر	۱	۱۲	۱۰	۴۱	۵۴ + ۲۴ گ
نومبر	۱	۹	۱۴	۲۵	۴۰ + ۲۴ گ

ضابطہ میں اندراج سے حاصل ہوتا ہے

۱ = ۱۸ گ ۴۱ م ۵۸ ث

۱ میں ایک ثانیہ سے کم کا خفیف تغیر کرنے سے (جو ضروری ہے جبکہ بہت سی چھوٹی تفصیلات ملحوظ رکھی جائیں جنکا یہاں غور کرنا ممکن نہیں تھا) ۱ کی مطلوبہ قیمت حاصل ہوتی ہے

۱۸ گ ۴۱ م ۵۸٫۸۴ ث

جب اوسط سورج نصف النہار پر آتا ہے تو اس کا صعود مستقیم بلاشبہ اِس لمحہ پر کوکبی وقت ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں عملی علم ہیئت کا وہ اہم عنصر ملتا ہے جو اوسط ظہر کے کوکبی وقت کے طور پر مشہور ہے۔ یہ مقدار کوکبی وقت کو اوسط وقت میں اور اوسط وقت کو کوکبی وقت میں تحویل کرنے میں ناگزیر ہے۔ ایفیمرس میں ہر دن کے لیے اوسط ظہر پر کوکبی وقت دیا جاتا ہے۔

مثال ۱ ۔ ثابت کرو کہ بمقام گرینوچ بوقت اوسط ظہر بتاریخ ۲۷ مارچ ۱۹۰۹ء کوکبی وقت ۱۷ گ ۴۱ م ۶ ث ہے۔

بتاریخ ۲۷ مارچ اوسط ظہر پر یکم جنوری سے وقفہ ۸۵ دن ہے۔

ت کی بجائے یہ قیمت جملہ

۱۸ گ ۴۱ م ۵۸٫۸۴ ث + ۲۳۶٫۵۵۵۴ ت

میں درج کرنے سے مطلوبہ نتیجہ حاصل ہوتا ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۲ — معلوم کرو کہ ۱۹۰۹ء کی کس تاریخ پر اوسط سورج راس الحمل میں سے گذرتا ہے۔

مثال ۳ — اگر یہ دیا جائے کہ بمقام گرینوچ بتاریخ ۲۱ مارچ ۱۸۹۶ء راس الحمل کے مرور کے اوسط اوقات گ ۱م ۵۹ث ۷۰ء اور ۲۳گ ۵۸م ۹ث ۳۷ء ہیں تو وہ لمحہ معلوم کرو جس پر گرینوچ اوسط وقت اور کوکبی وقت مساوی ہوتے ہیں

مثال ۴ — ثابت کرو کہ یکم جنوری ۱۹۰۰ء کی اوسط ظہر کے بعد ت اوسط شمسی ایام پر اوسط سورج کا صعود مستقیم ۱۸گ ۴۲م ۴۳ث ۵۱ء + ۲۳۶ث ۵۵۴ء ت ہے

اور سورج کا اوسط طول بلد ۲۸۰° ۶۸۱ء + ۰ء ۹۸۵۶۵ ت ہے۔

۷۰ — کوکبی وقت سے اوسط وقت معلوم کرنا۔ (۲۲۰)

کسی مقام پر اوسط شمسی وقت کی تعیین فی الحقیقت بالواسطہ یا بلاواسطہ سورج کے مشاہدات پر منحصر ہوتی ہے۔ ملاح عموماً اپنے آلہ سدس سے صبح یا شام کے وقت سورج کا مشاہدہ کرکے وقت معلوم کرتا ہے۔ یہ راست طریقہ کی مثال ہے۔ لیکن ہیئت داں جس کے پاس آلۂ سدس کی بہ نسبت زیادہ بڑی طاقت اور صحت کے ثابت آلات ہوتے ہیں بالعموم اوسط وقت کو کوکبی وقت سے محسوب کرکے اخذ کرتا ہے، کوکبی وقت کو جیسا کہ قبل ازیں دفعہ ۶۳ میں سمجھایا جا چکا ہے وہ بعض "گھڑی تاروں" (clock stars) کے مشاہدے سے حاصل کرتا ہے۔ اِن گھڑی تاروں کے مقامات ایفیمرس سے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ مقامات ۷ کے محل پر منحصر ہوتے ہیں جسے شمسی مشاہدات سے متعین کیا جاتا ہے پس اوسط وقت کو گھڑی تارے کے ذریعہ معلوم کرنے کا یہ طریقہ ایسا ہے کہ اس میں سورج کے مشاہدات صرف بالواسطہ شامل ہیں۔

ایفیمرس سے وہ اصلی کوکبی وقت معلوم ہوتا ہے جس پر گھڑی تارہ نصف النہار کو عبور کرتا ہے اور مشاہد وہ وقت نوٹ کر لیتا ہے جو اسکی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کوکبی گھڑی بتاتی ہے ۔ ان دو وقتوں کا فرق اس کی گھڑی کی تصحیح ہے اور اس لیے کوکبی وقت معلوم ہو جاتا ہے ۔ ایفیمرس سے گرینوچ اوسط ظہر کا کوکبی وقت بھی معلوم ہوتا ہے، اس لیے اگر بوقت ظہر اوسط وقت کی گھڑی کا مقابلہ کوکبی گھڑی کے ساتھ کیا جائے تو اس سے اوسط وقت کی گھڑی کی خطا معلوم ہو جائے گی ۔ لیکن بالعموم بوقت ظہر اوسط وقت کی گھڑی اور کوکبی گھڑی کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا اور نہ بالعموم مشاہد کا طول بلد صفر ہوگا۔ اسلیے ہم حسب ذیل عمل کرتے ہیں :-

فرض کرو کہ ک مقامی کوکبی وقت ہے،
" ت اسی آن مقامی اوسط وقت ہے،
" ل مشاہد کا طول بلد ہے گرینوچ کے مغرب میں،
" ن اوسط شمسی ایام کی تعداد ایک شمسی سال میں،
= ۳۶۵ ؛ ۲۴۲۲
" م وہ کوکبی وقت ہے جو بمقام گرینوچ ایک یوم قبل اوسط ظہر پر تھا ۔

ن اوسط شمسی ایام میں ن + ۱ کوکبی ایام ہوتے ہیں، اس لیے شمسی وقفہ کا کوئی وقفہ مماثل کوکبی وقت میں جزو ضربی (ن + ۱) \ ن کے ذریعہ تحویل ہوتا ہے اور کوکبی وقت کا کوئی وقفہ مماثل شمسی وقت میں جزو ضربی ن \ (ن + ۱) کے ذریعہ تحویل ہوتا ہے ۔ مجوزہ صورت میں طول بلد ل ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے حسب ذیل دو نتیجے حاصل ہوتے ہیں ۔

(۱) راس الحمل کوکبی وقت کے ل گھنٹوں میں گرینوچ کے نصف النہار سے مشاہد کے نصف النہار تک حرکت کرے گا ۔

(۲) اوسط وقت کے ل گھنٹوں میں اوسط سورج گرینوچ کے نصف النہار سے مشاہد کے نصف النہار تک حرکت کرے گا ۔ (۲۲۱)

چونکہ زیر بحث لمحہ پر کوکبی اور اوسط مقامی اوقات ک اور ت ہیں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِس لیے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ ک + ل اور ت + ل گرینوچ پر متناظر کوکبی اور اوسط اوقات ہیں۔

اوسط وقت کا وقفہ ت + لَ کوکبی وقت میں جزو ضربی (ن + ۱)\ن کے ذریعہ تحویل ہوتا ہے۔ اسے ک + ل میں سے تفریق کیا جائے تو اُسی دن گرینوچ کی اوسط ظہر پر کوکبی وقت ملنا چاہئے، اس لیے

م = ک + ل - (ن + ۱)(ت + ل)\ن

اِس مساوات کو حسب ذیل مماثل اشکال میں لکھا جا سکتا ہے جو ایفیمرس کی جدولوں کے ساتھ استعمال کرنے میں اکثر سہولت بخش ثابت ہوئی ہیں:۔

ت + ل = (ک + ل - م) ن\(ن + ۱)،

ک + ل = م + (ت + ل)(ن + ۱)\ن

کوکبی وقت سے اوسط وقت معلوم کرنے کا سب سے زیادہ عملی طریقہ غالباً حسب ذیل ہے:۔

اگر ہم مندرجۂ بالا تین مماثل مساواتوں میں سے کسی ایک میں ت = ۰ رکھیں اور اگر مقامی اوسط ظہر کے مقامی کوکبی وقت کو مَ بنائیں تو

م = مَ + ل - ل (ن + ۱)\ن

یا مَ = م + ل\ن

مقدار ل\ن اِس مخصوص نصف النہار کے لیے ایک مستقل مقدار ہے۔ اِس کو اگر گرینوچ کی اوسط ظہر پر کے کوکبی وقت میں جمع کیا جائے تو مقامی کوکبی وقت مقامی اوسط ظہر پر حاصل ہو جاتا ہے۔ پس یہ جملہ حاصل ہوتا ہے

ت = (ک - مَ) ن\(ن + ۱)

جو اُن جدولوں سے بہت ہی آسانی کے ساتھ محسوب کیا جا سکتا ہے جو کوکبی وقت کے وقفوں کو اوسط وقت کے متناظر وقفوں میں بدلنے کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۱ ۔ اگر بمقام گرینوچ بوقت اوسط ظہر کوکبی وقت م ہو تو ثابت کرو کہ ایک مقام پر جس کا طول بلد (گرینوچ کے مغرب میں) ل ہے اُسی دن اوسط ظہر پر کوکبی وقت مَ، مساوات

$$\text{مَ} = \text{م} + ۸۵۶۵ ، ۹^{\text{ث}} \times \text{ل}$$

سے حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۲ ۔ ثابت کرو کہ اگر وقت کا ایک وقفہ ت سے تعبیر ہو جبکہ اُسے اوسط وقت میں شمار کیا جائے اور تَ سے تعبیر ہو جبکہ اُسے کوکبی وقت میں شمار کیا جائے تو

$$\text{تَ} = \text{ت} + ۸۵۶۵ ، ۹^{\text{ث}} \text{ ت}$$

$$\text{ت} = \text{تَ} - ۸۲۹۶ ، ۹^{\text{ث}} \text{ تَ}$$

جہاں پر جملہ کی آخری رقم میں ت اور تَ گھنٹوں اور ایک گھنٹے کے کسری حصوں میں بیان کئے گئے ہیں۔ (۲۲۲)

مثال ۳ ۔ بتاریخ ۱۸ فروری ۱۹۰۹ء بمقام گرینوچ اوسط ظہر پر کوکبی وقت ۲۱ گ ۵۱ م ۵۵ ، ۱۳ ث ہے۔ ثابت کرو کہ راس الحمل کا مرور ۲ گ ۸ م ۳۵ ، ۲۵ ث اوسط وقت پر واقع ہوتا ہے۔

مثال ۴ ۔ ثابت کرو کہ بمقام گرینوچ کوکبی ظہر کا گرینوچ اوسط وقت یہ ہے

$$(۲۴ \text{ گ} - \text{م}) \text{ ن} \backslash (\text{ن} + ۱)$$

جہاں م، اوسط ظہر پر کوکبی وقت ہے اور ن، شمسی سال میں اوسط شمسی ایام کی تعداد ہے۔

نیز ثابت کرو کہ مغربی طول بلد ل پر کوکبی ظہر کا مقامی اوسط وقت، گرینوچ پر کوکبی ظہر کے گرینوچ اوسط وقت میں سے ن \ (ن + ۱) تفریق کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

نوٹ :۔ کوکبی ظہر سے ۷ کے بالائی تکبیر کا لمحہ مراد ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۵ — ثابت کرو کہ بتاریخ یکم نومبر سنہ ۱۹۰۸ء ا ب - ظ[۱] گرینوچ اوسط وقت پر بمقام مدراس کوکبی وقت ۲۱ گ ۲ م ۳۹ ث ہے اگر مدراس کا طول بلد ۵ گ ، ۲۱ م ۰ ث م ہو اور گرینوچ پر بوقت اوسط ظہر کوکبی وقت ۱۴ گ ۴۱ م ۲۹ ہو۔

مثال ۶ — کولمبیا کالج نیو یارک طول بلد ۴ گ ۵۵ م ۵۴ ث مغرب میں ہے بتاریخ ۱۲ دسمبر سنہ ۱۹۰۸ء گرینوچ پر بوقت اوسط ظہر کوکبی وقت ۱۷ گ ۲۳ م ۸ ث ہے۔ ثابت کرو کہ اُسی دن جبکہ کولمبیا کالج پر کوکبی وقت ۲۰ گ ۸ م ۴ ث ہو تو مقامی اوسط وقت ۲ گ ۴۳ م ۴۱ ث ہوگا۔

مثال ۷ — وہ کوکبی وقت جس پر سورج کا نیم قطر بتاریخ یکم جولائی سنہ ۱۹۰۸ء نصف النہار کو عبور کرتا ہے ۱ م ۳۷٫۸ ث ہے۔ ثابت کرو کہ متناظر اوسط وقت کوکبی وقت سے ۱۹٫۱ ث تفریق کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

۷۱ — ارضی تاریخ خط۔

ذیل کی ایک مخصوص مثال کے ذریعہ ارضی تاریخ خط کا مطلب ذہن نشین کیا جا سکتا ہے۔

فرض کرو کہ بمقام گرینوچ بروز چہار شنبہ بتاریخ ۱۴ جون سنہ ۱۹۰۵ء وقت ۱۰ ب - ن[۲] ہے ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ اُسی آن ہر دیگر نصف النہار (مشرق یا مغرب) پر کیا وقت ہے اور خاص کر کونسا دن ہے۔

نصف النہار ۹ گ ۵۹ م (گرینوچ کے مغرب) پر مبنیہ آن پر وقت عین نیم شب کے بعد ہے یعنی چہار شنبہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ لیکن نصف النہار ۱۰ گ ۱ م مغرب پر وقت ۱۱ گ ۵۹ م ب - ظ ہے اور اس لیے اِس نصف النہار پر

[۱] A. M. [۲] P. M.

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ابھی سہ شنبہ ہے اور تاریخ ۱۳ جون ہے۔ اگر ہم یہ تصور کریں کہ سطح ارض کے ہر نصف النہار پر ایک چٹ لگی ہوئی ہے جس پر گرینوچ کے ۱۴ جون ۱۹۰۵ء کے وقت ۱۰ ب ۔ ن کے جواب میں ہفتہ (یا مہینہ) کا دن لکھا ہوا ہے تو ان چٹوں پر کے ناموں میں اچانک تبدیلی ہوگی جب ہم اُس نصف النہار پر پہنچیں گے جو گرینوچ سے ۱۰ گ غ پر ہے۔

لیکن یہ بہ آسانی معلوم ہوتا ہے کہ تسلسل کی ایک اور شکست کسی دوسرے نصف النہار پر واقع ہونی چاہیئے۔ کیونکہ یہ تصور کرو کہ ہم خیال (۲۲۳)
کی سرعت کے ساتھ پوری زمین کے گرد نصف النہار ۱۰ گ سے مغرب کی جانب حرکت کر سکتے ہیں تو ہم اُن نصف النہاروں کو عبور کرتے ہوئے چلیں گے جن پر سہ شنبہ کی چٹ لگی ہے لیکن جب سفر قریب الختم ہو اور ہم مشرق سے نصف النہار ۱۰ گ کی طرف آ رہے ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ نصف النہاروں پر چہار شنبہ کی چٹ لگی ہے۔ اس لیے ایک نصف النہار سے جس پر ایک دن کی چٹ لگی ہے اُس نصف النہار تک جس پر دوسرے دن کی چٹ لگی ہے کوئی اور تاریخ کی تبدیلی عمل میں آ چکی ہے۔

نصف النہاروں پر کی چٹوں میں تسلسل کی یہ دوسری شکست اُس طرح پیدا نہیں ہو سکتی جس طرح کہ نیم شب کے وقوع سے ہوئی تھی۔ نیم شب کے نقطے پر تبدیلی غلط سمت میں ہوگی اور بلاشبہ ۱۰ گ غ ہی پوری سطح زمین پر وہ نصف النہار ہے جہاں اُس وقت آدھی رات ہوگی۔ اس لیے عرض بلد کے ہر توازی میں ایک دوسرا نقطہ ہونا چاہیئے جس پر تاریخوں کے تسلسل میں جو اس توازی پر کے مختلف مقامات سے متعلق ہیں ایک شکست ہو۔ اس مقصد کے لیے توازی پر کا کوئی نقطہ مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم عام سہولت کا لحاظ کرتے اسے اختیاری طور پر منتخب کرتے ہیں چنانچہ اس قرارداد کی پیروی کی جاتی ہے کہ یہ نقطہ گرینوچ سے نصف النہار ۱۲ گ سے حتی الامکان قریب واقع ہو اگر وہ اس نصف النہار پر فی الواقعی نہ لیا جا سکے۔ حقیقی تاریخ خط جیسا کہ وہ موسوم ہے قطب سے قطب تک

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کھینچا جاتا ہے ۔ جہاں تک کہ ۱۲ گ کا نصف النہار کھلے سمندر میں سے گذرتا ہے یہ تاریخ خط اس نصف النہار پر منطبق ہوتا ہے اور صریحاً اس کے راستہ کا زیادہ حصہ سمندر میں سے گذرتا ہے ۔ دوسرے مقامات پر یہ تاریخ خط ۱۲ گ کے نصف النہار کی ایک یا دوسری جانب قدرے جھولتا ہے تاکہ وہ مثلاً آباد علاقے الاسکا (Alaska) میں سے نہ گذرنے پائے یا جزائر الیشن[1] کی ایسی تقسیم نہ کردے کہ اس سے وہاں کے باشندوں کو تکلیف ہو ۔

بجوزہ صورت میں ۱۰ گ غ تک تمام مغربی طول بلدوں پر دن چہارشنبہ اور تاریخ ۱۴ ہ جون ہے ۔ مغربی طول بلدوں کے دو اور گھنٹوں کے لیے یعنی ۱۰ گ غ سے ۱۲ گ غ تک یا زیادہ صحیح طور پر ۱۰ گ غ سے اس نقطے تک جہاں تاریخ خط عبور کرتا ہے دن سہ شنبہ ہے اور تاریخ ۱۳ ہ جون لیکن چونکہ یہ توازی تاریخ خط کو عبور کرتا ہے اس لیے تاریخ دفعتاً بدلتی ہے چنانچہ اس خط کے عین قریب ایک جانب وقت ۱۰ ب ۔ ظ ۔ دن سہ شنبہ تاریخ ۱۳ ہ جون ہوتی ہے تو دوسری جانب وقت ۱۰ ب ۔ ظ ۔ دن چہارشنبہ تاریخ ۱۴ ہ جون ہوتی ہے ۔ اس طرح ب گ سے تقریباً ۱۲ گ تک تمام مشرقی طول بلدوں پر دن چہارشنبہ اور تاریخ ۱۴ ہ جون ہے ۔ پس یہ معلوم ہوا کہ زیر بحث لمحہ پر طول بلد کے تقریباً ۲۲ گھنٹے چہارشنبہ کا دن ۱۴ ہ جون کی تاریخ رکھتے ہیں اور دو گھنٹے سہ شنبہ کا دن ۱۳ ہ جون کی تاریخ رکھتے ہیں ۔

دوسری مثال کے طور پر فرض کرو کہ یکشنبہ کے دن گرینوچ پر وقت ۶ ب ۔ ظ ہے ۔ اس لیے طول بلد ۵ گ ۵۹ م پر وقت ۱۱ گ ۵۹ م ب ۔ ظ اور دن یکشنبہ ہے لیکن طول بلد ۶ گ ۱ م پر وقت ب گ ۱ م ب ۔ ن اور دن دوشنبہ ہے ۔ اس لیے جیسے ہم طول بلد ۶ گ م سے مشرقاً طول بلد ۱۲ گ م تک یا زیادہ صحیح طور پر اس توازی پر کے تاریخ خط تک حرکت کرتے ہیں دن دوشنبہ ہے (۲۲۴)

[1] Aleutian

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

لیکن تاریخ خط پر (جہاں حقیقی وقت تقریباً ۶ ب ۔ ن ہے) دن دفعتاً اسی ساعت پر یکشنبہ میں بدل جاتا ہے اور تاریخ خط سے گرینوچ تک تمام مغربی طول بلدوں پر یکشنبہ رہتا ہے۔

نویں باب پر مثالیں

مثال ۱ ۔ اگر سورج کا طول بلد لہ ہو، اس کا صعود مستقیم عہ اور طریق الشمس کا میلان سہ تو ثابت کرو کہ لہ ۔ عہ کی بڑی سے بڑی قیمت اس وقت واقع ہوتی ہے جبکہ مس لہ = ظ سہ اور مس عہ = ظ جم سہ ۔

مثال ۲ ۔ بتاریخ ۲۲ ستمبر سورج کا میل مرور پر ۲ آ ۸۰ ، ۱۷ گ ش مشاہدہ کیا گیا اور بتاریخ ۲۳ ستمبر اس کا میل ۶ آ ۵۶ ، ۲۱ گ ج مشاہدہ کیا گیا۔ نیز ان دو مرورں کا کوکبی وقفہ ۲۴ گ ۳ م ۵۰ ، ۳۵ ش تھا۔ دوسرے مشاہدہ پر سورج کا صعود مستقیم کیا تھا؟ [Coll. Exam.]

اس مثال کے طریقہ سے راس الحمل معلوم کرنے میں خاص خطاؤں کے واقع ہونے کا کہاں امکان ہے۔

مثال ۳ ۔ قطب تارہ کا صعود مستقیم ۱ گ ۲۱ م ۱۸ ش ہے۔ گرینوچ پر اوسط ظہر کے کوکبی اوقات بتواریخ ۱۱ اور ۱۲ اپریل علی الترتیب ۱۹ گ ۶۰ ، ۵۰ ش اور ۲۳ گ ۱۵ ، ۴۷ ش ہیں۔ گرینوچ پر بتاریخ ۱۱ اپریل قطب تارے کے تین مرورں کے اوسط اوقات معلوم کرو۔ [Coll. Exam.]

مثال ۴ ۔ بحری جنتری سے حسب ذیل چیزیں دی گئی ہیں:۔

اوسط ظہر کا کوکبی وقت بتاریخ ۲۱ مارچ ۱۸۹۸ء ۲۳ گ ۵۶ م ۵۷ ، ۵ ش

" " بتاریخ ۲۲ مارچ ۱۸۹۸ء " " ۲ ، ۴۲

تقریبی طور پر وہ اوسط وقت معلوم کرو جس پر اوسط سورج اعتدال ربیع سے گذرا تھا۔

[Coll. Exam.]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۵ — ایک ستارہ جس کا صعود مستقیم ۵ گ ۹ م ۴۳٫۹ ش ہے بتاریخ ۷ فروری بمقام سیڈنی (طول بلد ۱۵۱° ۱۲′ ۲۳″ م) مرور میں ہے جبکہ مشاہد کی گھڑی میں مقامی وقت ۸ گ ۰ م ۳ ش ہے۔ اگر گرینوچ پر بتاریخ ۷ فروری اوسط ظہر پر اوسط سورج کا صعود مستقیم ۲۱ گ ۸ م ۱٫۱ ۳۶ ش ہو اور اگر کوکبی وقت کا ایک گھنٹہ اوسط وقت کے ۵۹ م ۵۰٫۲ ش کے معادل ہو تو قریب ترین ثانیہ تک معلوم کرو کہ گھڑی کسقدر سست یا تیز ہے۔

مثال ۶ — ثابت کرو کہ ایک معلومہ ستارہ کا ایک واحد ارتفاع عرض بلد معلوم کرنے کے لیے کافی ہے اگر مقامی کوکبی وقت معلوم ہو، اور مقامی کوکبی وقت معلوم کرنے کے لیے کافی ہے اگر عرض بلد معلوم ہو۔

اگر مشاہدہ کردہ ارتفاع میں قوس کے لامنٹوں کی خطا ہو تو ماخوذ کوکبی وقت میں وقت کے $\frac{1}{15}$ لاقط لہ قم (۲۲۵) لامنٹوں کی خطا ہوگی جہاں لہ، مقام کا عرض بلد ہے اور ا، مشاہدہ کی آن پر ستارہ کا السمت ہے۔

مثال ۷ — میل ضہ کے ایک ستارہ کا راسی فاصلہ ی ہے جبکہ اسے نصف النہار کے قریب ساعتی زاویے ت پر مشاہد کیا گیا۔ اگر فہ — ضہ بہت چھوٹا نہیں ہے تو ثابت کرو کہ عرض بلد مساوات

$$\text{فہ} = \text{ی} - \text{ضہ} \frac{\text{۲ جم ضہ جم فہ}}{\text{جب (فہ — ضہ)}} \text{ جب}^{۲} \frac{۱}{۲} \text{ ت}$$

سے صحیح طور پر معلوم کیا جا سکتا ہے جس کی آخری رقم میں فہ کی ایک تقریبی قیمت استعمال کی جا سکتی ہے۔

مثال ۸ — اگر وہ کوکبی اوقات جبکہ سورج نصف النہار کی ہر جانب مساوی ارتفاعوں پر پہنچتا ہے ع′ اور ع ہوں اور اگر اس وقفہ میں سورج کے میل ضہ کی تبدیلی فرضہ ہو اور اگر سورج کا صعود مستقیم بوقت مرور عہ ہو تو ثابت کرو کہ اصلی کوکبی وقت حاصل کرنے کے لیے گھڑی کے وقت میں جو تصحیح کرنی ہوگی وہ

$$\text{عہ} - \frac{۱}{۲}(\text{ع} + \text{ع′}) - \frac{۱}{۲}\left(\frac{\text{مس ضہ}}{\text{مس } \frac{۱}{۲}(\text{ع′} - \text{ع}) \text{ جب } \frac{۱}{۲}(\text{ع′} - \text{ع})}\right) \frac{\text{مس فہ}}{\text{فرضہ}}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہے۔ نیز یہ سمجھاؤ کہ اِن دو مشاہدات کے درمیان صعود مستقیم میں سورج کی جو حرکت ہے اُس کو محسوب کرنے کی ضرورت کیوں نہیں ہے۔

مثال ۹ — اگر سورج کا راسی فاصلہ، نصف النہار سے قریب، ل ضہ مشاہدہ کیا جائے جبکہ اِس کا میل ضہ ہے اور اگر وقت کے ثانیوں میں اِسکا ساعتی زاویہ س ہو تو ثابت کرو کہ مقام کا عرض بلد تقریباً

$$\text{ل} - \frac{\text{جم ل جم ضہ جب}^2 \frac{1}{2}(\text{ل} + \text{ضہ})}{\text{۲ جب (ل - ضہ)}} \text{ (۱۵ س)}^2$$

ہے۔

نیز ثابت کرو کہ اگر یہ مشاہدہ ایک جہاز سے کیا جائے جو نصف النہار کے ساتھ زاویہ طہ بنانے والی سمت میں حرکت کر رہا ہے تو بڑے سے بڑا ارتفاع اس وقت واقع ہوتا ہے جبکہ سورج فوری نصف النہار سے وقت کے تقریباً ھ ثانیوں پر ہو جہاں

$$\text{ھ} = \frac{\text{جب (ضہ - فہ)}}{\text{جم فہ جم ضہ}} \left(\frac{\text{و جم طہ}}{\text{ر جب}^2 \frac{1}{2}} - \text{م} \right) \frac{1}{\text{۱۵}^2 \times \text{۶۰}^2 \times \text{جب}^2 \text{آ}}$$

جس میں و وہ طول ہے جو جہاز فی گھنٹہ طے کرتا ہے، زمین کا نصف قطر ر ہے، مقام کا عرض بلد فہ، سورج کا میل ضہ، اور میل کی تبدیلی فی گھنٹہ قوس کے ثانیوں میں م ہے۔



CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۲۲۶)

دسواں باب

سورج کی ظاہری سالانہ حرکت

دفعہ		صفحہ
۷۲	— استوا کی تحویل	۳۴۸
۷۳	— مرکز کی مساوات	۳۵۴
۷۴	— وقت کی مساوات	۳۵۸
۷۵	— وقت کی مساوات سے متعلق ضابطے	۳۶۱
۷۶	— وقت کی مساوات کی ترسیمی تعبیر	۳۶۴
۷۷	— وقت کی مقیم مساوات کی عام تحقیق	۳۷۱
۷۸	— موسموں کا سبب	۳۷۸

۷۲ — جب سورج طریق الشمس پر اپنا سالانہ دور شروع کرتا ہے تو اس کا اصلی طول بلد ۰ جو ♈ سے اس سمت میں ناپا جاتا ہے جس میں وہ حرکت کرتا ہے اگرچہ یکساں طور پر نہیں مگر مسلسل بڑھتا ہے۔ اسی طرح سورج کا صعود مستقیم ع اگرچہ یکساں طور پر نہیں مگر مسلسل بڑھتا ہے۔ سورج کے صعود مستقیم اور طول بلد کے درمیان فرق یعنے مقدار (ع - ۰) کو جو سورج کے طول بلد میں جمع کرنی ہوگی تاکہ اس کا صعود مستقیم حاصل ہو استوا کی تحویل کہتے ہیں۔ اب ہم یہ غور کریں گے کہ دوران سال میں استوا کی تحویل میں کیا تغیرات ہوتے ہیں۔ یہ مان لیا جاتا ہے کہ سورج کا

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مرکز طریق الشمس میں رہتا ہے کیونکہ یہاں اس کے چھوٹے عرض بلد کو جو اُسے کم ہے حساب میں شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

فرض کرو کہ طریق الشمس پر کے ایک نقطہ کا صعود مستقیم عہ اور میل ضہ ہے۔ اس نقطہ کا طول بلد ۵ ہے اور اگر طریق الشمس کا میلان سہ ہو تو

مس عہ = جم سہ مس ۵ ..... (۱)

اور ہم اس مساوات کو

جب (عہ − ۵) = − مس² ½ سہ جب (عہ + ۵) ..... (۲)

میں تحویل کر سکتے ہیں۔ پس ہم دیکھتے ہیں کہ عہ − ۵ کو حدود − جب⁻¹ مس² ½ سہ اور + جب⁻¹ مس² ½ سہ کے درمیان واقع ہونا چاہئے۔ یعنی اگر سہ کی بجائے اس کی اوسط قیمت بابتہ سنہ ۱۹۱۰ء ۲۳° ۲۷′ ۴″ لی جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ استواء کی تحویل۔ طہ اور + طہ کے درمیان متغیر ہوتی ہے جہاں طہ = ۲° ۲۸′ ۸″۔ ۵ کے صفر سے ۳۶۰° تک بڑھنے میں اس تحویل کے جو تغیرات واقع ہوتے ہیں ذیل کے طریقہ پر واضح کئے جا سکتے ہیں۔ (۲۲۷)

جس وقت عہ اور ۵ ایکساتھ ♈ سے چلتے ہیں جہاں وہ دونو صفر ہیں تو ۵ اولاً بڑا ہوتا ہے اور اس لیے تحویل اولاً منفی ہوتی ہے اور اقل قیمت۔ طہ پر اسوقت پہنچتی ہے جبکہ ۵ = ۴۵° + ½ طہ ہو۔ اس کے بعد صعود مستقیم طول بلد سے ملنے کے لیے بڑھنے لگتا ہے چنانچہ ۵ اور عہ ایکساتھ ۹۰° پر پہنچتے ہیں اور تحویل یہاں صفر ہوتی ہے۔ دوسرے ربع میں صعود مستقیم عہ ۵ سے بتدریج آگے بڑھنے لگتا ہے اور جبکہ عہ = ۱۳۵° + ½ طہ ہو جاتا ہے تو ۵ = ۱۳۵° − ½ طہ پر ہوتا ہے اور تحویل اپنی اعظم قیمت + طہ تک پہنچتی ہے۔ تیسرے ربع میں تحویل دوسرے اقل − طہ تک جاتی ہے جبکہ ۵ = ۲۲۵° + ½ طہ اور چوتھے ربع میں تحویل دوسرے اعظم + طہ تک پہنچتی ہے جبکہ ۵ = ۳۱۵° − ½ طہ۔ بالآخر ۵ اور عہ کی قیمتیں ۳۶۰° پر منطبق ہو جاتی ہیں جبکہ دَور پورا ہو چکتا ہے۔

استواء کی تحویل محسوب کرنے میں ہم ضابطہ (۳) کو استعمال کرتے ہیں جو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ضابطہ (۱) سے آسانی سے ماخوذ ہوتا ہے

مس (عہ - ۵) = - مس^{۲} $\frac{۱}{۲}$ سہ جب ۲۵ \ (۱ + مس^{۲} $\frac{۱}{۲}$ سہ جم ۲۵) ... (۳)

اس ضابطہ سے تحویل فوراً حاصل ہوتی ہے اگر کوئی طول بلد دیا گیا ہو۔ نیز اس میں سہولت ہے کہ (عہ - ۵) کے لیے ایک جملہ ایک سلسلہ کی شکل میں حاصل کیا جائے جو چھوٹی مقدار مس^{۲} $\frac{۱}{۲}$ سہ کی صعودی قوتوں میں ترتیب یافتہ ہو۔ یہ سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ مساوات (۱) سے ایک مشہور پھیلاؤ کے ذریعہ ماخوذ ہوتا ہے (دیکھو ٹاڈہنٹر کا علم مثلث مستوی صفحہ ۲۳۸) -

عہ - ۵ = - مس^{۲} $\frac{۱}{۲}$ سہ جب ۲۵ + $\frac{۱}{۲}$ مس^{۴} $\frac{۱}{۲}$ سہ جب ۴۵ - $\frac{۱}{۳}$ مس^{۶} $\frac{۱}{۲}$ سہ جب ۶۵

+ ..... (۴)

اس ضابطہ کی رقمیں نیم قطری زاویوں میں بیان ہوئی ہیں اس لیے اگر ہر نیم قطری زاویہ کی بجائے اس کا معادل ۲ \ ۸۶۴۰۰ = π ۱۳۷۵۱ وقت کے ثانیے رکھا جائے تو یہ ضابطہ زیادہ سہولت بخش شکل میں بیان ہو جاتا ہے۔ اگر ہم (۴) میں دئے ہوئے (عہ - ۵) کے جملہ کو ۱۳۷۵۱ سے ضرب دیں اور اگر سہ کی بجائے اس کی اوسط قیمت جو اوپر دی جا چکی ہے درج کر کے اسکی مزید تحویل کریں تو حاصل ہوتا ہے

عہ - ۵ = - ۵۹۲۱۳۸ ث جب ۲۵ + ۱۲۷۶ ث جب ۴۵ - ۱۳۶ ث جب ۶۵

..... (۵)

سلسلہ (۵) کی رقموں کے سر اس قدر سرعت سے گھٹتے ہیں کہ اس کی مندرجۂ بالا تین رقموں سے زیادہ رقموں کو محسوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالعموم آخری رقم کو بھی نظر انداز کیا جا سکتا ہے۔

اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ (۴) کی دو رقموں سے زیادہ رقمیں مطلوب نہیں ہیں تو یہ رقمیں دوسری طرح سے ضابطہ (۳) سے حاصل ہو سکتی ہیں کیونکہ گریگوری کے سلسلہ سے حاصل ہوتا ہے

(۲۲۸)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

عہ - ۰ = مس (عہ - ۰) - $\frac{1}{3}$ مس^{3} (عہ - ۰) + ...

= - جب ۲ ۰ مس^{2} $\frac{1}{2}$ سہ (۱ + جم ۲ ۰ مس^{2} $\frac{1}{2}$ سہ) + $\frac{1}{3}$ جب^{3} ۲ ۰ مس^{6} $\frac{1}{2}$ سہ$^{-1}$

اِس سے مطلوبہ جملہ حاصل ہوتا ہے جبکہ مس^{6} $\frac{1}{2}$ سہ سے چھوٹی مقداریں نظر انداز کی جائیں۔

مثال ۱ - کسی دئے ہوئے طول بلد کے لیے استواء کی تحویل حاصل کرنیکا حسب ذیل ترسیمی طریقہ ثابت کرو۔

ج کو مرکز اور ج ا = مس^{2} $\frac{1}{2}$ سہ کو نصف قطر مان کر ایک دائرہ کھینچو (شکل ۶۴) - ایک ثابت نقطہ و ایسا لو کہ ج و = ا - دائرہ پر نقطہ پ ایسا معلوم کرو کہ زاویہ و ج پ = ۲ ۰ اور فرض کرو کہ دائرہ پر پَ وہ نقطہ ہے جو پ کے متقاطر ہے - تب زاویہ پَ و ج بہ تبدیل علامت استواء کی تحویل ہے فرض کرو کہ ا اور ب وہ نقطے ہیں جن میں ج و دائرہ کو قطع کرتا ہے۔



شکل (۶۴)

ا پَ اور ب پَ کو ملاؤ - ج د، ا پَ پر عمود کھینچو اور اسے خارج کرو کہ وہ و پَ سے ع پر ملے - تب پنسل پَ (و ا ج ب) کی غیر موسیقی نسبت

و ا \ و ب = (۱ - مس^{2} $\frac{1}{2}$ سہ) \ (۱ + مس^{2} $\frac{1}{2}$ سہ) = جم سہ

ہے لیکن چونکہ ا پَ، ب پَ پر اور ج د پر عمود ہے اِس لیے وہی غیر موسیقی نسبت

ع د \ د ج = مس ع پَ د \ مس د پَ ج

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کے بھی مساوی ہے۔ اس لیے

مس ع پ د = جم سہ مس د پ ج = جم سہ مس ۰

اس لیے ع پ د = عہ، اور چونکہ ج اپ = ج پ ا = ۰ اس لیے

پ د ج = ۰ - عہ۔

مثال ۲۔ حسب ذیل عمل ثابت کرو۔ کوئی خط ا ب لو اور اس کا

مسہ ا ج ایسا قطع کرو کہ ا ج = ا ب جم سہ۔ خط ا ب کے نقطہ ا پر

عمود ا ل کھڑا کرو۔ خط ج پ کھینچو کہ وہ ا ل سے پ پر ملے اور

زاویہ ا ج پ = ۰ ۔ ب پ کو ملاؤ۔ تب زاویہ ا ب پ = عہ

اور زاویہ ب پ ج استواء کی تحویل ہے۔

مثال ۳۔ مثال ۱ سے ثابت کرو کہ تحویل کی بڑی سے بڑی قیمت (۲۲۹)

جب ا (مس ۲ ½ سہ) ہے اور اس صورت میں ا پ (مثال ۲) اس دائرہ کا

ماس ہے جو ج ب پ کا حائط ہے اور یہ کہ عہ اور ۰ متمم ہیں۔

مثال ۴۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ سورج طریق الشمس میں یکساں

طور پر حرکت کرتا ہے اور دوسرا جرم خط استواء میں اسی یکساں شرح سے حرکت

کرتا ہے تو ثابت کرو کہ ان کے صعود مستقیموں کا فرق سال میں چار دفعہ صرف

اس صورت میں معدوم ہوگا کہ راس الحمل کے نقطہ میں سے ان کے عبوروں کے

درمیان وقفہ سال کے جب ا (مس ۲ ½ سہ) / ۲۲ حصہ سے کم ہو۔

[Coll. Exam.]

فرض کرو کہ سال کی وہ کسر ہے جو ۷ سے سورج کے عبور

اور ۷ سے اس جرم کے عبور کے درمیان گذر چکی ہے جو خط استواء میں

حرکت کر رہا ہے۔

اگر ان دونوں اجسام کے صعود مستقیم عہ ہوں تو

مس (۲ ۲۲ ت + عہ) جم سہ = مس عہ

اس لیے عہ کے لیے مساوات ملتی ہے

مس عہ مس ۲ ۲۲ ت - (۱ - جم سہ) مس عہ + مس ۲ ۲۲ ت جم سہ = ۰،

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِس مساوات کی اصلیں حقیقی ہوں گی اگر

$$\frac{۲}{۲}\text{ت} < \text{جب}^{-۱}\left(\text{مس}^{۲}\frac{۱}{۲}\text{سہ}\right)$$

اس لیے مس عہ کی دو حقیقی قیمتیں ہوں گی اور عہ کی چار۔

مثال ۵ — یہ تسلیم کرکے کہ سورج کا ظاہری مدار دائری ہے ثابت کرو کہ ایک اعتدال پر اور ایک انقلاب پر نصف النہار کو عبور کرنے میں سورج کے قطر کو جو کوکبی وقت لگتے ہیں اِن میں نسبت تقریباً (۱ + جم سہ — ۰۰۲۷، جب^{۲} سہ) ہے جہاں طریق الشمس کا میلان سہ ہے۔

اگر سورج کا نصف قطر ر اور اس کا میل ضہ ہے تو اُس لمحہ پر جبکہ سورج کا اگلا کنارہ نصف النہار پر ہو اِس کے مرکز کا ساعتی زاویہ — ر قط ضہ ہے اِس لمحہ پر کوکبی وقت ت$_{۱}$ اور سورج کا صعود مستقیم عہ$_{۱}$ ہو تو

$$\text{ت}_{۱} - \text{عہ}_{۱} = - \text{ر قط ضہ}$$

اسی طرح پچھلا کنارہ نصف النہار پر ہو تو

$$\text{ت}_{۲} - \text{عہ}_{۲} = + \text{ر قط ضہ}$$

اور اس لیے $(\text{ت}_{۲} - \text{ت}_{۱}) - (\text{عہ}_{۲} - \text{عہ}_{۱}) = ۲\text{ر}$ قط ضہ

مساوات مس عہ = جم سہ مس ⊙ کو تفرق کرنے اور جم ⊙ = جم عہ جم ضہ کا لحاظ رکھنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\frac{\text{فر عہ}}{\text{فر ت}} = \text{جم سہ قط}^{۲}\text{ضہ}\ \frac{\text{فر ⊙}}{\text{فر ت}}$$

لیکن چونکہ ت ایک دن میں ۳۶۰° تک بڑھتا ہے اور ⊙ تقریباً ۳۶۵ دنوں میں اِسی قدر بڑھتا ہے اس لیے

$$\frac{\text{فر ⊙}}{\text{فر ت}} = \frac{۱}{۳۶۵} = ۰۰۲۷،۱$$

اس طرح $\frac{\text{فر عہ}}{\text{فر ت}} = ۰۰۲۷،۱ \text{ جم سہ قط}^{۲}\text{ضہ}$

اور $\text{عہ}_{۲} - \text{عہ}_{۱} = (\text{ت}_{۲} - \text{ت}_{۱})\ \text{فر عہ} \backslash \text{فر ت}$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اِس لیے $(ت_۲ - ت_۱)\{۱ - ۰.۰۲۷ \times جم سہ قط^۲ ضہ\} = ۲ \times$ قط ضہ

یا $ت_۲ - ت_۱ = ۲ \times \{جم ضہ - ۰.۰۲۷ \times جم سہ قط ضہ\}$

اعتدالوں پر ضہ = ۰ اور انقلابوں پر ضہ = ± سہ، اِس لیے اعتدال پر سورج کے قطر کو نصف النہار عبور کرنے میں جو کوئی وقت لگتا ہے اُس میں اور انقلاب پر کے کوئی وقت میں ذیل کی نسبت ہے

$(جم سہ - ۰.۰۲۷ \times جم سہ)\{۱ - ۰.۰۲۷ \times جم سہ\} = جم سہ - ۰.۰۲۷ \times جب^۲ سہ$

(۲۳۰) ۷۳ - مرکز کی مساوات -

فرض کرو کہ خط اُستواء ۷ ا اور طریق الشمس ۷ ب (شکل ۶۵) ہے جہاں سورج کا محل س ہے اور سورج کے ظاہری مدار کا قریب ارضی (Perigee) پ ہے یعنے وہ نقطہ جس پر سورج زمین سے قریب ترین ہوتا ہے -



شکل (۶۵)

نیز فرض کرو کہ ۷ پ = حہ، قریب ارضی کا طول بلد

پ س = و، سورج کی اصلی بے قاعدگی

۷ س = ۵ = حہ + و، سورج کا اصلی طول بلد

فرض کرو کہ پورے سال کے لیے اُس ظاہری زاویہ کی اوسط قیمت ن ہے جو زمین کے مرکز سے سورج کے مرکز تک کھینچا ہوا سمتی وتر روزانہ عبور کرتا ہے - سورج کا اوسط طول بلد ل = ن ت + صہ سے بیان ہوتا ہے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جہاں ت، دونوں میں وقت ہے اور صہ اوسط طول بلد کی قیمت ہے اُس آن پر جہاں سے وقت کی پیمائش ہوئی ہے۔ سورج کی اوسط بے قاعدگی ل۔ حہ ہے اور اس کے جواب میں اصلی بے قاعدگی ٥۔ حہ ہے۔

دفعہ ۵۲ میں ہم وہ رشتہ معلوم کر چکے ہیں جو ایک ناقصی مدار میں اصلی بے قاعدگی اور اوسط بے قاعدگی کے درمیان ہوتا ہے۔ محولہ بالا دفعہ کے ضابطہ میں و کی بجائے ٥۔ حہ اور ط کی بجائے ل۔ حہ درج کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$٥ = ل + (٢ز - \frac{١}{٢}ز^{٣}) جب (ل - حہ) + \frac{٥}{٤} ز^{٢} جب (٢ل - ٢حہ)$$
$$+ \frac{١٣}{١٢} ز^{٣} جب (٣ل - ٣حہ) \ldots (١)$$

جہاں ز زمین کے مدار کا خروج المرکز ہے۔

وہ رقمیں جن میں ز^{٣} شامل ہے اسقدر چھوٹی ہیں کہ اکثر مقاصد میں اِن کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم انہیں حسب سابق نظر انداز کریں گے اور صرف یہ لکھیں گے

$$٥ = ل + ٢ز جب (ل - حہ) + \frac{٥}{٤} ز^{٢} جب (٢ل - ٢حہ) \ldots (٢)$$

پس ہمیں سورج کے اوسط طول بلد کی رقوم میں اِس کے اصلی طول بلد کے لیے ایک جملہ حاصل ہو گیا۔

(۲۳۱) اِس سلسلہ کو الٹانے سے اور ز کی دوسری سے اعلیٰ قوتوں کو ترک کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$ل = ٥ - ٢ز جب (٥ - حہ) + \frac{٣}{٤} ز^{٢} جب (٢٥ - ٢حہ) \ldots (٣)$$

اِس سے سورج کا اوسط طول بلد اس کے اصلی طول بلد کی رقوم میں معلوم ہوتا ہے۔

اب ز اور حہ کی عددی قیمتوں کا جاننا ضروری ہے اور ہم دکھائینگے کہ سورج کے صعود مستقیم کے مسلسل مشاہدات سے یہ مقداریں کس طرح معلوم ہو سکتی ہیں۔ یہ ضابطہ (٢) کے ذریعہ کیا جاتا ہے۔ اِس ضابطہ کو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہم لا = زجم حہ، ما = زجب حہ، ل = ن ت + صہ رکھ کر مستحیل کرینگے۔
اولاً بہت چھوٹی مقدار ز^{۲} کو نظر انداز کرنے سے تقریبی ضابطہ

ن ت + صہ = ۵ − ۲ لاجب ۵ + ۲ ما جم ۵، ..... (۴)

حاصل ہوتا ہے۔ اِس مساوات میں چار نامعلوم مقداریں ن، صہ، لا، ما ہیں۔ انہیں معلوم کرنے کے لیے فرض کرو کہ چند اوقات ت$_{۱}$، ت$_{۲}$، ت$_{۳}$، ت$_{۴}$، .... پر سورج کے صعود مستقیم کے مشاہدات سے اس کے طول بلد ۵$_{۱}$، ۵$_{۲}$، ۵$_{۳}$، ۵$_{۴}$، ... کا ایک سلسلہ محسوب کر لیا گیا ہے۔ اِن میں کی ہر مقدار سے اوسط شمسی ایام کی وہ تعداد تعبیر ہوتی ہے جو ایک آن سے جہاں سے وقت کی پیمائش شروع ہوئی ہے گذر چکی ہے۔ ۵ کی ہر قیمت اور اس کے جواب میں ت کی قیمت ضابطہ (۴) میں درج کی جائے تو ن، صہ، لا، ما میں ایک خطی مساوات ملے گی۔ ایسی چار مساواتوں سے اِن چار مقداروں کی تعیین ہو جانی چاہیئے اگرچہ مزید صحت کے لیے نتیجہ کی بنیاد بہت سے مشاہدات پر جو متعدد سالوں پر پھیلے ہوئے ہوں رکھنی چاہیئے۔ پس لا اور ما اور اس لیے ز اور حہ تقریباً معلوم ہو جاتے ہیں۔ اِن کے ساتھ ہی ن اور صہ معلوم ہوتے ہیں اور اوسط طول بلد کا جملہ متعین ہو جاتا ہے۔ اب ہم مساوات (۳) کی اُس رقم میں جس میں ز^{۲} ہے ز اور حہ کی تقریبی قیمتیں درج کرتے ہیں کیونکہ یہ رقم بہت چھوٹی ہے اور اِس لیے اِس کی قیمت میں کوئی قابل قدر خطا واقع نہیں ہوگی اگرچہ ز اور حہ بالکل صحیح نہ ہوں۔ اس طرح ن، صہ، لا، ما کے درمیان ایک صحیح تر خطی مساوات حاصل ہوتی ہے اور ہر مشاہدے سے ایسی ایک مساوات ملے گی۔ اس طریقہ سے ز اور حہ کو حسب خواہش پوری صحت کے ساتھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔

شمسی سال کا طول ۳۶۰ ن دن ہے اور بلاشبہ اگر ہم اس امر میں آزاد ہوتے کہ شمسی سال کو ۳۶۵ ۲۴۲۲ دنوں کا مان لیں (جیسا کہ ہم نے اکثر کیا ہے) تو ہم ن کو نامعلوم مقدار کے طور پر بیان نہ کرتے۔ لیکن یہاں یہ یاد دلانا ضروری ہے کہ ویسی ہی تحقیق سے جیسی کہ اوپر دی گئی ہے شمسی سال کی خود یہ قیمت

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

(۲۳۲) حاصل کیجا چکی ہے اور اس لیے مساواتوں کے نظام سے ن معلوم کر لینے کے بعد ۳۶۰/ن حاصل ہوتا ہے۔ مقدار صہ زیر بحث آن پر سورج کا اوسط طول بلد ہے۔ پس ہمیں ل کے لیے وہ ضابطہ حاصل ہوتا ہے جو ایک زیادہ ابتدائی طریقہ سے قبل ازیں معلوم کیا جا چکا ہے، دفعہ ۶۰ مثال ۴۔

اب صرف یہ رہ گیا ہے کہ مساواتوں (۲) اور (۳) کی عددی شکلیں زمین کے مدار کے خروج المرکز ز اور حہ کی اصلی قیمتیں درج کر کے معلوم کی جائیں۔ یہ قیمتیں سنہ ۱۹۰۰ء کے لیے حسب ذیل ہیں

ز = ۰٫۰۱۶۷۵، حہ = ۲۸۱° ۱۳′

اور اگرچہ اُن خللوں کی باعث جن کا سبب دوسرے سیارے ہیں یہ مقداریں ٹھیک ٹھیک مستقل نہیں ہیں تاہم سال بہ سال ان کی تبدیلیاں اسقدر خفیف ہوتی ہیں کہ ہمارے موجودہ مقصد کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتیں۔ اِن قیمتوں کو درج کرنے اور ایک نیم قطری زاویہ کی بجائے ۳۴۳۸′ رکھنے سے حاصل ہوتا ہے

ہ = ل + ۲٫۱۵′ جب (ل - ۲٫۲۸۱°) + ۲٫۲′ جب (۲ل - ۴٫۲۰۲°) .. (۵)

ل = ہ - ۲٫۱۵′ جب (ہ - ۲٫۲۸۱°) + ۰٫۰۷′ جب (۲ہ - ۴٫۲۰۲°) .. (۶)

پس ہم حسب ذیل تقریبی بیانات دے سکتے ہیں:-

کسی آن پر سورج کا اصلی طول بلد ہ، اُسی آن پر اس کے اوسط طول بلد ل میں وہ مقدار جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے جس کی تعریف مرکز کی مساوات کے طور پر دفعہ ۵۲ میں کیجا چکی ہے اور جس کے لیے اب ہم نے یہ جملہ

۱۵′ جب (ل - ۲۸۱°)

حاصل کیا ہے۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کسی آن پر سورج کا اوسط طول بلد ل، اسی آن پر سورج کے اصلی طول بلد ⊙ میں مقدار

$$-١١٥'' \text{ جب } (⊙ - ٢٨١^\circ)$$

جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔

مثال ۱۔ ثابت کرو کہ مرکز کی مساوات کبھی صفر نہیں ہوتی اِلّا آنکہ سورج اوجین میں سے ایک پر ہو۔

*مثال ۲۔ ثابت کرو کہ اگر قوس کے ثانیوں کو بھی ملحوظ رکھا جائے تو ضابطہ (۵) ہو جاتا ہے

$$⊙ = ل + ١٣٤٤'' \text{ جب } ل + ٦٧٧٨'' \text{ جم } ل - ٦٧'' \text{ جب } ٢ل + ٢٨'' \text{ جم } ٢ل$$

۷۴۔ وقت کی مساوات

اب ہم سورج کے صعود مستقیم ع کو اس کے اوسط طول بلد ل کی رقوم میں بیان کر سکتے ہیں۔ کیونکہ اگر سورج کا اصلی طول بلد ⊙ ہو تو دفعات ۷۲ اور ۷۳ سے

$$ع = ⊙ - \text{مس}^2 \tfrac{1}{2} \text{ سہ جب } ٢⊙ + \tfrac{1}{2} \text{ مس}^4 \tfrac{1}{2} \text{ سہ جب } ٤⊙$$

$$⊙ = ل + ٢ز \text{ جب } (ل - حہ) + \tfrac{5}{4} ز^2 \text{ جب } (٢ل - ٢حہ)$$

ع کے اُس جملہ میں جو ل کی رقوم میں حاصل ہوتا ہے متعدد رقمیں (۲۳۳)
چھوٹے سروں کے ساتھ شامل ہوتی ہیں۔ ضابطوں میں ایسی رقموں کا رکھنا ضروری نہیں ہے جو اسقدر چھوٹی ہوں کہ ان سے کوئی قابل قدر اثر پیدا نہیں ہوتا اس لیے ہم ز اور مس $^2 \frac{1}{2}$ سہ کی کوئی وہ قوت یا قوتوں کا حاصل ضرب نہیں رکھیں گے جو $\frac{1}{١٠٠٠}$ سے کم ہو۔ یہ شرط مس $^2 \frac{1}{2}$ سہ $= \frac{1}{٢٣٫٢١١}$، ز $= \frac{1}{٥٩٫٧٠١}$ مس $^4 \frac{1}{2}$ سہ $= \frac{1}{٥٣٨٫٨١}$، ز مس $^2 \frac{1}{2}$ سہ $= \frac{1}{١٣٨٥}$، اور ز $^2 = \frac{1}{٣٥٦٤}$ کے سوا باقی سب کو خارج

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کرتی ہے۔

⊙ کو ساقط کرنے سے حاصل ہوتا ہے

$$\text{ع} = \text{ل} + ۲\,\text{ز}\,\text{جب}\,(\text{ل} - \text{ح}) + \frac{۵}{۴}\,\text{ز}^۲\,\text{جب}\,۲\,(\text{ل} - \text{ح})$$

$$- \text{مس}^۲\,\frac{۱}{۲}\,\text{سہ}\,\{\text{جب}\,۲\,\text{ل} + ۴\,\text{ز}\,\text{جب}\,(\text{ل} - \text{ح})\,\text{جم}\,۲\,\text{ل}\} + \frac{۱}{۲}\,\text{امس}^۴\,\frac{۱}{۲}\,\text{سہ}\,\text{جب}\,۴\,\text{ل}$$

اِسے لکھ سکتے ہیں

$$\text{ع} = \text{ل} + ۲\,\text{ز}\,\text{جب}\,(\text{ل} - \text{ح}) - \text{مس}^۲\,\frac{۱}{۲}\,\text{سہ}\,\text{جب}\,۲\,\text{ل} + ۲\,\text{ز}\,\text{مس}^۲\,\frac{۱}{۲}\,\text{سہ}\,\text{جب}\,(\text{ل} + \text{ح})$$

$$+ \frac{۵}{۴}\,\text{ز}^۲\,\text{جب}\,۲\,(\text{ل} - \text{ح}) - ۲\,\text{ز}\,\text{مس}^۲\,\frac{۱}{۲}\,\text{سہ}\,\text{جب}\,(۳\,\text{ل} - \text{ح}) + \frac{۱}{۲}\,\text{امس}^۴\,\frac{۱}{۲}\,\text{سہ}\,\text{جب}\,۴\,\text{ل}$$

چونکہ مقداریں ز^۲، ز مس$^۲\,\frac{۱}{۲}$ سہ اور مس$^۴\,\frac{۱}{۲}$ سہ بہت چھوٹی ہیں اِس لیے جملہ (ع - ل) کی پہلی دو رقمیں بہت ہی اہم ہیں اور دوسری ارقام زیر بحث مقصد کے لیے نظر انداز کی جا سکتی ہیں، اس لیے

$$\text{ع} = \text{ل} + \text{و}$$

جہاں $\text{و} = ۲\,\text{ز}\,\text{جب}\,(\text{ل} - \text{ح}) - \text{مس}^۲\,\frac{۱}{۲}\,\text{سہ}\,\text{جب}\,۲\,\text{ل}$

مقدار و کو وقت کی مساوات کہتے ہیں۔ یہ مقدار سورج کے اوسط طول بلد میں جمع کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کا صعود مستقیم حاصل ہو۔

و کو یہاں نیم قطری زاویوں میں بیان کیا گیا ہے۔ ہم اِس کو وقت میں ۲۱۲ نیم قطری زاوئے فی ۲۴ گھنٹہ کی شرح سے تحویل کرتے ہیں اور اس لیے گھنٹوں میں وقت کی مساوات حاصل ہوتی ہے

$$\frac{۱۲}{۲۱۱}\{۲\,\text{ز}\,\text{جب}\,(\text{ل} - \text{ح}) - \text{مس}^۲\,\frac{۱}{۲}\,\text{سہ}\,\text{جب}\,۲\,\text{ل}\}$$

یا وقت کے ثانیوں میں

$$۱۳۷۵۱\{۲\,\text{ز}\,\text{جب}\,(\text{ل} - \text{ح}) - \text{مس}^۲\,\frac{۱}{۲}\,\text{سہ}\,\text{جب}\,۲\,\text{ل}\}$$

اگر اس میں ز = ۰٫۰۱۶۷۵، ح = ۲۸۱°۲٫ رکھا جائے تو تقریبی نتیجہ

$$\text{ع} = \text{ل} + ۹۰^{\text{ث}}\,\text{جب}\,\text{ل} + ۴۵۲^{\text{ث}}\,\text{جم}\,\text{ل} - ۵۹۲^{\text{ث}}\,\text{جب}\,۲\,\text{ل}$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

حاصل ہوتا ہے جو اس بیان کے مماثل ہے کہ وقت کی مساوات

$$و = ۹۰^{ث} جب ل + ۵۲۴^{ث} جم ل - ۵۹۲^{ث} جب ۲ل \quad ....(۱)$$

ہے جبکہ چھوٹی رقمیں ترک کی جائیں۔

کسی کوکبی وقت تہ پر اصلی سورج کا ساعتی زاویہ تہ - عہ ہے یا

ظاہری شمسی وقت = تہ - عہ

اسی آن اوسط سورج کا ساعتی زاویہ تہ - ل کے مساوی ہے یا

اوسط شمسی وقت = تہ - ل = (تہ - عہ) + (عہ - ل)

پس وقت کی مساوات وہ تصحیح ہے جو اوسط شمسی وقت معلوم (۲۳۴)
کرنے کے لیے ظاہری شمسی وقت میں جبریہ طور پر جمع کرنی پڑتی ہے۔

مثال ۱ ۔ بتاریخ ۲۷ دسمبر سنہ ۱۹۱۱ء اوسط ظہر پر وقت کی مساوات تقریباً معلوم کرو، یہ دیا گیا ہے کہ سورج کا اوسط طول بلد اس وقت ۲۷۵° ہے۔

(۱) میں ابدال سے و = + ۵۳^{ث} حاصل ہوتا ہے۔ وہ سب رقمیں جواب نظر انداز کی گئی ہیں محسوب کی جائیں تو ۵۲٫۸۱^{ث} حاصل ہوگا جیسا کہ ایفیمرس میں دیا گیا ہے۔ پس اصلی سورج کا صعود مستقیم عہ، ل سے ۵۳^{ث} بڑا ہے جو اوسط سورج کا صعود مستقیم ہے۔ ظاہری ظہر پر نصف النہار سے اوسط سورج کو گزرے ۵۳^{ث} ہو چکے ہیں، اس لیے اوسط وقت حاصل کرنے کے لیے ظاہری وقت میں ۵۳^{ث} جمع کرنے چاہئیں۔

مثال ۲ ۔ ثابت کرو کہ وقت کی مساوات اعتدال ربیع پر تقریباً

$\frac{۱}{۲}$ ^م ہے اور اعتدال خریف پر تقریباً - $\frac{۱}{۲}$ ^م۔

مثال ۳ ۔ بتاریخ یکم نومبر سنہ ۱۹۰۲ء ظاہری ظہر پر سورج کا اصلی صعود مستقیم معلوم کرو، یہ دیا گیا ہے کہ اس دن اوسط ظہر پر وقت کی مساوات - ۱۶^م ۱۸^ث ہے اور بتاریخ ۱۴ جون اوسط ظہر کا کوکبی وقت ۵^گ ۲۷^م ۲۳^ث ہے۔ (ایک شمسی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

سال کو ۳۶۵ ایام کا لیا جائے) —
(Oxford Second Public Exam. 1902.

مثال ۴ — ثابت کرو کہ انقلاب گرما پر وقت کی مساوات میں تقریباً ۵۳ ثانیہ فی گھنٹہ کا اضافہ ہوتا ہے، یہ مان لیا گیا ہے کہ اوسط سورج کی یومی حرکت قوس میں ۵۹ ۸ ۴۳ ہے —

(۱) سے وقت کی مساوات ملتی ہے ۹۰° جب ل + ۴ش ۵۲ جم ل − ۵ش ۹۲ جب ۲ ل — اگر ل میں مف ل کی ایک چھوٹی تبدیلی ہو تو اس میں

(۹۰° جم ل − ۴ش ۵۲ جب ل − ۱۱ش ۸۴ جم ۲ ل) مف ل

کا اضافہ ہوتا ہے — ایک گھنٹہ میں مف ل = ۱۵° ۴۷′ یا نیم قطریوں میں ۰٫۰۰۱۷۱ — اس لیے وقت کی مساوات میں فی گھنٹہ تبدیلی ہے

مف و = ۰٫۰۱۰۶۴ ش جم ل − ۰٫۰۱۳۲۴ ش جب ل − ۰٫۰۰۸۴۹ ش جم ۲ ل

خصوصی صورت میں فرض کرو کہ ل = ۹۰° تو مف و = ۰٫۰۵۲۵ ش

مثال ۵ — ثابت کرو کہ وقت کی مساوات کی بڑی سے بڑی قیمت جو خروج المرکز سے پیدا ہوتی ہے ۲۴ ز / ۲۱ گھنٹے ہے —

۷۵ — وقت کی مساوات سے متعلق ضابطے —

اُن مختلف ضابطوں کو جو وقت کی مساوات سے متعلق ہیں اکٹھا کرنا سہولت بخش ہے — فرض کرو کہ مُشاہد طول بلد ل (گرینج کے مغرب) ۲۲۵ میں ہے اور کسی خاص آن پر وہ ظاہری شمسی وقت کا مشاہدہ کرتا ہے جسب ذیل ترقیم استعمال کی جائے گی :—

ھ، سورج کا صعود مستقیم مُشاہدہ کی آن پر،
ظ، ظاہری وقت " " " "

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ت ، مقامی اوسط وقت مشاہدہ کی آن پر ،
تہ ، مقامی کوکبی وقت ،، ،،
و ، وقت کی مساوات ،، ،،
و ، وقت کی مساوات سابق گ ۔ ا ۔ ظ (گرینوچ اوسط ظہر) پر ،
و ، ،، ،، آئندہ ،، ،، ،،
م ، گرینوچ کوکبی وقت ہے سابق ،، ،، ،،
م ، ،، ،، آئندہ ،، ،، ،،

و کی تعریف (دیکھو صفحہ ۳۰۶) سے

ت = ظ + و ، ..... (۱)

مشاہدے کی آن پر گ ۔ ا ۔ و (گرینوچ اوسط وقت)

ظ + و + ل ہے اور یہ فرض کرنے سے کہ و یکساں طور پر بدلتا ہے ہمیں حاصل ہوتا ہے

و = و + (ظ + و + ل)(و - و) / ۲۴ گ ، ..... (۲)

نیز عہ = تہ - ظ ، ..... (۳)

جب گرینوچ اوسط وقت ت + ل ہو تو گرینوچ کوکبی وقت تہ + ل ہے اس لیے گذشتہ گرینوچ اوسط ظہر سے کوکبی وقفہ تہ + ل م ہے اور یہ کوکبی وقفہ اوسط وقت میں جزو ضربی ۲۴ گ / (۲۴ گ + م - م) کے ذریعہ تبدیل ہوتا ہے

اس لیے مساوات ملتی ہے

ت + ل = ۲۴ گ (تہ + ل - م) / (۲۴ گ + م - م)

جس سے ہم حاصل کرتے ہیں

ت = تہ - م - (م - م)(تہ - م + ل) / (۲۴ گ + م - م) ، ..(۴)

مساواتوں (۱) ، (۲) ، (۳) ، (۴) سے جن میں چھ مقداریں عہ ، ظ ، ت ، تہ ، و ، ل آتی ہیں ہم کوئی چار معلوم کر سکتے ہیں جبکہ دو دوسری دیگئی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہوں ۔ یہ مان لیا گیا ہے کہ ایفیمرس سے محصلہ مقداریں و، و، مہ، م، اس دن کے لیے مستقل ہیں ۔

مثال ۱ ۔ ثابت کرو کہ کسی مقام پر کسی آن کو کبھی وقت تہ، اوسط وقت ت، سورج کا صعود مستقیم ع، اور وقت کی مساوات و میں حسب ذیل رشتہ ہوتا ہے :۔

$$\text{تہ} - \text{ع} + \text{و} - \text{ت} = ۰$$

مثال ۲ ۔ اگر گرینوچ اوسط وقت ت ہو اور گذشتہ اور آئندہ گرینوچ اوسط ظہروں پر کوکبی ادقات اور وقت کی مساواتیں مہ، م، و، و، ہوں اور اگر مشاہدہ کردہ ظاہری شمسی وقت ظ ہو تو طول بلد معلوم کرو اور ثابت کرو کہ مقامی کوکبی وقت ہے

$$\text{مہ} + \text{و} + \text{ت}(\text{م} + \text{و}_۱ - \text{مہ} - \text{و}) \Big| ۲۴_{\text{گ}} + \text{ظ}$$

[Coll. Exam.]

(۲۳۶) مثال ۳ ۔ اگر مقام گرینوچ اوسط وقت کے ت اور تَ گھنٹوں پر سورج کے ساعتی زاوئے ع، عَ (درجوں میں) ہوں تو ثابت کرو کہ گذشتہ اور آئندہ اوسط ظہروں پر وقت کی مساواتیں ایک گھنٹہ کی کسروں میں علی الترتیب حسب ذیل ہیں :۔

$$\frac{\text{عَ ت} - \text{ع تَ}}{۱۵(\text{تَ} - \text{ت})} \quad , \quad ۲۴ + \frac{\text{عَ}(۲۴ - \text{ت}) - \text{ع}(۲۴ - \text{تَ})}{۱۵(\text{تَ} - \text{ت})}$$

[Math. Trip.]

مثال ۴ ۔ مساوات (۲) سے ثابت کرو کہ

$$\text{و} = ۲۴_{\text{گ}}\, \text{و}_۱ \Big| (۲۴_{\text{گ}} + \text{و} - \text{و}_۱) + (\text{ظ} + \text{ل})(\text{و} - \text{و}_۱) \Big| (۲۴_{\text{گ}} + \text{و}_۱ - \text{و})$$

اور صفحہ ماسبق پر دیے ہوئے ضابطوں سے ثابت کرو کہ گرینوچ پر متناظر اوسط وقت

$$۲۴_{\text{گ}}\, (\text{ظ} + \text{و} + \text{ل}) \Big| (۲۴_{\text{گ}} + \text{و}_۱ - \text{و})$$

ہے ۔

[Math. Trip.]

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

مثال ۵ — نیویارک (طول بلد ۳ ؁ ۵۸ ؁ ۴ ؁ ۱۶ ؁ غ) پر بتاریخ یکم اکتوبر بوقت ظاہری ظہر گوگبی وقت معلوم کرو، یہ دیا گیا ہے کہ گرینوچ اوسط ظہر پر بتاریخ یکم و دوم اکتوبر وقت کی مساوات کی عددی قیمتیں علی الترتیب ۱۰ ؁ ۲۸ ؁ ۲۳ ؁ اور ۱۳ ؁ ۲۸ ؁ ۴۲ ؁ ہیں اور ان دنوں میں گرینوچ اوسط ظہر پر گوگبی اوقات علی الترتیب ۱۲ گ ۴۰ م ۶۲ ؁ ۵۷ ؁ اور ۱۲ گ ۴۴ م ۱۷ ؁ ۵۴ ؁ ہیں۔

[Math. Trip.]

مثال ۶ — بتاریخ ۱۵ ؁ اور ۱۶ ؁ اپریل ۱۸۹۵ ؁ء گرینوچ اوسط ظہر پر وقت کی مساوات ۷ ؁ ۵۱ ؁ اور ۹ ؁ ۱۳ ؁ ہے جن کو علی الترتیب اوسط وقت میں سے تفریق اور اس میں جمع کرنا ہے۔ سورج کا ظاہری ساعتی زاویہ ایک مقام پر جو گرینوچ سے ۴ ؁ مشرق میں ہے بتاریخ ۱۶ ؁ اپریل مقامی اوسط وقت ۱۱ گ ۵۸ م پر معلوم کرو۔

[Coll. Exam.]

۶۷ — وقت کی مساوات کی ترسیمی تعبیر۔

دفعہ ۴۷ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وقت کی مساوات و کو اوسط شمسی وقت کے گھنٹوں میں بیان کیا جائے تو وہ کافی تقریب تک

$$و \equiv ۱۲ \pi^{-۱} \{ ۲ \text{ زجب } (ل - حہ) - \text{مس}^{۲} \tfrac{۱}{۲} \text{ سہ جب } ۲ ل \}$$

حاصل ہوتی ہے۔ اس جملہ میں حسب ذیل تقریبی اندراجات

$$\text{مس}^{۲} \tfrac{۱}{۲} \text{ سہ} = ۱ \backslash ۲ ؁ ۲۳ ؁ ،\ \text{زہ} = ۱ \backslash ۷ ؁ ۵۹ ؁ ،\ \text{حہ} \equiv ۳۶۰° - ۷۹°$$

کرنے سے تحویل کے بعد (یا راست ضابطہ (۱) سے صفحہ ۳۶۰) حاصل ہوتا ہے

$$و \equiv ۱۲۸ ؁ ۰ \text{ گ جب } (ل + ۷۹°) - ۱۶۵ ؁ ۰ \text{ گ جب } ۲ ل$$

$$\equiv ۶۸ ؁ ۷ \text{ م جب } (ل + ۷۹°) - ۹۰ ؁ ۹ \text{ م جب } ۲ ل$$

اب ہم وہ دو منحنی مرتسم کرتے ہیں (شکل ۶۶) جن کی مساواتیں

$$ما = ۶۸ ؁ ۷ \text{ م جب } (ل + ۷۹°) \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (۱)$$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اور ما = ۹۰° + ۹ جب ۲ ل ..... (۲)

ہیں۔ شکل میں ل کو فصلہ کے طور پر لیا گیا ہے اور معین مثبت یا منفی لیے گئے ہیں جیسا کہ بائیں جانب کے اُس کھڑے خط سے ظاہر ہے جس پر پیمانہ درج ہے۔ صفر سے لیکر ۳۶۰° تک ہر طول بلد کے لیے یہ منحنی مرتسم کیے جاتے ہیں (۲۳۷) اور اس لیے یہ ایک سال کے اعتدال ربیع سے دوسرے سال کے اعتدال ربیع تک کارآمد ہیں۔ شکل بغیر کسی قابل قدر تغیر و تبدل کے سالہا سال تک استعمال کی جا سکتی ہے۔



شکل (۶۶)

منحنیوں کا استعمال اِس واقعہ پر مبنی ہوتا ہے کہ وقت کی مساوات = منحنی (۱) کا معین - منحنی (۲) کا معین

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

معمولی قرارداد کی بموجب یہاں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ افقی محور کے اوپر معین مثبت ہیں اور اس کے نیچے منفی۔

مثلاً ۲۲ مئی کو وقت کی مساوات ق، پ ہے اور منفی ہے۔ ۲۲ جولائی کو وقت کی مساوات ق، پ ہے اور مثبت ہے۔ ۲۲ اکتوبر کو وہ ق، پ ہے اور منفی، ۲۲ جنوری کو ق، پ ہے اور مثبت۔

اس طریقہ پر منحنیوں (۱) اور (۲) کے معینوں کا فرق اس کی مناسب علامت کے ساتھ لیکر اسے معین قرار دیں تو شکل ۶۶ کا وہ مسلسل منحنی حاصل ہوتا ہے جس کے معین، وقت کی مساوات کو سال کے ہر دن کے لیے تعبیر کرتے ہیں۔

(۲۳۸) شکل (۶۶) میں چار مقامات ایسے ہیں جن پر منحنی (۱) اور (۲) متقاطع ہوتے ہیں اور اس لیے ان مقامات پر وقت کی مساوات صفر ہے۔ پس یہ معلوم ہوا کہ وقت کی مساوات سال میں چار دفعہ معدوم ہوتی ہے اور مسلسل منحنی افقی محور کو چار نقطوں پر قطع کرتا ہے جن سے متناظر تاریخیں معلوم ہوتی ہیں۔

یہ امر کہ وقت کی مساوات سال میں کم از کم چار دفعہ معدوم ہونی چاہئے دوسرے طریقہ سے بھی ثابت کیا جا سکتا ہے۔ ہم فرض کریں گے کہ ت، وقت کی مساوات کا وہ حصہ ہے جو طریق الشمس کے میلان کی وجہ سے ہے اور تَ وہ حصہ ہے جو خروج المرکز کی وجہ سے ہے۔ فرض کرو کہ بلا لحاظ علامت ت کی بڑی سے بڑی قیمت ک ہے، تب ک، تَ کی کسی قیمت سے بڑا ہے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ ک کی قیمت ۹۰، ۹ ہے اور تَ، ۶۸، ۷ سے بڑا نہیں ہو سکتا۔

اعتدال ربیع سے انقلاب گرما تک ت منفی ہونا چاہئے کیونکہ جہاں تک کہ میلان کی وجہ سے نامساویت پیدا ہوتی ہے اوسط سورج کا صعود مستقیم اصل سورج کے صعود مستقیم سے بڑا ہوتا ہے۔ اس لیے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اوسط سورج نصف النہار کو اصلی سورج کے بعد عبور کرتا ہے اور اس لیے اوسط وقت معلوم کرنے کے لیے ظاہری وقت میں عمل تفریق کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح کے استدلال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انقلاب گرما سے اعتدال خریف تک ت مثبت ہے، اعتدال خریف سے انقلاب سرما تک ت منفی ہے، اور انقلاب سرما سے اعتدال ربیع تک ت مثبت ہے۔ دونوں اعتدال اور دونوں انقلابوں پر ت صفر ہے۔ وقت کی مساوات کے اس حصہ کے متعلق جو خروج المرکز کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بعید ارضی (Apogee) اور قریب ارضی (Perigee) دونوں پر تَ صفر ہے اور چونکہ قریب ارضی سے بعید ارضی تک اصلی سورج اپنے اوسط مقام سے آگے رہتا ہے اس لیے تَ کی قیمت مسلسل مثبت ہونی چاہیئے اسی طرح بعید ارضی سے قریب ارضی تک تمام راستہ پر تَ منفی ہونا چاہیئے

فرض کرو کہ قریب ارضی اور بعید ارضی علی الترتیب ح، ۷ (شکل ۶۷) ہیں، انقلاب گرما اور سرما پر سورج کے محل گ، س ہیں اور اعتدالی نقطے ۷، ≏ ہیں۔

فرض کرو کہ م وہ نقطہ ہے جہاں سورج اس آن رہتا ہے جبکہ ت (جو ۷ پر اور گ پر صفر ہے) اپنی بڑی سے بڑی منفی قیمت رکھتا ہے۔ اب چونکہ وقت کی مساوات و، ت + تَ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ح سے ۷ تک و کی قیمت مسلسل مثبت ہونی چاہیئے کیونکہ ت اور تَ دونوں مثبت ہیں۔

نقطہ م پر و = تَ۔ ت اور چونکہ تَ کبھی بھی ک کے مساوی نہیں ہو سکتا اس لیے م پر و کو منفی ہونا چاہیئے۔ اب چونکہ و، ۷ پر مثبت ہے، م پر منفی اور پھر گ پر مثبت اس لیے ۷ اور م کے درمیان کوئی ایک نقطہ، اور م اور گ کے درمیان ایک دوسرا نقطہ ہونا چاہیئے جہاں و = ۰۔ پس وقت کی مساوات، اعتدال ربیع اور انقلاب گرما کے درمیان کم از کم دو مرتبہ صفر ہونی چاہیئے۔ (۲۳۹)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

گ سے ا تک ت اور ت دونوں مثبت ہیں اور اس لیے انقلاب گرما سے بعید ارضی تک و مسلسل مثبت ہوتا ہے۔ لیکن ا سے ♎ تک ت منفی ہے اور چونکہ ♎ پر ت صفر ہے اور ت اب بھی منفی ہے اس لیے و، ♎ پر منفی اور ا پر مثبت ہونا چاہیئے۔ پس یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ و، ا اور ♎ کے درمیان کسی ایک نقطہ پر صفر ہونا چاہیئے اور اس طرح وقت کی مساوات کم از کم پھر ایک مرتبہ بعید ارضی اور اعتدال خریف کے درمیان صفر ہونی چاہیئے۔



شکل (۶۷)

♎ سے س تک ت اور ت مسلسل منفی ہیں اور اس لیے وقت کی مساوات مدار کے ان نقطوں پر معدوم نہیں ہو سکتی۔ ح پر و پھر مثبت ہو جاتا ہے اور اس لیے وہ، س اور ح کے درمیان کم از کم ایک مرتبہ صفر ہونا چاہیئے۔

پس معلوم ہوا کہ وقت کی مساوات، اعتدال ربیع اور انقلاب گرما کے درمیان کم از کم دو مرتبہ صفر ہونی چاہیئے، بعید ارضی اور اعتدال خریف کے درمیان کم از کم ایک مرتبہ اور انقلاب گرما اور قریب ارضی کے درمیان کم از کم ایک مرتبہ۔

مثال ۱۔ اگر ہم لاکو سورج کے اوسط طول بلد ل کا نام سمجھیں تو

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

بتاؤ کہ وہ دن جن میں وقت کی مساوات صفر ہوتی ہے منحنی ما = لا (۱ + لا^{۲})$^{-\frac{۱}{۲}}$ اور ایک خط مستقیم کے نقاط تقاطع سے ترسیمی طور پر معلوم کیے جا سکتے ہیں، اور اگر اس خط کی مساوات

ما = ۰٫۰۷ لا + ۰٫۳۸

ہو تو زیر بحث ایام کی تخمین تقریبی طور پر کرو۔

مساوات مس^{۲} $\frac{۱}{۲}$ سہ جب ۲ ل = ۲ ز جب (ل - حہ) میں مس ل = لا رکھو تو لا میں محصلہ مساوات صریحاً ان دو مساواتوں

ما = ز لا جم حہ مم^{۲} $\frac{۱}{۲}$ سہ - ز جب حہ مم^{۲} $\frac{۱}{۲}$ سہ،

ما = لا (۱ + لا^{۲})$^{-\frac{۱}{۲}}$

سے ما کو ساقط کرنے کا نتیجہ ہے۔

مثال ۲ — یہ بتایا جا چکا ہے کہ وقت کی مساوات ثانیوں میں

۹۰ جب ل + ۴۵۲ جم ل - ۵۹۲ جب ۲ ل

ہے جہاں ل، سورج کا اوسط طول بلد ہے۔ اس جملہ سے ثابت کرو کہ وقت (۲۴۰)
کی مساوات سال میں کم از کم چار دفعہ معدوم ہوتی ہے۔

اگر ہم اس جملہ میں ل کی بجائے ۰°، ۴۵° کے بعد دیگرے رکھیں تو اسکی علامت مثبت سے منفی میں تبدیل ہوتی ہے، اس لیے ۰° اور ۴۵° کے درمیان ل کی ایک ایسی قیمت ہونی چاہیئے جو مساوات

۹۰ جب ل + ۴۵۲ جم ل - ۵۹۲ جب ۲ ل = ۰

کی ایک اصل ہو۔

نیز ۴۵° اور ۹۰° کے درمیان، ۹۰° اور ۱۸۰° کے درمیان، اور ۱۸۰° اور ۳۶۰° کے درمیان ل کی قیمتوں کے لیے علامت کی مزید تبدیلیاں ہیں۔ اس لیے مساوات بالا کی چار حقیقی اصلیں ہونی چاہئیں اور جب چند دیگر چھوٹی رقمیں بھی ملحوظ رکھی جائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصلیں تقریباً

۲۴°، ۸۳°، ۱۵۹°، ۲۷۲°

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ہیں اور ان کے جواب میں وہ تاریخیں جن پر وقت کی مساوات صفر ہوتی ہے حسب ذیل ہیں

۱۵ر اپریل، ۱۴ر جون، ۳۱ر اگست، ۲۴ر دسمبر

مثال ۳ — اگر ان چار موقعوں پر جبکہ وقت کی مساوات صفر ہوتی ہے شمسی طول بلد $ل_۱$، $ل_۲$، $ل_۳$، $ل_۴$ ہوں تو ثابت کرو کہ ان طول بلدوں کا مجموعہ ۵۴۰° ہونا چاہئے اگر ز کا مربع اور مس $\frac{1}{4}$ سہ کی چوتھی وقت نظر انداز کی جائے۔

ہمیں حاصل ہوتا ہے ۲ ز جب (ل − ح) = مس^۲ $\frac{1}{4}$ سہ جب ۲ل

اس میں لا = مس ل، م = ز جم ح م^۲ $\frac{1}{4}$ سہ، ن = ز جب ح م^۲ $\frac{1}{4}$ سہ رکھنے سے حاصل ہوتا ہے

م^۲ لا^۴ − ۲ م ن لا^۳ + (م^۲ + ن^۲ − ۱) لا^۲ − ۲ م ن لا + ن^۲ = ۰

اس مساوات میں لا^۳ اور لا کے سر مساوی ہیں اور اگر ہم اس واقعہ کو طول بلدوں $ل_۱$، $ل_۲$، $ل_۳$، $ل_۴$ کی رقوم میں جو اس مساوات کی چار اصلیں ہیں بیان کریں تو ہمیں شرط ملتی ہے

مس ($ل_۱$ + $ل_۲$ + $ل_۳$ + $ل_۴$) = ۰

اس مساوات سے معلوم ہوتا ہے کہ $ل_۱$ + $ل_۲$ + $ل_۳$ + $ل_۴$ = ۱۸۰° ک

جہاں ک ایک صحیح عدد ہے۔ لیکن ہم دیکھ چکے ہیں (مثال ۲) کہ $ل_۴$ < ۹۰°

$ل_۴$ > ۲۷۰°، اس لیے ک > ۲ − نیز $ل_۱$ + $ل_۲$ < ۱۸۰°، $ل_۳$ < ۱۸۰°

اور $ل_۴$ < ۳۶۰° اس لیے ک < ۴ − اس لیے ک کی قیمت جو قابل قبول ہے وہ صرف ۳ ہے۔ اس لیے

$ل_۱$ + $ل_۲$ + $ل_۳$ + $ل_۴$ = ۵۴۰°

یہ دکھانا آسان ہے کہ

جب $ل_۱$ + جب $ل_۲$ + جب $ل_۳$ + جب $ل_۴$ = جب $ل_۱$ جب $ل_۲$ جب $ل_۳$ + جب $ل_۱$ جب $ل_۲$ جب $ل_۴$

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

+ جب ل۱ جب ل۲ + جب ل۲ جب ل۳ جب ل۴ = ۰

مثال ۴ ۔ اگر زمین کے مدار کا خروج المرکز $\frac{1}{60}$ ہو، طریق الشمس کے میلان کی جیب التمام $\frac{11}{12}$، اور اعتدالین کے خط کو محور اعظم پر عمود لیا جائے تو ثابت کرو کہ جب وقت کی مساوات، خروج المرکز، اور میلان دونوں کی وجہ سے عدد اً اعظم ہوتی ہے تو سورج کے طول بلد وہ زاویے ہیں جن کی جیوب تقریباً ۰٫۶۱۷ اور ۰٫۸۰۹ ہیں۔ [Math. Trip. I.]

وقت کی مساوات ہے

۲ ز جب (ل - ص) ـ مس^2 $\frac{1}{2}$ سہ جب ۲ ل

یہ ص = ۹۰° کے لیے اعظم ہوتی ہے جبکہ

ز جب ل ـ مس^2 $\frac{1}{2}$ سہ جم ۲ ل = ۰

دئے ہوئے مستقل درج کرنے سے یہ مساوات $\frac{1}{60}$ جب ل ـ $\frac{1}{23}$ جم ۲ ل = ۰ ہوتی ہے اس لیے جب ل میں ایک دو درجی مساوات حاصل ہوتی ہے جس کی اصلیں دئے ہوئے اعداد ہیں۔

۷۷ ۔ وقت کی مقیم مساوات کی عام تحقیق ۔ (۲۴۱)

اب ہم طریق الشمس کے میلان یا زمین کے مدار کے خروج المرکز کی بابت کوئی مفروضہ قائم کیے بغیر یہ معلوم کریں گے کہ وقت کی مساوات کب اعظم یا اقل ہوتی ہے۔ لیکن ہم یہ فرض کریں گے کہ سورج کے گرد زمین کی حرکت ایک ثابت قطع ناقص میں واقع ہوتی ہے اور خط استواء کی حرکت نظر انداز کی گئی ہے۔ دفعہ ۵۲ سے ضروری مساواتیں حاصل ہوتی ہیں اور وہ حسب ذیل ہیں:

مس د = ر (۱ - ز^2 جب^2 ۱/۲ (جم ع - ز) ط = ع - ز جب ع،

مس ع = جم سہ مس ۰، ۰ = و + ص

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جہاں اصلی، اوسط اور خروج المرکزی بے قاعدگیاں د، ط، ع ہیں اور سورج کا اصلی طول بلد ⊙ ہے، مدار کا خروج المرکز ز، اور حضیض کا طول بلد حہ۔

وقت ت کے لحاظ سے اِن مساواتوں کو تفرق کرنے سے

$$\frac{\text{فرد}}{\text{فرت}} = \frac{\sqrt{1-ز^2}}{1-ز\,\text{جم}\,ع} \times \frac{\text{فرع}}{\text{فرت}}\,, \quad \ldots\ldots\ldots (1)$$

$$(1-ز\,\text{جم}\,عہ)\,\frac{\text{فرع}}{\text{فرت}} = \frac{\text{فرط}}{\text{فرت}}\,, \quad \ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

$$(\text{جم}^2 ⊙ + \text{جم}^2\,سہ\,\text{جب}^2 ⊙)\,\frac{\text{فرعہ}}{\text{فرت}} = \text{جم}\,سہ\,\frac{\text{فرد}}{\text{فرت}}\,, \quad \ldots\ldots\ldots (3)$$

وقت کی مساوات سورج کے اوسط طول بلد (ط + حہ) کو اس کے صعود مستقیم عہ میں سے تفریق کرنے سے حاصل ہوتی ہے اور جب وقت کی مساوات مقیم ہوتی ہے تو ت کے لحاظ سے اس کا تفرقی سر صفر ہوتا ہے، اس لیے

$$\frac{\text{فرعہ}}{\text{فرت}} = \frac{\text{فرط}}{\text{فرت}}$$

یا تفرقی سروں کے اسقاط سے

$$(1-ز\,\text{جم}\,عہ)^2\,(\text{جم}^2 ⊙ + \text{جم}^2\,سہ\,\text{جب}^2 ⊙) = \sqrt{1-ز^2}\,\text{جم}\,سہ$$

قطع ناقص کی ہندسی خاصیتوں سے حاصل ہوتا ہے

$$(1-ز^2) = (1-ز\,\text{جم}\,عہ)\{1+ز\,\text{جم}\,(⊙ - حہ)\}$$

اس لیے

$$(1-ز^2)^{\frac{3}{2}}\,(\text{جم}^2 ⊙ + \text{جم}^2\,سہ\,\text{جب}^2 ⊙) = \text{جم}\,سہ\,\{1+ز\,\text{جم}\,(⊙ - حہ)\}^2$$

اِس ضابطہ میں ز کی مقدار پر کوئی قید نہیں ہے اور یہ ⊙ کی تعیین کے لیے ایک عام مساوات ہے جبکہ وقت کی مساوات مقیم ہو۔

(۲۴۲) **مثال ۱۔** ثابت کرو کہ وقت کی مساوات کی مقیم قیمتیں اُس وقت

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

واقع ہوتی ہیں جبکہ سورج کے سمتی قطر کا ظل خط استواء کے مستوی پر اوسط فاصلہ ا کا $(1-ز^2)^{\frac{1}{2}}$ (جم سہ)$^{\frac{1}{2}}$ گنا ہو جہاں ز مدار کا خروج المرکز اور سہ طریق الشمس کا میلان ہے۔

فرض کرو کہ یہ ظل غہ ہے، تب اگر سورج کا میل ضہ ہو تو

$$غہ = ا(1-ز^2)^{\frac{1}{2}} جم ضہ \{1 + ز جم (⊙ - حہ)\}$$

لیکن $$جم ضہ = (جم^2 ⊙ + جم^2 سہ جب^2 ⊙)^{\frac{1}{2}}$$

اور اوپر جو ثابت ہو چکا ہے اس سے

$$\frac{(جم^2 ⊙ + جم^2 سہ جب^2 ⊙)^{\frac{1}{2}}}{1 + ز جم (⊙ - حہ)} = \frac{(جم سہ)^{\frac{1}{2}}}{(1-ز^2)^{\frac{1}{2}}}$$

اس لیے $$غہ = ا(1-ز^2)^{\frac{1}{2}} (جم سہ)^{\frac{1}{2}}$$

مثال ۲ — فرض کرو کہ زمین کے لحاظ سے سورج کا طریق ٹھیک ایک قطع ناقص ہے جس کے ایک ماسکہ پر زمین ہے۔ فرض کرو کہ اس قطع ناقص کا ظل خط استواء کے مستوی پر لیکر ایک دوسرا قطع ناقص حاصل کیا گیا ہے۔ تب سورج کے محل کے ظل جبکہ وقت کی مساوات بڑی سے بڑی ہو اس دوسرے قطع ناقص اور ایک دائرہ کے نقاط تقاطع ہیں جس کا مرکز زمین ہے اور جس کا رقبہ اس قطع ناقص کے رقبہ کے مساوی ہے۔

مثال ۳ — عام صورت میں ثابت کرو کہ خروج المرکز خواہ کچھ ہی ہو مرکز کی مساوات اعظم ہوتی ہے جبکہ سمتی قطر، محور اعظم اور محور اصغر کے درمیان اوسط ہندسی ہو۔

۷۸ — موسموں کا سبب —

مساوات میں سورج کا ظاہری سالانہ راستہ اعتدالی اور انقلابی نقطوں سے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

چار ربعوں میں تقسیم ہے۔ ان کے جواب میں وقت کے جو چار وقفے ہیں ان کو موسم بہار، گرما، خریف اور سرما کہتے ہیں۔ بہار شروع ہوتا ہے جبکہ سورج راس الحمل میں داخل ہوتا ہے یعنے جبکہ اس کا طول بلد صفر ہے۔ جب سورج انقلابی نقطہ (طول بلد = ۹۰°) پر پہنچتا ہے تو گرما کا آغاز ہوتا ہے۔ موسم خریف شروع ہوتا ہے جبکہ سورج راس المیزان (طول بلد = ۱۸۰°) میں داخل ہوتا ہے۔ سرما کا آغاز اسوقت ہوتا ہے جبکہ سورج کا طول بلد ۲۷۰° ہوتا ہے اور اس کا اختتام اس وقت جبکہ سورج پھر راس الحمل میں داخل ہوتا ہے۔

زمین کے کرۂ ہوائی کے جو یاتی حالات ہیں تبدیلیاں جو اس مظہر کا سبب ہیں جس کو موسموں کا تغیر کہتے ہیں خاص کر ان تبدیلیوں سے متعین کیجاتی ہیں جو سورج سے پہنچنے والی حرارت کی مقداریں واقع ہوتی ہیں جیسے جیسے سال آگے بڑھتا ہے۔

حرارت کی مقدار جو سورج سے زمین کی سطح پر کے کسی مقام پر پہنچتی ہے دو چیزوں پر منحصر ہوتی ہے (۱) گھنٹوں کی اس تعداد پر جن میں سورج افق کے اوپر رہتا ہے اور (۲) بوقت ظہر سورج کے راسی فاصلہ پر ایک ایسے مقام پر جو عرض بلد فہ میں واقع ہے طلوع آفتاب سے غروب آفتاب تک وقفہ ۲۴ ھ / ۲۲ ہے جہاں ھ تیم قطری زاویوں میں وہ زاویہ ہے جو مساوات (۲۴۳)

جم ھ = - مس فہ مس ضہ

سے حاصل ہوتا ہے، سورج کا راسی فاصلہ بوقت ظہر فہ ـ ضہ ہے اور ضہ اس کا میل ہے۔

جب سورج طریق الشمس پر راس الحمل کے نقطہ سے حرکت کرتا ہے تو اس کا میل مثبت ہوتا ہے (دیکھو شکل ۶۸) اور جب سورج سرطان کے پہلے نقطہ پر جس کی علامت ھ ہے پہنچتا ہے تو یہ میل انقلاب گرما پر اعظم قیمت اختیار کرتا ہے، اس وقت اس کا میل طریق الشمس کے میلان کے مساوی ہوتا ہے یعنے ۲۳° ۲۷′۔ اس نقطہ سے شمسی میل گھٹنے لگتا ہے تا آنکہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



شکل (۶۸)

اعتدال خریف ♎ پر صفر ہو جاتا ہے۔ اعتدال خریف سے میل منفی ہوجاتا ہے اور گھٹتے گھٹتے جدی میں جس کی علامت ♑ ہے انقلاب سرما پر اقصیٰ (-۲۳° ۲۷′) ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک مرتبہ بڑھنے لگتا ہے اور اگلے اعتدال پر پھر معدوم ہوتا ہے۔

موسمی تبدیلیوں پر غور کرنے کے لیے زمین کی سطح کو پانچ منطقات میں تقسیم کرنا سہولت بخش ہے۔ یہ منطقات خط استواء کے متوازی دائروں سے محدود ہوتے ہیں جو عرض بلد ± ۲۳° ۲۷′ اور ± ۶۶° ۳۳′ میں واقع ہیں۔ وہ منطقہ جو خط استواء کے شمال اور جنوب میں ۲۳° ۲۷′ کے توازیوں کے درمیان ہے منطقہ حارہ کہلاتا ہے اور اس کو محدود کرنے والے شمالی اور جنوبی دائرے خط سرطان اور خط جدی کہلاتے ہیں۔ شمال اور جنوب میں عرض بلد ۶۶° ۳۳′ کے توازی دائرہ قطب شمالی اور دائرہ قطب جنوبی کہلاتے ہیں۔ وہ منطقہ جو دائرہ قطب شمالی اور خط سرطان کے

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

درمیان ہے منطقہ معتدلہ شمالی کہلاتا ہے اور وہ جو دائرہ قطب جنوبی اور خط جدی کے درمیان ہے منطقہ معتدلہ جنوبی کہلاتا ہے۔ بالآخر وہ علاقے جو قطب شمالی اور قطب جنوبی کے گرد دائرہ قطب شمالی اور دائرہ قطب جنوبی سے محدود ہیں منطقہ منجمد شمالی اور منطقہ منجمد جنوبی کہلاتے ہیں۔

انقلاب گرما کے وقت ضہ = ۲۳° ۲۷′ اور اس لیے دائرہ قطب شمالی کے کسی نقطہ کے لیے مس فہ مس ضہ = ۱۔ ان حالات کے تحت سورج کا ساعتی زاویہ طلوع اور غروب پر ۱۸۰° ہے یعنے سورج کا یومی راستہ اس وقت خط استواء کے متوازی ایک دائرہ ہے جو افق کو نقطہ شمالی پر مس کرتا ہے، اس لیے نیم شب پر اس کی قرص کا نصف حصہ نظر آئے گا (ہم یہاں انعطاف کے اثر کو ملحوظ نہیں رکھ رہے ہیں)۔ مشاہد جیسے جیسے قطب کی طرف بڑھیگا منطقہ منجمد کے اندر سورج بغیر غروب ہوئے متعدد ایام تک افق کے اوپر رہے گا۔ خود قطب پر مشاہد کو سورج بوقت اعتدال افق کے گرد حرکت کرتا نظر آئے گا اور اعتدال کے بعد وہ آسمان کے گرد اگرد ایک لولب مرتسم کرے گا اور افق کے اوپر اس کا ارتفاع بتدریج بڑھتا جائے گا تا آنکہ بوقت انقلاب اس کا یومی راستہ ۲۳° ۲۷′ کے ارتفاع پر افق کے متوازی تقریباً ایک دائرہ ہوگا۔ انقلاب کے بعد وہ افق کی جانب ایک مشابہ لولب منحنی میں واپس ہوگا اور افق پر اعتدال خریف کے وقت پہنچیگا۔ موسم سرما میں نصف سال تک سورج مسلسل افق کے نیچے رہے گا۔

منطقہ معتدلہ جنوبی اور منطقہ منجمد جنوبی میں مظاہر متناظر شمالی منطقوں کے مظاہر کے مشابہ ہوں گے لیکن ان کا وقوع سال کے مخالف زمانوں میں ہوگا۔ مثلاً جنوبی نیم کرہ ارض کا موسم بہار وقت کے نکتہ نظر سے شمالی نیم کرہ کے موسم خریف کے ہم زمان ہوگا اسی طرح جنوب کا سرما شمال کے گرما اور شمال کا سرما جنوب کے گرما کے ہم زماں ہوگا۔

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

منطقہ حارہ میں حالات حسب ذیل ہوتے ہیں :- خط استوا پر چونکہ فہ = ۰ اس لیے (۱) سے جم ھہ = ۰ خواہ ضہ کی قیمت کچھ ہی ہو۔ اسلیے ھہ = ۱/۲ ۲۱ یعنے دن کا طول پورے سال ۱۲ گھنٹہ رہتا ہے۔ لیکن سورج کا نصف النہاری راسی فاصلہ دن بہ دن متغیر ہوگا۔ اعتدال ربیع پر سورج کا نصف النہاری راسی فاصلہ تقریباً صفر کے مساوی ہوگا (یہ ٹھیک صفر کے مساوی ہوگا اگر سورج اُس مقام کے نصف النہار کو اُس وقت عبور کرے جبکہ وہ راس الحمل کے نقطہ میں سے گذر رہا ہو)۔ جب موسم بہار شروع ہوکر بڑھنے لگتا ہے یہ نصف النہاری راسی فاصلہ انقلاب تک بتدریج بڑھے گا اور انقلاب کے وقت سورج کا تکبد تقریباً راس کے ۲۳° ۲۷' شمال میں واقع ہوگا۔ اعتدال خریف پر سورج پھر بوقت ظہر تقریباً راس میں سے گذرے گا اور انقلاب سرما پر راس کے ۲۳° ۲۷' جنوب میں تکبد کرے گا۔ اُن مقامات پر جو خط استوا اور خط جدی یا خط سرطان کے درمیان واقع ہیں حرارت کی مقدار جو سورج سے پہنچیگی سال میں دو مرتبہ اعظم قیمت اختیار کریگی اور اُسوقت سورج کا میل اُس مقام کے عرض بلد کے مساوی ہوگا۔ یہاں ہم نے صرف اُس حد تک غور کیا ہے جس حد تک ظہر پر سورج کے راسی فاصلہ کے اثر کا تعلق ہے۔

اگرچہ وہ چار حصے جن میں طریق الشمس کا بڑا دائرہ اعتدالوں اور انقلابوں سے تقسیم ہوا ہے طول میں مساوی ہیں لیکن اِن حصوں کو طے کرنے میں جو وقت صرف ہوتے ہیں وہ مساوی نہیں ہوتے۔

موسموں کی مدتیں معلوم کرنے کے لیے دفعہ ۷۳ کی مساوات (۳) استعمال ہوتی ہے جو سورج کے اوسط طول بلد اور اصلی طول بلد کے درمیان ایک رشتہ ہے یعنی

$$ل = ٥ - ٢ ز جب (٥ - حہ) + \frac{٣}{٢} ز^٢ جب ٢ (٥ - حہ)$$

ہم اپنے موجودہ مقصد کے لیے اِس جملہ کی تیسری رقم کو نظر انداز کر سکتے ہیں اور صرف یہ لکھ سکتے ہیں

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$ل = ٥ - ٢ ز جب (٥ - حہ)$$

جب سورج ♈ میں ہو تو ٥ = ٠ اور اس آن سورج کے اوسط طول بلد کو ل سے تعبیر کرنے سے

$$ل = ٢ ز جب حہ$$

اسی طرح انقلاب گرما، اعتدال خریف، انقلاب سرما اور پھر آئندہ اعتدال ربیع پر سورج کے اوسط طول بلدوں کو علی الترتیب $ل_١، ل_٢، ل_٣، ل_٤$ سے تعبیر کریں تو

$$ل_١ = ١١\frac{١}{٢} - ٢ ز جم حہ،$$

$$ل_٢ = ١١ - ٢ ز جب حہ،$$

$$ل_٣ = ١١\frac{٣}{٢} + ٢ ز جم حہ،$$

$$ل_٤ = ١١٢ + ٢ ز جب حہ،$$

موسموں کی مدتیں ان پانچ اوسط طول بلدوں میں سے ہر متصلہ زوج کے درمیان جو فرق ہے اس کو جزو ضربی ٢٤ ٢٥ ٣٦٥ ١١٢ سے ضرب دینے سے معلوم ہوتی ہیں۔ اس جزو ضربی کی بجائے ک لکھنے سے شمالی نیم کرۂ ارض کے لیے حاصل ہوتا ہے:۔ (٣٢٦)

دنوں کی تعداد

(١) ..

بہار میں = ک (ل١ - ل٢) = ٩١ ٣١٠ - ٢ ز ک (جب حہ + جم حہ)

گرما میں = ک (ل٢ - ل٣) = ٩١ ٣١٠ - ٢ ز ک (جب حہ - جم حہ)

خریف میں = ک (ل٣ - ل٤) = ٩١ ٣١٠ + ٢ ز ک (جب حہ + جم حہ)

سرما میں = ک (ل٤ - ل٥) = ٩١ ٣١٠ + ٢ ز ک (جب حہ - جم حہ)

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ز اور حہ کی وہ قیمتیں رکھنے سے جو دفعہ ۳۷ میں دیگئی ہیں حاصل ہوتا ہے

۲ زگ جب حہ = - ۱۰ ، ۹۱۰ دن

اور ۲ زگ جم حہ = + ۰ ، ۳۷۹ "

اس لیے ان چار موسموں کی مدتیں حسب ذیل ہیں

	دن	گھنٹے
بہار	۹۲	۲۰ ، ۲
گرما	۹۳	۱۴ ، ۴
خریف	۸۹	۱۸ ، ۷
سرما	۸۹	۰ ، ۵

پس ہم دیکھتے ہیں کہ موسم گرما اور بہار باہم ۱۸۶ دن ۱۰ ، ۶ گھنٹے رہتے ہیں لیکن موسم خریف اور سرما کے باہم صرف ۱۷۸ دن ۱۹ ، ۲ گھنٹے ہوتے ہیں۔ اس کی الٹی صورت جنوبی نیم کرہ میں ہوتی ہے، وہاں موسم گرما اور بہار باہم ۱۷۸ دن ۱۹ ، ۲ گھنٹوں کے ہوتے ہیں اور موسم خریف اور سرما باہم ۱۸۶ دن ۱۰ ، ۶ گھنٹوں کے۔

مثال ۱ — یہ مانکر کہ حہ یکساں طور پر بڑھتا ہے ثابت کرو کہ آئندہ زمانہ میں چار موسموں کی مدتوں کی حسب ذیل انتہائی حدود ہونگی:۔

۳۱۰ ، ۹۱ ± ۲ √ ۲ × ۳۶۵ ، ۲۴ × ز / ۲۱

مثال ۲ — اگر سال میں دنوں کی تعداد پ ہو اور اگر موسم گرما بہار سے ق دن بڑا اور خریف سے ر دن بڑا ہو تو مدار کا خروج المرکز اور قریب ارضی کا طول بلد معلوم کرو۔

دسویں باب پر مثالیں

مثال ۱ — اس مفروض پر کہ زمین کا مدار ایک تقریباً دائری قطع ناقص ہے اور او جین، اور انقلابین کے خطوط ایک ہی طول بلد رکھتے ہیں ثابت کرو کہ خروج المرکز تقریباً

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

$$\frac{و_{۱} - و_{۲}}{و_{۱} + و_{۲}} \text{ مس}^{۲} \frac{۱}{۲} \text{ سہ}$$

کے مساوی ہے جہاں $و_{۱}$، $و_{۲}$ قریب ارضی اور بعید ارضی پر وقت کی مساوات میں فی گھنٹہ تغیرات کو تعبیر کرتے ہیں اور سہ طریق الشمس کا میلان ہے۔ [Math. Trip.]

(۲۴۷) **مثال ۲** ۔ کیمبرج میں ایک گھڑی گرینوچ اوسط وقت دکھاتی ہے ۔ بتاؤ کہ اس میں کیا وقت تھا جبکہ سورج کا اگلا کنارہ بتاریخ ۶ جنوری ۱۸۷۵ء نصف النہار پر پہنچا تھا اگر یہ دیا جائے کہ

کیمبرج کا طول بلد	۲۲٫۷۵ ث م
نصف النہار عبور کرنے میں جو وقت لگا	۱ م ۱۰٫۶۲ ث
وقت کی مساوات	۶ م ۲٫۸۸ ث

مثال ۳ ۔ ثابت کرو کہ نجری جنتری کے وہ خانے جن سے سورج کے صعود مستقیم کا تغیر فی گھنٹہ" اور "نیم قطر کا وقت جو نصف النہار عبور کرنے میں لگتا ہے" معلوم ہوتے ہیں ایک ساتھ بڑھتے اور گھٹتے ہیں اور اول الذکر مقدار عملاً ثانی الذکر کے مربع کے متناسب ہوتی ہے ۔ [Math. Trip. 1.]

مثال ۴ ۔ اگر زمین کے مدار کا خروج المرکز ز ہو اور اعتدالین کا خط مدار کے محور اعظم پر عمود ہو تو ثابت کرو کہ زمین ♈ سے ♎ تک اور ♎ سے ♈ تک حرکت کرنے میں جو اوقات لیتی ہے اُن کا فرق تقریباً ۴۶۵ ز دن ہے ۔

مثال ۵ ۔ ثابت کرو کہ مرکز کی بڑی سے بڑی مساوات $۲ ز + ۱۱ ز^{۳} / ۴۸$ ہے اور جب یہ صورت ہو تو

$$و = ۱۱\frac{۱}{۲} + ز\frac{۳}{۴} + ز^{۲}\frac{۲۱}{۱۲۸} + ز^{۳}\frac{۲۵}{۳۸۴} \quad ، \quad ط = ۱۱\frac{۱}{۲} - ز\frac{۵}{۴}$$

$$ع = ۱۱\frac{۱}{۲} - ز\frac{۱}{۴} + ز^{۳}\frac{۳۷}{۳۸۴}$$

حصۂ اول ختم

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اشاریہ

علم ہیئت کروی

حصۂ اول

نوٹ: اعداد سے صفحات کا حوالہ دیا گیا ہے۔

اختلاف منظری زاویہ، ۱۳۸
آڈیمس، کیپلر کے مسئلہ کا حل، ۳۴۰
کیپلر کے مسئلے کا ترسیمی حل، ۲۴۹
لمبرٹ کے مسئلہ کا ثبوت، ۲۵۵
ارتفاع، ۱۱۹
ارض مرکزی عرض بلد، ۶۷
ارضی تاریخ خط، ۳۴۲
استحالہ کروی محددوں کا، ۵۵
اسٹونی ہرسٹ پر مقناطیسی انصراف، ۱۲۱
استقبال، ۲۶۳
کی وجہ، ۲۷۲
کے ضابطے، ۲۷۳
عام استقبال، ۲۷۲

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

سیّاروی، ۲۷۰
اعتدال خریف، ۱۲۸
اعتدال ربیع، ۱۲۷
اعتدالی نقطے، ۱۲۸
اعتدالوں کا کبو، ۲۶۳
اقترانی مدت، ۲۲۹
البرشٹ، عرض بلدوں میں تغیرات، ۳۰۲
السمت، ۱۱۹
آلڈس، کپلر کے مسئلہ کو حل کرنے کے لیے جدولیں، ۲۵۱
انعطاف نما کرۂ ہوائی کا، ۱۷۸
انتصابی دائرہ، ۴۶
انحناء ارضی نصف النہار پر، ۷۱
انعطاف، ۷۷
مشاہدات سے تعیین، ۱۹۳
تفرقی مساوات کا تکمل، ۱۸۸
زاویۂ محیل پر اثر، ۲۱۰
دباؤ اور تپش کا اثر، ۱۹۸
کی جدول، ۱۸۳
اول السمت، ۱۱۵
اوج، ۲۳۶
بار پیما، ۱۹۹
بحری کمپاس، ۱۲۱
براڈلے، کبو کا انکشاف، ۱۸۸
برہمن، ۱۸
برنٹو، انعطاف کے نظریہ پر، ۱۸۷

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

سیاروی استقبال پر، ۱۷۰
بعید ارضی، ۲۳۶
باؤشنگر، ۲۴۲
بے قاعدگی خروج المرکزی، ۲۳۶
اصلی، ۲۳۶
اوسط، ۲۳۶
بینی اوراج کا فن، ۲۱
بیگے، ۱۹
بیسل کا بینی اوراج کا طریقہ، ۳۱
یومی اعداد، ۲۸۹
انعطاف، ۱۸۸
تاریخ خط ارضی، ۳۴۲
تسطیحی ظل، ۸۸
کے ضابطے، ۹۶
تفرقی ضابطے کروی مثلث کے، ۱۹
سماوی کرہ پر ان کا استعمال، ۱۴۰
تقاطع، دو دائروں کا، ۵۱
تکبد بالائی و زیرین، ۱۱۵
سیارے کا، ۱۵۰
چاند کا، ۱۵۲
پر طول بلد کا اثر، ۱۵۴
راس المحل کے، ۳۲۴
ٹاؤن لی، عرض بلد میں تغیر، ۳۰۲
ثریا، ۱۰۷
جدی، سورج کا محل انقلاب سرما پر، ۳۷۵

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

جغرافی عرض بلد، ۶۷
جولین کیلنڈر، ۳۲۴
جوزا (بہ) کا استقبال اور کیو، ۲۹۳
چاند کا تکبد، ۱۵۲
چیانڈلر، شمالی قطب کی حرکت کی وجہ سے عرض بلد میں تغیرات، ۳۰۲
حائط قطبی ستارے، ۱۱۶
حرکتیں، ذاتی، ۳۰۰
حضیض، ۲۳۶
خروج المرکز، زمین کے مدار کا، ۳۵۷
خزاں، موسموں کے اسباب، ۳۷۳
خط استواء، ۱۱۲
دائرہ، درجہ دار بڑا، ۳۸
کا شطب، ۳۹
کا میلان، ۴۹
کے عقدے، ۵۲
دائری اجزا جو نیپئیر کے ضابطوں میں قائم الزاویہ مثلث کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ۱۰۷
دب اکبر، ۱۰۷
دجاجہ، ستارے کا اختلاف منظر، ۲۰۹
درجہ دار بڑا دائرہ، ۳۸
کا شطب، ۳۹
کا میلان، ۴۹
کے عقدے، ۵۲
دمدار تارے کی ناقصی حرکت، ۲۵۲
ڈلمبر تمثیلات، ۱۲
دیموس مریخ کا قمر، ۲۲۳

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

ذاتی حرکتیں ستاروں کی، ۳۰۰
راس الحمل، ۱۲۷
کی حرکت، ۲۵۸
کا موسموں سے تعلق، ۳۱۲
راس، ۱۱۱
راسی فاصلہ، ۱۱۹
راسی فاصلے، میل اور ساعتی زاویہ سے محسوب کردہ، ۱۳۶
رامبو کپلر کا مسئلہ، ۲۴۰
ڈلمبر کی تمثیلات کے لیے قاعدہ، ۱۲
ربعی مثلث، ۸
رقبے، سیاروی حرکتوں کے متعلق کپلر کا کلیہ، ۲۲۲
رقاص فوکو کا، ۱۱۱
زاویہ محل، ۲۱۰
زاویہ محل دوہرے تارے کا، تعریف، ۲۱۰
زمین کی شکل، ۶۵
زمین کا محور، ۶۶
کے ابعاد، ۶۶
کی گردش، ۱۳۲
کی گردش کا دور، ۱۳۴
کی استقبالی اور کبوی حرکت، ۶۶۴، ۲۸۴
کے قطب کے محل میں تغیر، ۳۰۲
کی سالانہ حرکت، ۳۴۸
سال کا آغاز، ۲۹۴
سال کبیسہ، ۳۳۴
سال کوکبی، ۳۲۳

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

شمسی، ۳۲۳
کاروباری، ۳۲۳
ستارے، ذاتی حرکتیں، ۳۰۰
کا تکبد، ۱۴۸
سرطان، سورج کا محل انقلاب گرما پر، ۳۷۴
سماک رامح، خیالی کرۂ سماوی کا مرکز، ۱۰۸
سماوی خط استوا، ۱۲۹
کرہ، ۱۰۵
افق، ۱۱۰
سمپسن کا ضابطہ، انعطاف کے لیے، ۱۹۵
سورج کی ظاہری حرکت، ۲۳۴
سیّارہ کا تکبد، ۱۵۰
شطب، ۲۹
شمسی سال، ۳۲۳
شمال قطبی فاصلہ، ایک ستارے کا، ۱۲۷
صعودی عقدہ، ۵۲
صعود مستقیم، ۱۲۵، ۳۱۴
ضابطے، علم مثلث کروی کے، اساسی، ۱
ضد شطب، ۳۹
طریق الشمس، ۱۲۷
طلوع، کسی جرم فلکی کا، ۱۱۴، ۱۵۷
طول بلد، ۱۶۲
ظاہری حرکت سورج کی، ۳۴۸
دو ستاروں کا فاصلہ، ۱۰۷
عرض التمام، ۱۱۶

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

عرض بلد، ۶۶، ۱۱۶، ۱۶۲
عقدہ، ۵۲
عکاسی، اس سے متعلق ہیئتی مسئلے، ۲۲۱
غروب کسی جرم فلکی کا، ۱۱۴
غیر تابع یومی اعداد، ۲۸۹
فاصلہ دو ستاروں کا ظاہری، ۱۰۷
فالماوتھ پر مقناطیسی انصراف، ۱۲۲
فرس، ۱۲۸
فوبوس، مریخ کا قمر، ۲۳۳
فوکو کا رقاص، ۱۱۱
قائم الزاویہ مثلث، ۸
قریب الرضی، ۲۳۶
قدم، ۱۱۱
قطب تارہ، ۱۱۳
کا استقبال، ۲۶۴
قطب، ۱۱۲
قطب اسد چاند سے فاصلہ، ۱۷۵
قطبی فاصلہ، ۱۲۶
قمر شمسی استقبال، ۲۷۱
قمر مریخ کے، ۲۳۳
قنطورس ( ) ذاتی حرکت، ۳۰۱
قیقاؤس (ع) کا انعطاف، ۲۰۰
کاگنولی، کیپلر کے مسئلے کا حل، ۲۴۰
کاروباری سال، ۳۲۳
کبو، ۲۷۰

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کپلر کے کلئے، ۲۲۲
کا مسئلہ، ۲۳۹
کرہ نما ارض، ۶۶
کرہ ہوائی، ۱۹۰
کرہ ہوائی کا انعطاف نما، ۱۷۸
کرہ ہوائی کا انعطاف، ۱۷۷
عام نظریہ، ۱۸۳
تفرقی مساوات، ۱۸۶
کیسینی کا ضابطہ، ۱۹۰
سمپسن کا ضابطہ، ۱۹۵
براڈلے کا ضابطہ، ۱۹۷
مشاہدہ سے معلوم کرنا، ۱۹۹
ساعتی زاوئے اور میل پر اثر، ۲۰۳
ظاہری فاصلہ پر اثر، ۲۰۵
دوہرے تارے پر اثر، ۲۱۰
کرہ سماوی، ۱۰۶
پر بڑے دائرے، ۱۱۲
کے قطب، ۱۱۳
پر محددوں کے نظام، ۱۱۹
کروی مثلث، ۱
عام ضابطے، ۱
ڈلمبر کی تمثیلات، ۱۲
نیپیر کی تمثیلات، ۱۵
تفرقی ضابطے، ۱۹
ربعی مثلث، ۸

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

کلارک زمین کے ابعاد، ۶۶، ۷۱
کلیے نیوٹن کے، ۲۲۴
کوکبی وقت، ۱۳۳
کوکبی وقت سے اوسط وقت معلوم کرنا، ۳۳۸
کوکبی یوم، ۱۳۲
سال، ۳۲۳
کوٹنر، عرض بلد میں تغیرات، ۳۰۲
کہکشاں، ۱۷۴
کیلنڈر گری گوری کا، ۳۲۴
جولین، ۳۲۴
کیمبرج، اس کے ارض مرکزی عرض بلد کو محسوب کیا گیا، ۷۰
کیسینی کرۂ ہوائی کا انعطاف کا نظریہ، ۱۹۰
کیو مقناطیسی انصراف، ۱۲۱
گاؤس کی تمثیلات، ۱۲
گردش زمین کی، ۱۳۲
گری گوری کا کیلنڈر، ۳۳۴
گلاڈسٹون اور ڈیل کا کلیہ، ۱۸۸
گھڑی ہمتی، ۳۱۱
لیجیر یر کا قاعدہ، کیپلر کے مسئلے کے حل کے لیے، ۲۵۰
متوازی دائرے، ۱۱۳
محور زمین کا، ۶۶
مدت دوران، ۲۲۳
مدار، ۲۲۲
مرکیٹر کا ظل، ۸۱
کے ہم شکل ہونے کا ثبوت، ۸۲
مساوی المیلان کا، ۷۷

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

اس سے تسطیحی ظل اخذ کرنا، ۹۳
مرکزی مساوات، ۳۵۴
مرور کسی جرم فلکی کا، ۱۱۵
مشتری کا تکبد، ۱۵۰
موسم، ۳۷۳
میل، ۱۲۵، ۱۲۶
میلان طریق الشمس کا، ۱۳۰
ناقص حرکت، ۲۲۲
کپلر کے کلیے، ۲۲۳
نیوٹن کے انکشافات، ۲۲۳
کو محسوب کرنا، ۲۳۵
ناقصیت، ۷۳
نزولی عقدہ، ۵۲
نصف النہار، ۱۱۵
نقشہ ہم شکل، ۷۷
نیوٹن کے کلیے، ۲۲۴
نیوٹن حرکت کے کلیے، ۲۲۴
نیپیر کی تمثیلات، ۱۲
وقت ظاہری، ۳۳۲
دیا للنسیا پر مقناطیسی انصراف، ۱۲۱
ہندسی اصول اوسط حرکت کا، ۳۲۶
ہیلی کا دمدار تارا، ۲۴۲
ہیئتی انعطاف، ۱۸۱
ہیئتی گھڑی، ۳۱۱
یوم کوکبی، ۱۳۰
یولر کا مسئلہ، ۲۵۳

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

فہرست اصطلاحات

علم ہیئت کروی

حصۂ اول

Aberration	ضلالت
Abscissa	فصلہ
Altazimuth	آلہ ارتفاع و السمت
Almucantar	المقنطر
Analogies	تمثیلات
Andromedae	اندرومیدا
Antarctic circle	دائرہ قطب جنوبی
Antinole	ضد شطب
Antipodal	تکئت قدمی
Aphelion	اوج
Apex	راس
Apogee	بعید ارضی
Apse	اوج
Aquilæ	عقاب
Arcturus	سماک رامح
Arctic circle	دائرہ قطب شمالی
Aries	حمل
Ascending node	صعودی عقدہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Asteroids	نجیمہ
Astrograph	نجم نگار، فلک نگار
Autumn	خریف
Autumnal equinox	اعتدال خریف
Capella	عیوق
Cardinal points	اساسی نقطے
Celestial	سماوی
(a) Cephei	عہ قیقاؤس
Centauri	قنطورس
Circuit	دورہ
Circumpolar	حائط قطبی
Civil year	کاروباری سال
Chrono-meter	وقت پیما
Clock star	گھڑی تارہ
Collimation	توازی گری
Collimating telescope	توازی گر دوربین
Comet	دمدار تارہ
Colatitude	عرض التمام
Conformal representation	ہم شکل تعبیر
Conformal correspondence	ہم شکل تناظر
Convolutions	تفیفے
Counter part	جواب
Corpuscular theory	جسیمیہ نظریہ
Critical stage	فاصل منزل
Culmination	تکبید

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Culminate	تکبد کرنا
Current coordinates	رواں محدد
Cusp	قرن
Cycle	دور
Cyclic	دائری
Cygny	دجاجہ
Declination axis	میلی محور
Defective limb	ناقص کنارہ
Declination	میل
Deimos	دیموس
Depression	پستی
Differential formula	تفرقی ضابطہ
Descending node	نزولی عقدہ
Dispersion	انتشار
Duplicate ratio	نسبت متناۃ
Diurnal	یومی
Ellipticity	ناقصیت
Elongation	ابتعاد
Epoch	قرن
Equation of time	وقت کی مساوات
Equinoctial colure	دائرہ اعتدالین
Ephemeris	الفیمیرس
Error of collimation	خطائے توازی گری
Eridani	النہر
Evening star	شام کا ستارہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Expose	عریان کرنا
Extrapolation	ورائی ادراج
Eccentric	خارج المرکز
Eye piece	چشمہ
Exterior planet	بیرونی سیارہ
Focal circle	ماسکی دائرہ
First quarter	پہلا ربع
Field of view	میدان نظر
Gearing	گیرائی
Generalized instrument	تعمیمی آلہ
Geocentric	ارض مرکزی
Gun-metal	توپ دھات
Heliometer	شمس پیما
Helio-graph	شمس نگار
Horary motions	ساعت واری حرکتیں
Hour angle	ساعتی زاویہ
Ideal	تصوری کامل
Index error	مظہاری خطا
Inferior planet	سفلی سیارہ
Intergration by parts	تکمل بالحصص
Interpolation	بینی ادراج
Invert	مقلوب کرنا
Inversion	انقلاب
Inverses	مقلوبات
Invariant	غیر متغیرہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Iris	ایرس
Jupiter	مشتری
Latitude	عرضِ بلد
Latus-rectum	وترِ خاص
Libra	میزان
Leap year	سالِ کبیسہ
Light equation	نوری مساوات
Limb of the sun	کنارہ (سورج کا)
Longitude	طولِ بلد
Loxodrome	مساوی المیلان
Lunation	قمریہ
Luni-solar-precession	قمر شمسی استقبال
Major circle	بڑا دائرہ
Mechanism	میکانیت
Millky way	کہکشاں
Minor circle	صغیر دائرہ
Nadir	قدم
Nebeula	سحاب
Nole	شطب
Nutation	کبو
Object glass	دہانہ
Obliquity	میلان
Occultation	احتجاب
Opposition	تقابل
Optical	مناظری

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Orbit	مدار
Ordinate	معین
Osculating curve	لثمی منحنی
Pegasus	فرس
Pennumbra	ظلِ مشوب
Perigee	قریبِ ارضی
Perihelion	حضیض
Periodic time	مدتِ دوران
Perspective projection	منظری تطلیل
Phobos	فوبوس
Pnotographic plate	عکسی تختی
Photograply	عکاسی
Photometric	ضیاءپیمائی
Pleiades	ثریا
Polaris	قطب تارہ
Position angle	زاویۂ محل
Progression	تقدم
Proper motion	ذاتی حرکت
Quadrantal-triangule	ربعی مثلث
Quadrature	تربیع
Range	سعت
Reading-micoscope	قاری خوردبین
Reappearance	انجلاء
Regression	رجعت
Regulus	قلبِ اسد

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Residuals	تفلیات
Retrograde	رجعی
Retrogression	رجعت
Right-ascension	معدل مستقیم
Round numbers	بے کسر عدد
Satellites	تابع، قمر
Sappho	سیفو
Saros	قرن
Sidereal day	کوکبی یوم
Sidereal year	کوکبی سال
Sirius	شعریٰ
Slides	تختی
Solar day	شمسی یوم
Solstices	انقلاب
Solstitial colure	دائرہ انقلابین
Spider lines	خطوط عنکبوت
Spring	بہار
Stand	ایستادہ
Stationary	مقیم
Stereographic projection	تسطیحی اظلال
Summer	گرما
Sundial	دھوپ گھڑی
Terresterial date line	ارضی تاریخ خط
The first point of Aries	راس الحمل
The first point of Libra	راس المیزان

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Transcendental equation	علوی مساوات
Transit	مرور
Umbra	ظل محض
Undulatory Theory	موجی نظریہ
Venus	زہرا
Vernal equinox	اعتدال ربیع
Vertex	راس
Winter	سرما
Zenith distance	راسی فاصلہ
Zone	منطقہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

STARS AND CONSTELATIONS

Achernar	آخر النہر
Acrab	عقرب
Adara	عذرا
Alcor	الخوّار
Alcyone	الکیونی
Aldebaran	الدّبران
Alderamin	الذراع الیمین
Algeiba	الجمّا
Algenib	الجنب الفرس
Algol	الغول
Algorab	الغراب
Alioth	الیاتہ
Alkaid	القائد
Alkalurops	الکلوروپس
Alkes	الکاس
Almak	العناق
Alnilam	النطاق
Alphard	الفرد
Alphecca	الفکہ
Alpheratz	الفرس

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Alphirk	اَلفِرق
Alrai	اَلراعی
Alruccabah	اَلرکبہ
Alshain	اَلشاہین
Altair	اَلطائر
Antares	اَنٹیرس
Arcturus	اَرکیورس
Arneb	اَرنب
Asterope	اَسٹیروپی
Atlas	اَٹلس
Azimech	اَلسماک
Baten Kaitos	بطن القیطوس
Bellatrix	بیلاٹرکس
Benetnasch	بنات النعش
Betelgeuse	اَبط الجوزا
Canopus	سہیل
Capella	عیوق
Caph	کف
Castor	کیسٹر
Cor Caroli	قلب چارلس
Cor Hydrae	قلب الحیہ
Cor Leonis	قلب اسد
Cor Scorpinnis	قلب عقرب
Cor Serpentis	قلب شجاع
Denebola	ذنب الاسد

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Diphada		ضِفدع
Dubhe		دُبّہ
Electra		اِلکٹرا
Enif		اَنف الفرس
Errai		اَلراعی
Etamin		اَلتنین
Fom		فم
Fomalhaut		فم الحوت
Giedi		جدی
Gomeisa		غُمیصا
Hamal		حمل
Homam		ہُمام
Hyades		ہیاڈیس
Izar		ازار
Kaitain		خیطین
Kaus Australis		قوس جنوبی
Kelb al Rai		کلب الراعی
Kocab		کوکب
Kaus Borealis		قوس شمالی
Maia		مایا، میّہ
Markab		مرکب
Mebsuta		مبسوطہ
Megrez	δ Ursae Majoris	مغرز
Menkalinan	β Aurigae	منخر
Menkar	α Ceti	

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Merak	β Andromedae	مَراق
Merope		میروپی
Mesarthim	γ Arietis	مِشارثم (زبرانی)
Mintaka	δ Orionis	منطقہ
Mira	ο Ceti	میرا
Mirac,see Merak	Andromedae	مراق
Mirfak	α Persei	مرفق
Mirzam	β Canis Majoris	مرزم
Mizar	ζ Ursae Majoris	مئزر
Muphrid	η Bootis	مفرد
Nath	β Tauri	
Nekkar	α Bootis	نقّار
Okda	α Piscrum	عقدہ
Phakt	α Columbae	فاختہ
Phecda	γ Ursae Majoris	فخذ
Pleiades		ثریا - پرویں
Pleione	28 Tauri	پلئونی
Polaris		قطب تارا
Pollux		پالکس (موخرالتواس)
Praesepe		پرسیپی
Prima Giedi	α Capricorni	راس الجدی
Procyon		شعرالشامیہ
Ras Algethi	α Herculis	راس الجاثی
Ras Alhague	α Ophiuchi	راس الحاوی
Rastaban	β Draconis	راس التعبان

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Regulus	α Leonis	قلب الاسد
Rigel	β Orionis	رجل
Rotanev	β Delphini	روٹانیو
Sadachbia	γ Aquarii	سعد الاخبیہ
Sadalmelik	β Aquarii	سعد الملک
Sadalsud	Aquarii	سعد السعود
Scheat	β Pegasi	شیتہ
Schedar	α Cassiopeiae	صدر
Sheliak	β Lyrae	شلیاق
Sheratan	β Arietes	شرطان
Sirius		شعریٰ
Sirrah	α Andromedae	سرّہ
Skat	δ Aquarii	
Spica	α Virginis	سُنبلا
Sulaphat	γ Lyrae	سلحفاۃ
Sualocin	α Delphini	سوالوسن
Talitha	ι Ursae Majoris	
Tarazed	γ Aquilae	طائر الصید
Taygeta	ε Tauri	ٹیجیٹا
Thuban	α Draconis	تعبان
Unukalhay	α Serpentis	عنق الحیّہ
Vega	α Lyrae	نسر واقع
Vindemiatrix or Almuridin	ε Virginis	
Wasat	δ Geminorum	وسط
Yed	δ Ophiuchi	ید

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Zaurak	۲ Eridani	زورق
Zawijah	β Virginis	زاویہ
Zozca Zozmn	δ Leonis	
Zuben el Genubi	α Librae	الزبان الجنوبی
Zuben el Hakarbi		الزبان العقربی
Zuben el Chamali	β Librae	الزبان الشمالی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Andromeda	مراۃ المسلسلہ
Antlia	ہوا پمپ
Apus	طائر فردوس
Aquila	عقاب
Argo	السفینہ
Auriga	ممسک الاعنہ
Camelopardus	زراف
Cassiopeia	ذات الکرسی
Cetus	قیطس
Chamacleon	حربا
Circinus	پرکار
Columba	حمامہ
Coma Berenices	شعر برنیسی
Corona Australis	اکلیل جنوبی
Corona Borealis	اکلیل شمالی
Corvus	غراب
Crater	فم البرکان
Crux	صلیب
Delphinus	دلفین
Dorado	تیغ ماہی
Draco	تنین
Equnleus	فرس اصغر
Grus	حمالہ
Indus	انڈس
Mensa	میزہ

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Microscopium	خوردبینہ
Octans	مثمنہ
Puppis	سکان، دبوسہ
Pypxsi	کمپاس
Sextans	مسدسہ
Telescopium	دوربینہ
Toucanus	ٹوکانہ
Triangulum	مثلثہ
Triangulum Australe	مثلثہ جنوبی
Vela	شراع، بادبان
Eros	ایراس
a centauri	عہ قنطورس
Lalande	لالاند
Cygni	دجاجہ
Cordoba	قرطبہ
Enceladus	انقلادوس
Equinus (the little horse)	قرص اصغر
Eridanus (the peaer)	النہر
Errai	الراعی
V cephii	حبہ قیقاوس
Etanin of draconis	اتنین
Flora	فلوزا
Foranx (the furnace)	فرنیکس
Gemini (the twins)	توامین
Giedi	جدی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Hebe	ہیبے
Hercules	ہرقلس
Homam	ہمام
Horlogium (the clock)	ہاردلوگیم
Hyads	حیاریں
Hydra (the sea serpent)	
Hydrus	
Iklil	اکلیل
Scorpii	العقرب
Iapetus	آپیتس
Juno	جونو
Kaffaljidhma	کف الجذما
Ceti	قیطوس
Urse mindres	دب اصغر
Lacerta (the lizard)	لالرٹا
Leo (the lion)	اسد
Leo minor	اسد اصغر
Leonids	اسدی
Lepus (the hare)	ارنب
Lupus (the wolf)	سبع (بھیڑیا)
Lynse	فہد (سیاہ گوش)
Lyra (the lyre)	سلیاق
Maia	میا
Malus	مالوس
Mirfuk	مرفق

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Pegasi	
Herculis	ہرقلس
Geminorum	جوزا
Ceti	قیطس
Merope (23 Tauri)	میروپ
Mimas	میماس
Orionis	جبا
Persei, perseus	پرسیاوش
Canis magoria	کلب اکبر
Monoceros	گینڈا
Musca (the fly)	مکھی
Bull's Horn	قرن الثور
Leporis	الحل
Norma	نارمہ
Oberon	اوبی ران
Bootis	عوا
Pullas	پالس
Pavo	طاؤس
Pegasus	پردار گھوڑا
Phobos	فوبوس
Phoenix	فینکس
Phurud	الفرد
Pictor	مصور
Pisces	حوت
Pisces Anstralis	حوت جنوبی

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Pleiades	ثریا
Pollux	راس التوام
Virgi nis	العذرا
Praesepe	خان النور
Procyon (canis minoris)	(کلب اصغر)
Rasalasad	راس الاسد
Ras Algethi	راس الجاثی
Ras Alhague	راس الحاوی
Regulas	قلب اسد
Reticulum	شبکہ
Regel	رجل الجوما
Quarii	دلو
Sadal suud	سعد السعود
Sagitta	سہم
Sagitarius	قوس تیرانداز
Sculptor	بت گر
Serpens	اعیہ
Spica	العذرا
Titan	طیطان
Vasta	وسطار
Volans	سمکہ طیارہ
Vulpecula	ثعلب

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय
गुरुकुल कांगड़ी

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

पुस्तकालय
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार
वर्ग संख्या १५/११ ..... आगत संख्या २५८३३

पुस्तक-वितरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित २० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय मे वापिस आ जानी चाहिए। अन्यथा १० पैसे के हिसाब से विलम्ब-दण्ड लगेगा।

Signature with Date

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

१५
११

२५८३३

१५
११ पुस्तकालय २५८३३
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय
विषय संख्या ..... आगत नं० .....
लेखक .....
शीर्षक .....
.....

दिनांक	सदस्य संख्या	दिनांक	सदस्य संख्या

गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय
कृपया पुस्तक के ऊपर कोई निशान आदि
न लगायें।

CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar